

**ЛИСТОК- ВКЛАДЫШ**  
(Информация для потребителей)

**Парацетамол**  
**120мг/5мл, раствор для приема внутрь со вкусом апельсина**

Ацетаминофен (парацетамол)

**Следует прочитать внимательно этот листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данный лекарственный препарат, так как он содержит важную информацию для Вас.**

- Следует сохранить этот листок-вкладыш. Возможно, его придется прочитать еще раз.
- Если у Вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы, следует обратиться к лечащему врачу или фармацевту.
- Данный лекарственный препарат выписан для Вас. Не следует давать его другим лицам. Он может навредить им, даже если у них схожие симптомы.
- Если у Вас изменилась тяжесть побочных эффектов или появились побочные эффекты, не перечисленные в этом листке-вкладыше, следует сообщить об этом лечащему врачу или фармацевту.

**Содержание листка-вкладыша:**

1. Что такое Парацетамол и для чего он применяется
2. Что необходимо знать перед применением Парацетамола
3. Как принимать Парацетамол
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить Парацетамол
6. Дополнительная информация

**1. Что такое Парацетамол и для чего он применяется**

Парацетамол обладает обезболивающим (болеутоляющее средство, которое уменьшает боль) и жаропонижающим (снижает температуру у ребенка при лихорадке) свойствами.

Раствор Парацетамола устраняет боль при прорезывании зубов, зубную боль и боль в горле, снижает температуру при простудных заболеваниях, гриппе и детских инфекционных заболеваниях, таких как ветряная оспа, коклюш, корь и свинка.

**2. Что необходимо знать перед тем как давать Парацетамол Вашему ребенку**

***Не давать парацетамол ребенку:***

- Если у ребенка аллергия на парацетамол или любой другой компонент препарата, перечисленный в подразделе «*Что содержит Парацетамол*» (см. раздел 6).
- Вместе с другими парацетамол содержащими препаратами.

**Особые указания и правила предосторожности при приеме Парацетамола**

***Пожалуйста проконсультируйтесь со своим врачом перед тем как дать препарат ребенку, если:***

- У ребенка нарушения функции печени или почек.
- Ребенок родился преждевременно и находится в возрасте до 3-х месяцев.

## Применение других лекарственных средств

**Пожалуйста проконсультируйтесь со своим врачом перед тем как дать препарат ребенку если:**

- Ребенок принимает метоклопрамид или домперидон (используются для устранения тошноты и рвоты) или холестирамин (используется для лечения высокого уровня холестерина).
- Ребенок принимает варфарин или другие препараты, используемые для предотвращения свертывания крови.
- Ребенок принимает какие-либо лекарства по рецепту или находится под контролем врача.
- Пожалуйста сообщите своему врачу или фармацевту, если ваш ребенок принимает или недавно принимал любые другие лекарства, в том числе лекарства, которые продаются без рецепта.

### **Беременность и кормление грудью**

- Если вы беременны, проконсультируйтесь со своим врачом прежде чем принимать парацетамол. Вы можете принимать препарат во время периода грудного вскармливания.

### **Важная информация о некоторых ингредиентах, входящих в состав Парацетамола**

- Препарат содержит пропиленгликоль, который в концентрации 200мг/кг может вызвать у детей симптомы, сходные с таковыми при приеме алкоголя.
- Препарат также содержит желтый краситель "солнечный закат" FCF (E110), который может вызвать аллергические реакции.

## **3. Как давать Парацетамол Вашему ребенку**

**Для того чтобы определить рекомендуемую дозу лекарства, смотрите нижеуказанную таблицу.**

- Только для перорального применения.
- Никогда не давать ребёнку больше лекарства, чем указано в таблице.
- Чайная ложка должна быть наполнена "без горки".
- Не давать парацетамол вместе с другими парацетамол-содержащими препаратами.

Возраст: 2-3 месяцев	Доза
<b>1. Повышенная температура после вакцинации</b>	2,5 мл (0,5 чайной ложки); При необходимости повторите дозу через 4-6 часов (2,5 мл).
<b>2. Боли и повышенная температура другого происхождения, только если:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Вес более чем 4 кг</li><li>• Родился на 37 неделе</li></ul>	

- Не давать парацетамол детям младше 2-х месяцев.
- Не давать препарат более 2-х разовых доз.
- Интервал между приемами должен быть не менее 4 часов.
- При необходимости дополнительной дозы, нужна консультация врача или фармацевта.

Возраст ребёнка	Сколько	Как часто (в течении 24 часов)
3-6 месяцев	2,5 мл (0,5 чайной ложки)	4 раза
6-24 месяцев	5 мл (1 чайная ложка)	4 раза
2-4 года	5 мл (1 чайная ложка) и 2,5 мл (0,5 чайной ложки)	4 раза
4-8 лет	10 мл (2 чайные ложки)	4 раза
8-10 лет	15 мл (3 чайные ложки)	4 раза
10-12 лет	20 мл (4 чайные ложки)	4 раза

- Не давать препарат более 4-х доз в течении 24 часов.
- Интервал между приемами должен быть не менее 4 часов.
- Не давать препарат вашему ребенку более 3-х дней без консультации вашего врача или фармацевта.

- Препарат не рекомендуется детям до 2-х месяцев, за исключением случаев, когда это необходимо по медицинскому предписанию.
- Не следует превышать назначенную дозу препарата.
- Если симптомы не улучшатся через 24 часа обратитесь к врачу.
- Длительное применение препарата может быть вредным, за исключением случаев, когда ребенок под наблюдением врача.
- Препарат должен использоваться только в случае необходимости.

***Если вы дали ребенку больше Парацетамола, чем рекомендовано:***

В случае передозировки необходима немедленная медицинская помощь, из-за риска возникновения необратимых поражений печени.

#### **4. Возможные побочные эффекты**

Как и все лекарства, Парацетамол может вызвать побочные эффекты, однако они возникают не у каждого пациента.

При развитии каких-либо из следующих побочных реакций, следует **прекратить** прием Парацетамола и **немедленно** обратиться к врачу:

Следующие побочные эффекты являются очень редкими и могут наблюдаться не более чем у 1 пациента из 10000):

- У ребенка возникают аллергические реакции, такие как кожная сыпь и зуд, иногда проблемы с дыханием или отек губ, языка, горла или лица.
- У ребенка может появиться кожная сыпь или шелушение, или язвы во рту.
- Если у ребенка ранее наблюдались проблемы с дыханием из-за приема аспирина или других нестероидных противовоспалительных препаратов, то подобную реакцию ребенок может испытывать и при приеме данного препарата.
- У ребенка могут быть непонятные кровоподтеки или кровотечения.
- У ребенка изменение картины лабораторных тестов, которые характеризуют функцию печени.

*Другие побочные эффекты могут включать в себя сильное снижение числа белых кровяных клеток, что делает организм более восприимчивым к инфекциям.*

Если Вы заметили какие-либо побочные эффекты, сообщите об этом своему лечащему врачу или фармацевту, в том числе и о побочных эффектах, не перечисленных в этом листке-вкладыше.

Также Вы можете сообщить о побочных эффектах непосредственно в Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий им. академика Э. Габриеляна, переходя на сайт:

[www.pharm.am](http://www.pharm.am) в раздел “Сообщить о побочном эффекте лекарства” и заполнить форму “Карта сообщений о побочном действии лекарства”.

Телефон горячей линии: +37410237665; +37498773368.

#### **5. Как хранить Парацетамол**

- Не принимать Парацетамол по истечении срока годности, указанного на упаковке препарата. При указании срока годности имеется в виду последний день указанного месяца.
- Хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 15<sup>0</sup>С.
- Срок годности - 3 года. После вскрытия флакона использовать в течение 6 месяцев.

Не следует спускать лекарства в сточные воды или в канализацию. Спросите у фармацевта, как распорядиться с препаратом, который Вы больше не будете применять. Эти меры направлены на защиту окружающей среды.

## **6. Содержимое упаковки и дополнительная информация**

### **Что содержит Парацетамол?**

- ✓ Активное вещество: ацетаминофен (парацетамол) – 120.0 мг;
- ✓ Другие компоненты: натрия сахарин, пропиленгликоль, глицерин, апельсиновый ароматизатор, жёлтый краситель "солнечный закат" FCF (E110), вода очищенная.
- ✓ Информацию о некоторых компонентах, входящих в состав Парацетамола можно найти в разделе 2.

### **Как выглядит Парацетамол и содержимое упаковки:**

Прозрачный раствор оранжевого цвета со вкусом апельсина.

### ***Описание упаковки:***

Раствор для приема внутрь, 60 мл в стеклянном флаконе, вместе с листком-вкладышем помещены в картонную упаковку.

Раствор для приема внутрь, 100 мл в стеклянном флаконе, вместе с листком-вкладышем помещены в картонную упаковку.

### ***Каковы условия отпуска Парацетамола из аптек:***

Отпускается без рецепта.

### ***Производитель***

**ООО "АРПИМЕД"**

Республика Армения, Котайки марз, г.Абовян, 2-ой мкр, дом 19

Тел.: 374 (222) 21703, 21740 Факс: 374 (222) 21924

### ***Владелец регистрационного удостоверения***

**ООО "АРПИМЕД"**

Республика Армения, Котайки марз, г.Абовян, 2-ой мкр, дом 19

Тел.: 374 (222) 21703, 21740 Факс: 374 (222) 21924

### ***Дата последнего пересмотра текста***