

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата  
для медицинского применения

### ЭЛЕУТЕРОКОККА ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ ТАТФАРМ

**Регистрационный номер:** ЛСР-000475/09

**Торговое наименование:** Элеутерококка экстракт жидкий Татфарм

**МНН или группировочное наименование:** элеутерококка колючего корневища и корни

**Лекарственная форма:** экстракт для приема внутрь [жидкий]

**Состав на 1000 мл**

**Активное вещество:** элеутерококка колючего корневища и корни - 1000 г.

**Вспомогательное вещество:** этанол (этиловый спирт) 40 % - достаточное количество до получения 1000 мл препарата.

#### Описание

Жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета и специфичным запахом, возможна легкая опалесценция. При хранении возможно образование осадка.

**Фармакотерапевтическая группа:** Общетонизирующее средство растительного происхождения.

**Код АТХ:** [A13A]

#### Фармакологические свойства

Оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систему, тонизирующее и общеукрепляющее действие на организм, повышает общую неспецифическую сопротивляемость организма, способствует улучшению аппетита, повышению физической и умственной работоспособности.

#### Показания к применению

Умственное и физическое переутомление, астенические состояния различной этиологии, артериальная гипотония, период выздоровления после инфекционных заболеваний и послеоперационный период.

#### Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление), нарушение сердечного ритма, инфаркт миокарда, церебрально-сосудистая патология, повышенная возбудимость, эпилепсия, судорожные состояния, бессонница, острые инфекционные и вирусные заболевания, хронические заболевания печени. Препарат не рекомендуется применять при беременности, в период лактации и детям до 12 лет.

#### Способ применения и дозы

Применяют внутрь до еды. Взрослым назначают по 20-30 капель 2-3 раза в день. Детям старше 12 лет – в дозе из расчета по 1 капле на год жизни. Курс лечения 25-30 дней. При необходимости проводят повторные курсы с двухнедельными перерывами (или без них) после консультации с врачом.

#### Побочные действия

В редких случаях возможны аллергические реакции, тахикардия, головная боль. При применении препарата могут наблюдаться нарушения сна и гипогликемия.

#### Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препараты элеутерококка усиливают действие стимуляторов и аналептиков (кофеин, камфора, фенамин и др.), являются физиологическими антагонистами снотворного действия средств, угнетающих центральную нервную систему (в том числе барбитуратов, транквилизаторов, противосудорожных препаратов и т. д.).

#### Особые указания

Препарат не следует принимать во второй половине дня во избежание нарушения сна. При явлении гипогликемии рекомендуется уменьшить дозу препарата, принимать его после еды или отменить препарат. Максимальная разовая доза препарата содержит 0,43 г абсолютного спирта, максимальная суточная доза препарата - 1,4 г абсолютного спирта. В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

#### Форма выпуска

Экстракт для приема внутрь [жидкий].

По 50 мл или 100 мл во флаконы из оранжевого стекла. Флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

#### Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### Срок годности

4 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

#### Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

#### Производитель/Организация, принимающая претензии:

АО «Татхимфармпрепараты», Россия  
420091, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260  
тел.: (843) 571-85-58; факс: (843) 571-85-38  
e-mail: marketing@tatpharm.ru