

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

АНУЗОЛ

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Анузол

МНН или группировочное название:

Белладонны листьев экстракт+Трибромфенолята висмута и Висмута оксида комплекс+Цинка сульфат&

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав:

Один суппозиторий содержит:

активные вещества: трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс (ксероформ) – 0,10 г, белладонны листьев экстракт (красавки экстракт густой) – 0,02 г, цинка сульфата гептагидрат – 0,05 г;

вспомогательные вещества: глицерол (глицерин дистиллированный), вода (вода очищенная), основа для суппозитория (моноглицериды дистиллированные, жир твердый (витепсол, суппосир)) - достаточное количество до получения суппозитория массой 2,25 г.

Описание:

Суппозитории торпедообразной формы зеленовато-желтого или зеленовато-желтого с коричневатым оттенком или светло-коричневого цвета с запахом ксероформа. Допускается появление едва заметного белого налета на поверхности суппозитория.

Фармакотерапевтическая группа:

Геморроя средство лечения

Код АТХ: С05АХ03.

Фармакологическое действие

Противогеморроидальное комбинированное средство. Препарат Анузол обладает спазмолитическим, противовоспалительным, антисептическим, болеутоляющим, местным противовоспалительным, вяжущим и подсушивающим действием.

Показания к применению

Геморрой, трещины заднего прохода.

Противопоказания

Гиперчувствительность, сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, тахикардия, миастения, атония кишечника, закрытоугольная глаукома, гипертрофия предстательной железы с нарушением оттока мочи, беременность, период лактации, детский возраст (до 12 лет).

Способ применения и дозы

Ректально. По 1 суппозиторию 1-3 раза в сутки после очистительной клизмы или самопроизвольного опорожнения кишечника. Максимальная суточная доза препарата - 7 суппозитория. Длительность курса лечения составляет 10-14 дней.

Побочное действие

Сухость слизистой оболочки полости рта, жажда, запор, диарея, тахикардия, сердцебиение, мидриаз, парез аккомодации, головная боль, головокружение, нарушение сна, сонливость, аллергические реакции, жжение в области заднего прохода. В этих случаях следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, психомоторное возбуждение, судороги, задержка мочи.

28.07.11
01.08.2012

снижение потоотделения, гипертермия.

В случае передозировки следует немедленно прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаи взаимодействия или несовместимости препарата Анузол суппозитории ректальные с другими лекарственными средствами не описаны.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания, быстроты психомоторных реакций и хорошего зрения.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные. 5 суппозитория помещают в контурную ячейковую упаковку из плёнки поливинилхлоридной ламинированной полиэтиленом.

Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии

АО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород,

ул. Салганская, д. 7.

Тел.: (831) 278-80-88

Факс: (831) 430-72-28

E-mail: med@stada.ru

BY SCOWTE JSC

RT/DATE *Суд 20.01.17*

RT/DATE *Суд 01.08.2017*