

## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Карсил® 22,5 мг таблетки, покрытые оболочкой  
Carsil® 22,5 mg coated tablets  
силимарин (silymarin)

**Прочтите внимательно весь листок-вкладыш, так как он содержит важную для Вас информацию.**

Этот лекарственный препарат отпускается без рецепта. Несмотря на это, для получения наилучших результатов лечения Вам следует тщательно соблюдать инструкции к применению лекарственного препарата.

- Сохраните этот листок-вкладыш. У Вас может появиться необходимость прочитать его снова.
- Если Вам необходима дополнительная информация или совет, обратитесь к Вашему фармацевту.
- Вам следует обратиться к врачу, если Ваши симптомы ухудшаются или не наблюдается их улучшение.
- Если любое побочное действие становится серьезным или Вы заметите другие, неописанные в этом листке-вкладыше побочные действия, просим уведомить об этом Вашего врача или фармацевта.

**В этом листке-вкладыше:**

1. Что представляет собой Карсил и для чего используется
2. Перед тем, как принимать Карсил
3. Как принимать Карсил
4. Возможные побочные действия
5. Как хранить Карсил
6. Дополнительная информация

APPROVED BY SCOMTE JSC  
EXPERT/DATA - Pelasgas 10.05.17  
APPLICANT/DATA -



### 1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КАРСИЛ И ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Карсил – лекарственный препарат, который содержит активное вещество силимарин, выделенное из плодов растения расторопша пятнистая. Силимарин активирует синтез белков и фосфолипидов в поврежденных печеночных клетках, стабилизирует их клеточные мембранны, связывает свободные радикалы (антиоксидантное действие). Его основное действие состоит в предохранении печеночных клеток от вредных воздействий различных факторов, таких как алкоголь, лекарства, вирусные инфекции, индустриальные загрязнители. При поражениях печеночных клеток он способствует их более быстрому восстановлению.

Карсил таблетки, покрытые оболочкой используется при следующих заболеваниях: симптоматическое лечение хронических токсических поражений печени, вызванных алкоголем; длительное применение лекарств, хронические интоксикации; в комплексной терапии хронических воспалительных заболеваний печени и цирроза печени.

### 2. ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИНИМАТЬ КАРСИЛ

#### Не принимайте Карсил

- если у Вас аллергия (гиперчувствительность) к активному веществу или любой из остальных составных частей Карсил.
- у детей младше 12-летнего возраста из-за отсутствия достаточного клинического опыта.

**Обратите особое внимание при применении Карсил**

- Если у Вас заболевания, сопровождающиеся гормональными нарушениями (такие как опухолевые образования матки, яичников или молочной железы, опухоли предстательной железы), Вам необходимо проконсультироваться с лечащим врачом перед тем, как начать лечение Карсил таблетки, покрытые оболочкой.
- Лечение Карсил таблетки, покрытые оболочкой не может заменить диету или воздержание от употребления алкоголя при поражениях печени.

#### **Прием других лекарственных препаратов**

Просим проинформировать Вашего врача или фармацевта, если Вы принимаете или недавно использовали другие лекарственные препараты, включительно и отпускаемые без рецепта. Карсил может уменьшить эффективность пероральных противозачаточных средств и лекарственных препаратов, которые используются при заместительном гормональном лечении. Может усилить действие таких лекарственных препаратов, как диазепам, алпразолам, кетоконазол, ловастатин, винбластин.

#### **Беременность и грудное вскармливание**

Обратитесь за советом к Вашему врачу или фармацевту перед использованием любого лекарства.

Во время беременности и в период грудного вскармливания Карсил можно принимать только по медицинским показаниям и если польза для матери превышает риск применения препарата для плода.

#### **Вождение транспортных средств и работа с машинами**

Карсил не оказывает неблагоприятного влияния на способность водить транспортные средства и работать с машинами.

#### **Важная информация о некоторых из составных частей Карсил**

- Лекарственный препарат содержит крахмал пшеничный. Не представляет риск для людей с целиакией. Пациенты с аллергией на пшеницу (отличающейся от целиакии) должны не принимать это лекарство.
- Таблетки содержат в качестве вспомогательных веществ лактозы моногидрат и сахарозу. Если Ваш врач осведомил Вас о том, что имеете непереносимость некоторых сахаров, посоветуйтесь с ним до применения этого лекарственного препарата.
- В составе оболочки таблетки содержатся метилпарагидроксибензоат (Е 218) и пропилпарагидроксибензоат (Е 216). Они могут вызвать аллергические реакции (возможно замедленного типа).

APPROVED BY SCDMTE JSC  
EXPERT/DATA - Регистр. № 10.05.17  
APPLICANT/DATA -

### **3. КАК ПРИНИМАТЬ КАРСИЛ**

Карсил таблетки, покрытые оболочкой, принимают внутрь, запивая достаточным количеством жидкости.

*M. Коновал*  
*11.05.2017*

**Взрослые:** начальная доза в тяжелых случаях - 4 таблетки покрытые оболочкой 3 раза в сутки. При легких случаях и поддерживающая доза – по 2 таблетки 2-3 раза в сутки.

**Дети младше 12-летнего возраста:** нет достаточных данных о применении лекарственного препарата у них, поэтому не рекомендуется его применение детям младше 12-летнего возраста.

Если Ваши жалобы сохраняются, обратитесь за советом к Вашему врачу. Продолжительность курса лечения устанавливается Вашим врачом.

**Если Вы приняли дозу, превышающую необходимую дозу Карсил**

Если Вы приняли дозу, превышающую назначенную, обратитесь за советом к своему лечащему врачу.

Если Вы пропустили принять Карсил



Если Вы пропустили одну дозу, примите ее как можно скорее. Если почти наступило время для следующей дозы, примите ее как обычно. Не принимайте двойную дозу для компенсации пропущенной. Продолжайте принимать лекарство по назначению.

Если у Вас есть любые дополнительные вопросы, связанные с применением этого лекарственного препарата, просим обратиться к Вашему врачу или фармацевту.

#### 4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Как все лекарственные средства, Карсил таблетки, покрытые оболочкой может вызвать побочные действия, несмотря на то, что они не проявляются у каждого. Карсил таблетки, покрытые оболочкой обладает хорошей переносимостью. Очень редко возможны кожные аллергические реакции, такие как зуд и высыпания или анафилактический шок (тяжелая аллергическая реакция с затрудненным дыханием и головокружением). Редко можно наблюдать усиление существующих вестибулярных нарушений. В редких случаях возможно появление диареи или тошноты, рвоты, диспептических нарушений с образованием газов.

Если любое из побочных действий становится серьезным или Вы заметите другие, неописанные в этом листке-вкладыше побочные действия, просим уведомить об этом Вашего врача или фармацевта.

APPROVED BY SCDMTE JSC

EXPERT/DATA\_ *Р. Гаврик* 10.05.17

APPLICANT/DATA\_

#### 5. КАК ХРАНИТЬ КАРСИЛ

Хранить в оригинальной упаковке, чтобы защитить от влаги при температуре не выше 25°C.  
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 3 (три) года.

Не принимайте Карсил после истечения срока годности, отмеченного на картонной упаковке.  
Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.

Лекарства не следует выбрасывать в канализацию или в контейнер для бытовых отходов.  
Спросите у Вашего фармацевта, как уничтожить ненужные Вам лекарства. Эти меры будут способствовать охране окружающей среды.

#### 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

##### Что содержится в Карсил

Активное вещество: 40,9-56,3 мг плодов расторопши пятнистой сухого экстракта экв. 22,5 мг силимарина, в форме силибинина.

- Другие составные части: лактозы моногидрат; крахмал пшеничный; повидон; целлюлоза, микрокристаллическая (тип 101), магния стеарат; тальк; маннитол (E 421); кросповидон; полисорбат 80; натрия гидрогенкарбонат.
- Оболочка: целлюлозы ацетат фталат; диэтилфталат; сахароза; акации камедь; желатин; тальк; титана диоксид (E 171); макрогол 6000; глицерол; Опалюкс коричневый (сахароза, железный оксид красный (E 172), железный оксид черный (E 172), метилпарагидроксибензоат (E 218), пропилпарагидроксибензоат (E 216)).

##### Как выглядит Карсил и что содержится в упаковке

Таблетки, покрытые оболочкой, правильной круглой формы, коричневого цвета, без запаха.  
10 таблеток, покрытых оболочкой в блистере из твердой, прозрачной, бесцветной ПВХ пленки/алюминиевой фольги.

8 блистеров (80 таблеток, покрытых оболочкой) вместе с листком-вкладышем в единичную складную пачку из картона.



Условия отпуска: без рецепта.

Владелец разрешения на применение и выпускающий серин:  
АО СОФАРМА  
ул. Илиенское шоссе 16, 1220 София, Болгария

Место производство:  
АО СОФАРМА  
ул. Илиенское шоссе 16, 1220 София, Болгария

Дата последнего одобрения листка-вкладыша: Октябрь, 2016

APPROVED BY SCBMTE JSC

EXPERT/DATA - *Р. Георгиев* 10.05.17

APPLICANT/DATA -

*М. Манев*  
11.05.2017

