

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата
БЕФУНГИН ТАТФАРМ

Регистрационный номер: ЛСР-004202/08

Торговое наименование лекарственного препарата: Бефунгин Татфарм

Лекарственная форма: раствор для приема внутрь

Состав

В 1000 мл содержатся:

Действующие вещества: чага - 1000 г, кобальта хлорида гексагидрат (кобальт хлористый б-водный) – 1,76 г

Вспомогательные вещества: этанол (спирт этиловый), вода очищенная

Описание

Жидкость темно-коричневого цвета. Допускается в процессе хранения выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Общетонизирующее средство растительного происхождения

Код АТХ: А13А

Фармакологические свойства

Действие препарата определяется эффектом входящих в состав биологически активных веществ (полисахаридов, гуминоподобной чаговой кислоты, органических кислот, микроэлементов, в т.ч. марганца и кобальта, стероидных и других соединений). Препарат регулирует метаболические процессы, способствует повышению общей резистентности организма, уменьшает потоотделение, нормализует функцию кишечника, устраняет диспептические явления, оказывает общетонизирующее действие.

Показания к применению

Применяют в комплексной терапии при хронических гастритах, дискинезиях желудочно-кишечного тракта с явлениями атонии, при язвенной болезни желудка вне обострения, а также в качестве симптоматического средства, улучшающего общее состояние онкологических больных.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, возраст (до 18 лет).

Способ применения и дозы

Препарат применяют внутрь за 30 минут до еды. Перед употреблением содержимое флакона взбалтывают, разводят три чайные ложки препарата в 150 мл теплой кипяченой воды. Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день в течение 3 - 5 месяцев. При необходимости проводят повторные курсы с перерывами 7-10 дней.

Побочное действие

Аллергические реакции. При длительном приеме препарата возможны диспептические явления.

Форма выпуска

Раствор для приема внутрь.

По 50 мл и 100 мл во флаконы из оранжевого стекла. Флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Хранить после первого вскрытия флакона не более 30 дней.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/Адрес места производства/Организация, принимающая претензии потребителей:

АО "Татхимфармпрепараты", Россия

420091, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

тел.: (843) 571-85-58; факс: (843) 571-85-38

e-mail: marketing@tatpharm.ru