

**ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного средства
ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО
(SEA BUCKTHORN OIL)**

Состав:

действующее вещество: концентрат масла облепихового;

1 суппозиторий содержит концентрат масла облепихового (Oleum Hippophaes) с содержанием каротиноидов не меньше 300 мг% – 0,35 г;
вспомогательное вещество: твердый жир.

Лекарственная форма. Суппозитории.

Основные физико-химические свойства: суппозитории от оранжево-красного до оранжевого цвета, пулебразной формы, со специфическим запахом. Допускается наличие белого налета на поверхности суппозитория.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, действующие на систему пищеварения и метаболические процессы. Код ATХ A16A X.

Фармакологические свойства.

Действующим веществом суппозиториев является концентрат масла облепихового. Облепиховое масло, благодаря наличию жирорастворимых биоантиоксидантов, снижает интенсивность свободнорадикальных процессов и защищает от повреждения клеточные мембранны, стимулирует репаративные процессы и ускоряет заживление ран, имеет определенное антибактериальное действие. Стимулирует репаративные процессы при поражениях кожи и слизистых оболочек.

Клинические характеристики.

Показания.

В гинекологии – кольпиты, эндоцервициты, эрозии шейки матки.

В проктологии – трещины заднего прохода.

APPROVED BY SCONTE JSC

E X P E R T / D A T A _ *Feb 2008 03.10.07*

A P P L I C A N T / D A T A _ *J - 04.10.07*

Противопоказания.

Гиперчувствительность к компонентам препарата, панкреатит, желчнокаменная болезнь, диарея.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Нет данных о лекарственных взаимодействиях масла облепихового.

Особенности применения.

Перед началом лечения следует посоветоваться с врачом. Без консультации врача не применять препарат дольше установленного срока. Если признаки заболевания не начнут исчезать или же, наоборот, состояние здоровья ухудшится, или появятся нежелательные явления, следует обратиться к врачу за консультацией относительно дальнейшего применения препарата.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Необходимость применения препарата определяется врачом после оценки соотношения польза/риска.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не влияет.

Способ применения и дозы.

Перед применением суппозитория необходимо:

- по линии перфорации блистерной упаковки оторвать один суппозиторий в первичной упаковке;
- далее необходимо потянуть за края пленки, разрывая ее в разные стороны, и освободить суппозиторий от первичной упаковки.

Вагинально.

Взрослым – по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение 8-12 суток.

Ректально.

Взрослым и детям с 12 лет – по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение 7-10 суток.

Детям возрастом с 6 до 12 лет – по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение 7-10 суток.

Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания.

Дети.

Препарат не применять ректально для лечения детей до 6 лет.

Препарат не применять вагинально для лечения детей.

APPROVED BY SCOMTE JSC

EXPERT/DATA_ Реклама 03.10.

APPLICANT/DATA_ / - 04.10.17

Передозировка.

Случаи передозировки не описаны.

Побочные реакции.

Возможны аллергические реакции в месте введения, включая жжение в области заднего прохода при ректальном применении.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения.

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.

Упаковка.

По 5 суппозиториев в блистере, по 2 блистера в пачке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Частное акционерное общество «Лекхим-Харьков».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

Украина, 61115, Харьковская обл., город Харьков, улица Северина Потоцкого, дом 36.

Дата последнего пересмотра.