

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения
ГЛИЦЕРИН

Регистрационный номер

Торговое название препарата Глицерин

Международное непатентованное название Глицерол

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав

1 суппозиторий содержит:

действующее вещество - глицерол (глицерин) - 1,24 г или 2,11 г;

вспомогательные вещества: макрогол 400, стеариновая кислота 95, натрия карбонат декагидрат (натрий углекислый 10-водный).

Описание

Суппозитории торпедообразной формы, прозрачные или полупрозрачные, почти бесцветные или с желтовато-коричневым оттенком цвета, с мажущейся поверхностью, гигроскопичны. Допускается наличие воронкообразного углубления с незначительным количеством пузырьков воздуха.

Фармакотерапевтическая группа

Слабительное средство.

Код АТХ: А06АG04.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Слабительное средство, смягчает и смазывает затвердевшие фекальные массы, облегчает их прохождение по толстой кишке, оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку кишечника, рефлекторно стимулируя моторику кишечника.

Фармакокинетика

Практически не всасывается при ректальном применении.

RECEIVED BY SCIENTIFIC
EXPERT/DATA
12.05.17
13.09.2017

Показания к применению

Симптоматическое лечение запоров различной этиологии, в том числе при беременности и в период грудного вскармливания.

Профилактика запоров у пациентов, которые не могут напрягаться при дефекации.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, кишечная непроходимость, геморрой в стадии обострения, воспалительные заболевания и опухоли прямой кишки, недиагностированная боль в животе.

С осторожностью

Почечная недостаточность.

Способ применения и дозы

Ректально, через 15-20 минут после приема пищи.

Суппозитории 2,11 г: взрослым и детям старше 7 лет - по 1 суппозиторию 1 раз в сутки.

Суппозитории 1,24 г: разрешается применять с первых дней жизни. Детям до 3 лет - по 1/2 суппозитория, детям с 3 до 7 лет - по 1 суппозиторию 1 раз в сутки.

При необходимости дозу увеличивают до 2 суппозиториев в сутки.

Побочное действие

Аллергические реакции, местные реакции (зуд и жжение кожи). При длительном применении - ослабление физиологического процесса дефекации.

Передозировка

Случаи передозировки неизвестны. При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Суппозитории с глицерином могут ослабить действие лекарственных средств, которые применяются ректально. При необходимости

REVIEWED BY SCIENTIST/ISC
EXPERT/INTL. *[Signature]* 12.05.17
10/13/09.2017

использования других ректальных препаратов следует соблюдать интервал между их применением не менее 1 часа.

Особые указания

Систематический прием не рекомендуется. Лечение прекращают после восстановления нормальной перистальтики кишечника. Не смазывать суппозитории минеральными жидкими или твердыми маслами.

При применении остатки суппозитория выводятся из кишечника с калом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные 1,24 г или 2,11 г. 5 суппозитория помещают в контурную ячейковую упаковку. Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению лекарственного препарата помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Handwritten signature and date: Jul/13.09.2017

Срок годности

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии

АО «Нижфарм», Россия

603950, г. Нижний Новгород,

ул. Салганская, д.7

Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28

E-mail: med@stada.ru