

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Каффетин КОЛД таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Перед началом приема данного препарата внимательно прочитайте полностью листок-вкладыш, так как в нем содержится важная для Вас информация.
Этот препарат доступен без рецепта. Однако, Вам следует быть внимательными при применении препарата Каффетин КОЛД, чтобы получить наилучшие результаты.

- Всегда используйте этот препарат, точно так, как описано в данном листке-вкладыше, или в соответствии с указаниями Вашего врача или фармацевта.
- Сохраните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его снова.
- Если Вам нужна дополнительная информация или консультация, обратитесь к Вашему фармацевту.
- Если Вы заметили какие-либо побочные эффекты, проконсультируйтесь с Вашим врачом или фармацевтом. Это включает в себя любые возможные побочные эффекты не перечисленные в этом листке-вкладыше. См. раздел 4.
- Если у Вас симптомы ухудшаются или не улучшаются в течение 5 дней, обратитесь к врачу.

Листок-вкладыш содержит:

1. Что представляет собой Каффетин КОЛД и для чего применяется
2. Что нужно знать, прежде чем принимать Каффетин КОЛД
3. Как принимать Каффетин КОЛД
4. Возможные побочные действия
5. Как хранить Каффетин КОЛД
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КАФФЕТИН КОЛД И ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЕТСЯ

Каффетин КОЛД представляет собой комбинированный препарат, содержащий несколько активных веществ: парацетамол, псевдоэфедрин, дексстрометорфан и витамин С (аскорбиновая кислота).

Парацетамол обладает обезболивающим и жаропонижающим действием.

Псевдоэфедрин уменьшает заложенность носа и улучшает проходимость дыхательных путей. Дексстрометорфан подавляет кашель, вызванный незначительным раздражением горла и бронхов. Витамин С укрепляет иммунную систему.

Каффетин КОЛД используется для облегчения симптомов простуды и гриппа (головная боль, мышечные боли, боль в горле, заложенность носа, лихорадка или кашель).

APPROVED BY SCOMTE ISC

EXPERT/DATA - *Р. 20.11.17*

APPLICANT/DATA - *Н. Красн.* /24.11.17

2. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИНИМАТЬ КАФФЕТИН КОЛД

Не принимайте Каффетин КОЛД:

- если у Вас повышенная чувствительность к парацетамолу, псевдоэфедрину, дексстрометорфану или аскорбиновой кислоте или к некоторым компонентам этого препарата (перечисленные в разделе 6);
- если у Вас тяжелая артериальная гипертензия (повышенное кровяное давление) и ишемическая болезнь сердца (болезнь коронарной артерии);
- если у Вас тяжелая печеночная или почечная недостаточность;
- если Вы принимаете или принимали в течение последних двух недель лекарственные препараты, так называемые ингибиторы МАО (для лечения депрессии).

Предостережения и меры предосторожности

Проконсультируйтесь с Вашим врачом перед началом приема препарата Каффетин КОЛД

- если у Вас легкая и умеренная гипертензия (повышенное кровяное давление) или заболевания сердца;
- если у Вас сахарный диабет, состояние, связанное с высоким уровнем сахара в крови;
- если у Вас гиперактивность щитовидной железы (гипertiреоз);
- если у Вас повышенное внутриглазное давление (глаукома);
- если у Вас увеличение предстательной железы;
- если у Вас заболевания печени или почек.
- если Вы старше 60 лет или Вы истощенные, то Вы больше подвержены побочным эффектам препарата Каффетин КОЛД.

Не следует принимать препарат без предварительной консультации с врачом, если Вы употребляете более трех алкогольных напитков ежедневно или если у Вас была алкогольная болезнь печени.

Не следует принимать препарат более 5 дней подряд; если Ваши симптомы не улучшаются или ухудшаются, обратитесь к Вашему врачу.

Этот препарат содержит парацетамол. Не следует принимать одновременно с другими парацетамол-содержащими препаратами, поскольку это может привести к передозировке парацетамолом.

Дети и подростки

Каффетин КОЛД не рекомендуется детям в возрасте до 12 лет.

Другие лекарственные средства и Каффетин КОЛД

Пожалуйста, сообщите Вашему врачу или фармацевту, если Вы принимаете или недавно принимали любые другие лекарственные средства, включая лекарственные средства, которые продаются без рецепта.

Одновременное применение препарата Каффетин КОЛД с некоторыми другими препаратами может привести к их взаимодействию. Это может произойти при приеме:

- метоклопрамид или домперидон (используются для лечения или профилактики тошноты и рвоты);
- других препаратов, содержащих парацетамол;

APPROVED BY SCOMTE JSC

EXPERT/DATA_ Conf. 20.11.11

APPLICANT/DATA_ K. Kast 124.11.11

- таблеток для разжижения крови (например, варфарин или другие кумарины);
- препаратов, используемых для высокого кровяного давления (альфа и бета-блокаторы и другие антигипертензивные препараты);
- препаратов для лечения депрессии (ингибиторы МАО, флуоксетин);
- препаратов, используемых для лечения некоторых психических расстройств (галоперидол);
- препаратов для лечения эпилепсии (барбитураты, противосудорожные средства);
- холестирамин (для снижения уровня жира в крови);
- хлорамфеникол (для лечения инфекций).

Применение препарата Каффетин КОЛД с пицей, напитками и алкоголем

Таблетки Каффетин КОЛД можно принимать с или без пищи.

Следует избегать употребления алкогольных напитков. Одновременное применение этого препарата с алкоголем может вызвать повреждение печени.

Избегайте продуктов, содержащих кофеин, так как могут возникнуть нервозность и учащенное сердцебиение.

Беременность и кормление грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что беременны или планируете забеременеть, обратитесь к Вашему врачу или фармацевту за советом, прежде чем принимать этот препарат.

Ваш фармацевт или врач обсудят соотношение между степенью риска и выгодой беременности или грудного вскармливания при применении препарата Каффетин КОЛД.

Вождение автотранспорта и управление механизмами

Будьте осторожны при вождении автотранспорта или управлении механизмами, поскольку Каффетин КОЛД может вызвать сонливость и головокружение у некоторых людей.

3. КАК ПРИНИМАТЬ КАФФЕТИН КОЛД

Всегда принимайте Каффетин КОЛД согласно листку-вкладышу или предписаниям Вашего врача или фармацевта. Если Вы в чем-то не уверены, посоветуйтесь с Вашим врачом или фармацевтом.

Взрослые и дети старше 12 лет

Рекомендуемая доза для взрослых и детей старше 12 лет - 1 таблетка, 4 раза в сутки. Возможен прием 2 таблеток одновременно. Интервал между приемами должен составлять не менее 4 ч.

Максимальная одноразовая доза - 2 таблетки, а суточная доза не должна превышать 2 таблеток, 4 раза в сутки (8 таблеток в течение 24 ч.)

Каффетин КОЛД таблетки, покрытые пленочной оболочкой имеют риску. Риска нанесена лишь для облегчения разламывания таблетки при возникновении затруднений при ее проглатывании целиком.

Не следует принимать препарат более 5 дней подряд; если Ваши симптомы не улучшаются или ухудшаются, обратитесь к вашему врачу.

APPROVED BY SANTINI JSC

EXPERT/DATA - С.Г. 20.11.17

APPLICATION/DATA - А.Кошт 124.11.17

Дети в возрасте до 12 лет

Каффетин КОЛД не следует применять у детей в возрасте младше 12 лет без консультации врача.

Пациенты с нарушением функции печени

Следует проявлять осторожность при лечении пациентов с нарушением функции печени. Препарат противопоказан пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью.

Пациенты с нарушением функции почек

Следует проявлять осторожность при лечении пациентов с нарушением функции почек, особенно если сопровождается сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Препарат противопоказан пациентам с тяжелой почечной недостаточностью.

Если Вы приняли больше препарата Каффетин КОЛД, чем необходимо

Если Вы приняли больше препарата Каффетин КОЛД, чем необходимо, немедленно обратитесь к Вашему врачу или фармацевту.

Если Вы приняли больше рекомендуемой дозы, немедленно обратитесь к Вашему врачу или фармацевту, даже если Вы чувствуете себя хорошо, так как существует риск отсроченного серьезного повреждения печени.

Если Вы забыли принять препарат Каффетин КОЛД

Принимать Каффетин КОЛД можно столько, сколько Вам нужно, в зависимости от тяжести симптомов. Не принимайте двойную дозу для компенсации забытой.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы относительно применения данного препарата, обратитесь к Вашему врачу или фармацевту.

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Как и все лекарственные средства, Каффетин КОЛД может вызвать побочные действия, которые не встречаются у всех пациентов.

Серьезные побочные эффекты встречаются очень редко.

Некоторые аллергические реакции, которые могут развиться при приеме этого препарата, могут быть очень опасными.

Если у Вас возникли внезапные приступы удушья, затрудненное дыхание, отек лица, языка или губ, сыпь, прекратите прием препарата и немедленно обратитесь к врачу. Сообщалось об очень редких случаях серьезных кожных реакций.

Редко могут возникать следующие нежелательные реакции: тромбоцитопения (низкий уровень тромбоцитов), нарушение функции печени, тошнота и рвота, сонливость, беспокойство, нервозность, головокружение, расстройство сна, повышение артериального давления и учащенное сердцебиение.

Если у Вас появятся какие-либо побочные эффекты, поговорите с Вашим врачом или фармацевтом. Это касается и побочных эффектов, не указанных в данном листке-вкладыше.

APPROVED BY SCOTT JONES
EXPERT/DATA: *Радослав Иванов*
APPLICATION DATE: *124-11-17*

5. КАК ХРАНИТЬ КАФФЕТИН КОЛД

Хранить в недоступном для детей месте.

Хранить при температуре не выше 25 °C, в оригинальной упаковке.

Не использовать препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке, после аббревиатуры, используемой для обозначения срока годности. Дата истечения срока годности относится к последнему дню данного месяца.

Лекарственные средства нельзя выбрасывать в сточные воды или мусор.

Проконсультируйтесь с Вашим фармацевтом как устраниить лекарственные средства, которые Вам не нужны. Данные меры помогут в защите окружающей среды.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что содержит Каффетин КОЛД

- Активные вещества: парацетамол, псевдоэфедрин, декстрометорфан и аскорбиновая кислота (витамин С);

Каждая таблетка содержит: парацетамола 500 мг, псевдоэфедрина гидрохлорида 30 мг, декстрометорфана гидробромида 15 мг и аскорбиновой кислоты 60 мг.

- Вспомогательные вещества:

Таблеточной ядро: крахмал прокаленлизированный; целлюлоза микрокристаллическая; повидон; натрия кроскармеллоза; кремния диоксид коллоидный безводный; тальк; магния стеарат.

Оболочка:

Опадрай II белый (спирт поливиниловый, частично гидролизованный; полиэтиленгликоль 3350; титана диоксид (E171); тальк);

Опадрай II синий (спирт поливиниловый, частично гидролизованный; полиэтиленгликоль 3350; титана диоксид (E171); тальк; краситель индигокармин (E132)).

Описание препарата Каффетин КОЛД и содержимое упаковки

Каффетин КОЛД таблетки, покрытые пленочной оболочкой: синие, продолговатые, двояковыпуклые, покрытые пленочной оболочкой, таблетки с риской на одной стороне. Риска предназначена лишь для разламывания с целью облегчения проглатывания, а не для разделения на равные дозы.

Каффетин КОЛД таблетки, покрытые пленочной оболочкой упакованы в блистере перфорированном (ал. фольга/ПВХ/ПВДХ), каждый блистер содержит 10 таблеток.

По 10 таблеток (1 блистер) в пачке картонной вместе с инструкцией по применению.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

APPROVED BY SIGHTED JSC
EXPERT/DATA_ *Соф* 20.11.15
APPLICANT/DATA_ *Кади* 124.11.17

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

АЛКАЛОИД АД Скопье
Бульвар Александар Македонски 12,
1000 Скопье, Республика Македония
тел. + 389 2 31 04 000
факс: + 389 2 31 04 021
www.alkaloid.com.mk

