

**Инструкция
для пациентов по медицинскому применению препарата**

Энтерожермина®

Enterogermina®

SANOFI 



Внимательно прочтайте этот листок-вкладыш, прежде чем начать прием препарата. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

Этот препарат предназначен для Вас. Не следует передавать его другим людям. Это может нанести вред их здоровью, даже если симптомы их заболевания схожи с теми, которые наблюдаются у Вас.

Сохраняйте этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться прочитать его еще раз.

Торговое название препарата: Энтерожермина® / Enterogermina®.

Международное непатентованное название: отсутствует.

Лекарственная форма: суспензия для приема внутрь

Состав

В одном флаконе (5 мл) содержится:

активное вещество: споры *Bacillus clausii*, полирезистентные к антибиотикам – 2 миллиарда;
вспомогательное вещество: вода очищенная – до 5 мл.

Описание: опалесцентная, беловатая жидкость с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: Антидиарейные микроорганизмы.

Код ATХ: A07FA.

Показания к применению

Лечение и профилактика кишечного дисбактериоза и последующего эндогенного дисвитамина.

Лечение по восстановлению кишечной микробной флоры, измененной в ходе лечения антибиотиками или химиотерапевтическими средствами.

Острые и хронические желудочно-кишечные расстройства у младенцев и детей младшего возраста, характерные для интоксикации или кишечного дисбактериоза и авитамина.

Дозировка и способ применения

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ.

НЕ ВВОДИТЬ ИНЪЕКЦИОННО!



ПРЕПАРАТ СЛЕДУЕТ ВЫПИТЬ!

Не принимать никаким другим способом!

Дозировка

Взрослым: 2-3 флакона в день, если иное не прописано лечащим врачом.

Рекомендуемые интервалы между приемами однократной дозы препарата (1 флакона) составляют 3-4 часа.

Младенцам (от 3-х недель) и детям: 1-2 флакона в день, если иное не прописано лечащим врачом

Если суточная доза препарата составляет один флакон в день, препарат должен быть принят один раз в день (1 флакон принимается целиком). Если суточная доза превосходит 1 флакон, рекомендуемые интервалы между приемами однократной дозы препарата (1 флакона) составляют 3-4 часа.

Лечащий врач, используя другие дозировки препарата, может рекомендовать иную суточную дозировку, в зависимости от состояния пациента.

Способ применения

Отворите один флакон от ленты флаконов. Встряхните флакон. Проверните верхнюю часть флакона по часовой стрелке и оторвите её. Вылейте содержимое флакона в подслащённую воду, молоко, чай или апельсиновый сок или выпейте препарат без предварительного разбавления.



Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующему веществу или какому-либо из ингредиентов препарата.

Особые указания и предосторожности применения

Особые указания

- В случае использования Энтерожермины во время курса антибиотикотерапии, рекомендуется принимать препарат между двумя последовательными приемами дозы антибиотика (например, через 2-3 часа после приема антбактериального препарата)
- Возможное наличие видимых включений во флаконах Энтерожермины® обусловлено агрегатами спор *Bacillus clausii*, поэтому оно не означает, что препарат претерпел изменения.
- Встряхивайте флакон перед применением.

Меры предосторожности

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ! НЕ ВВОДИТЬ ИНЪЕКЦИОННО!

ПРЕПАРАТ СЛЕДУЕТ ВЫПИТЬ!

Не принимать никаким другим способом!

При неправильном применении лекарственного средства возможно развитие тяжелых аллергических реакций, таких как анафилактический шок.

Не храните препарат после вскрытия флакона, чтобы избежать загрязнения супензии.

Беременность и грудное вскармливание

Прием данного лекарственного препарата не противопоказан во время беременности и грудного вскармливания.

Побочное действие

При постмаркетинговых исследованиях выявлены следующие возможные побочные реакции:

- аллергические реакции: такие, как сыпь и крапивница;
- заболевания кожи и подкожной клетчатки: ангидровотический отек.

Передозировка

На настоящий момент клинических проявлений передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие формы взаимодействия

Лекарственные взаимодействия в результате одновременного приема с другими лекарственными средствами не известны.

Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами

Препарат не влияет на способности, необходимые для управления транспортными средствами и машинным оборудованием.

Форма выпуска

По 5 мл во флаконе из полистилена. По 10 или 20 флаконов вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

После вскрытия флакона лекарственное средство должно быть использовано незамедлительно во избежание загрязнения супензии.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Санофи С.П.А., Италия.

Адрес производства:

viale Europa 11
21040 Origgio (VA)
ИТАЛИЯ