

**Инструкция**  
по медицинскому применению препарата  
**Граммидин® с анестетиком нео**

**Регистрационный номер:**

**Торговое название препарата:** Граммидин® с анестетиком нео

**Группировочное название:** Грамицидин С + Оксибупрокайн + Цетилпиридиния хлорид

**Лекарственная форма:** таблетки для рассасывания

**Состав:**

Одна таблетка содержит:

*активные вещества:*

грамицидина С дигидрохлорид - 3,20 мг (в пересчете на грамицидин С – 3,00 мг);

оксибупрокайна гидрохлорид – 0,20 мг;

цетилпиридиния хлорида моногидрат – 1,05 мг (в пересчете на цетилпиридиния хлорид – 1,00 мг);

*вспомогательные вещества:*

кремния диоксид коллоидный – 5,00 мг, тальк – 60,00 мг, ацесульфам калия – 15,00 мг, ароматизатор мятный – 25,00 мг, сорбитол – 1065,55 мг, магния стеарат – 25,00 мг.

**Описание:** таблетки белого цвета круглые двояковыпуклые с надписью на одной стороне GR.

**Фармакотерапевтическая группа:** антибиотик + антисептическое средство + местноанестезирующее средство.

**Код АТХ:** R02A

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Комбинированный препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний горла и полости рта. В состав препарата входит противомикробное средство грамицидин С, местноанестезирующее (обезболивающее) средство - охибупрокайн и антисептическое средство – цетилпиридиния хлорид.

Механизм действия грамицидина С связан с повышением проницаемости цитоплазматической мембраны микробной клетки, что нарушает ее устойчивость и вызывает гибель клетки.

Грамицидин С оказывает выраженное противомикробное действие в отношении возбудителей инфекционных заболеваний полости рта и глотки.

Аnestетик охибупрокайн оказывает местное обезболивающее действие на слизистую оболочку полости рта и горла. Вызывает обратимую блокаду распространения и проведения нервных импульсов через аксоны нервных клеток.

Цетилпиридиния хлорид относится к антисептическим средствам. Подавляет рост и размножение возбудителей инфекционных заболеваний полости рта.

Препарат оказывает обезболивающий эффект, уменьшает воспаление, оказывает противомикробное действие, смягчает неприятные ощущения в горле, облегчает глотание, при рассасывании вызывает гиперсаливацию, что способствует механическому очищению полости рта и глотки от микроорганизмов.

**Фармакокинетика**

Препарат обладает местным действием и практически не вс�ывается в желудочно-кишечном тракте, что определяет практически полное отсутствие системных эффектов.

**Показания к применению**

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла: ангина, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, гингивит, стоматит.

**Противопоказания**

- повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав препарата;
- детский возраст до 4 лет;

- беременность (I триместр).

#### **Применение при беременности и в период лактации**

Не рекомендуется применять препарат при беременности (I) триместр.

Грудное вскармливание на время приема препарата необходимо прекратить.

#### **Способ применения и дозы**

Применяется после еды, путем рассасывания во рту не разжевывая.

Непосредственно после применения препарата следует воздержаться от приема пищи и напитков в течение 1-2 часов.

Дозировка для взрослых и детей старше 12 лет: по 1 таблетке 3 - 4 раза в день.

Дозировка для детей от 4 до 12 лет: по 1 таблетке 1 – 2 раза в день.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 7 дней приема препарата рекомендуется обращение к врачу.

#### **Побочное действие**

В отдельных случаях возможны аллергические реакции на компоненты препарата, временная потеря чувствительности языка.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Граммидин® с анестетиком нео усиливает эффекты других противомикробных средств местного и системного действия.

#### **Особые указания**

Препарат содержит сорбитол. Пациенты, у которых раньше была выявлена непереносимость некоторых видов сахаров, перед применением препарата должны обратиться к врачу.

#### **Форма выпуска:**

Таблетки для рассасывания.

По 6 или 9 таблеток в контурную ячейковую упаковку или в контурную ячейковую упаковку с перфорацией из пленки поливинилхлоридной или пленки поливинилхлоридной/поливинилиденхлоридной или комбинированного материала (полиамид/алюминий/поливинилхлорид) и фольги алюминиевой.

2, 3 или 4 контурные упаковки по 6 таблеток или 2 контурные упаковки по 9 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

#### **Условия хранения:**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности:**

2 года. Не применять после истечения срока годности

#### **Условия отпуска из аптек:**

Без рецепта.

#### **Претензии от покупателей принимает предприятие-производитель:**

ПАО «Валента Фарм»,

141101, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.

Тел. +7 (495) 933 48 62, факс +7 (495) 933 48 63