

АНАЛЬГИН® 500 мг таблетки
ANALGIN® 500 mg tablets

метамизол натрия (metamizole sodium)

Прочтите внимательно весь листок-вкладыш перед началом применения этого лекарственного препарата.

Этот лекарственный препарат отпускается без назначения врача. Несмотря на это, для получения наилучших результатов лечения, Вам следует осторожно соблюдать инструкции по применению лекарственного препарата.

- Сохраните этот листок-вкладыш. У Вас может появиться необходимость прочитать его снова.
- Если Вам необходима дополнительная информация или совет, спросите Вашего фармацевта.
- Вам следует обратиться за помощью к врачу, если Ваши симптомы ухудшаются или не наблюдается их улучшение спустя 3 дня.
- Если любое побочное действие становится серьезным или Вы заметите другие, не описанные в этом листке-вкладыше побочные действия, просим уведомить об этом Вашего врача или фармацевта.

В этом листке-вкладыше:

1. Что представляет собой Анальгин и для чего используется
2. Перед тем, как принимать Анальгин
3. Как принимать Анальгин
4. Возможные побочные действия
5. Как хранить Анальгин
6. Дополнительная информация

1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ АНАЛЬГИН И ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Анальгин таблетки содержит активное вещество метамизол натрия, которое относится к болеутоляющим лекарственным препаратам (анальгетики). Кроме обезболивающего, он обладает и жаропонижающим действием.

Анальгин используется для:

- снятия умеренно до сильно выраженных болей различного происхождения: головная боль, зубная боль, невралгии, невриты, миалгии, травмы, ожоги, послеоперационные боли, фантомная боль, боли во время менструального цикла, боли при онкологических заболеваниях, почечные и желчные колики.
- для понижения высокой температуры.

2. ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ ПРИЕМ АНАЛЬГИН**Не принимайте Анальгин в следующих случаях**

- Если у Вас аллергия (гиперчувствительность) к активному веществу метамизол, к другим лекарственным препаратам из группы производных пиразолона или к любому из вспомогательных веществ препарата;
- Если Вы страдаете острой печеночной порфирией (наследственное заболевание с нарушенным образованием красных кровяных клеток) или врожденной недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (наследственное заболевание с недостаточностью этого фермента);
- Если у Вас тяжелые печеночные и/или почечные заболевания;
- Если у Вас нарушение функции костного мозга (например после цитостатического лечения) или заболевания крови, такие как: апластическая анемия (уменьшение количества кровяных клеток, что ведет к слабости, появлению синяков или повышенной вероятности возникновения инфекции), агранулоцитоз (сильное уменьшение количества белых кровяных клеток, что повышает вероятность возникновения инфекций),

- лейкопения (уменьшение общего количества белых кровяных клеток);
- Дети младше 10-летнего возраста;
- Беременность и грудное вскармливание.

Соблюдайте особую осторожность при применении Анальгин

- Если у Вас аллергия на обезболивающие или противоревматические лекарственные препараты, другие препараты или пищевые продукты;
- При аллергически обусловленной бронхиальной астме (приступ удушья);
- Если Вам известно о своем заболевании, протекающем с уменьшением количества белых кровяных клеток (лейкоцитов);
- Если у Вас почечные или печеночные нарушения;
- Если у Вас пониженное кровяное давление.

Прием других лекарственных препаратов

Просим проинформировать Вашего врача или фармацевта, если Вы принимаете или недавно использовали другие лекарственные препараты, включительно и отпускаемые без рецепта.

- Одновременное применение метамизола и хлорпромазина (лекарственный препарат для лечения психических заболеваний) может привести к резкому понижению температуры тела.
- Желательно избегать одновременного применения метамизола и кумариновых антикоагулянтов, таких как аценокумарол и варфарин (лекарственные препараты, уменьшающие свертываемость крови).
- Метамизол понижает действие циклоспорина (лекарственный препарат, используемый после трансплантации органов и для лечения опухолевых заболеваний).
- Хлорамфеникол и другие миелотоксические препараты (лекарственные препараты, поражающие кроветворение) увеличивают риск побочных действий со стороны кроветворной системы при их совместном применении с метамизолом.
- Не принимайте одновременно Анальгин со снотворными средствами, лекарственными препаратами для лечения депрессии, противозачаточными средствами, анальгетиками, аллопуринолом (для лечения подагры).
- Метамизол может взаимодействовать с каптоприлом (для лечения заболеваний сердца и повышенного кровяного давления), литием (для лечения психических заболеваний), метотрексатом (для лечения ревматических и опухолевых заболеваний), как и изменить эффект антигипертензивных (понижающих кровяное давление) препаратов и диуретиков (мочегонные).

Прием Анальгина с пищевыми продуктами и напитками

Во время лечения Анальгин не рекомендуется применение алкоголя из-за возможности усиления побочных действий лекарственного препарата.

Беременность и грудное вскармливание

Обратитесь за советом к Вашему врачу или фармацевту перед использованием любого лекарственного препарата.

Беременность

Прием препарата во время беременности противопоказан.

Грудное вскармливание

Применение препарата в период грудного вскармливания нежелательно. В случаях неотложного применения, кормление грудью следует прекратить.

Управление транспортными средствами и работа с машинами

При приеме высоких доз препарата Анальгин не рекомендуется управление транспортными средствами или работа с машинами, требующие активного внимания, так как возможно неблагоприятное влияние препарата на внимание и нарушение реакций в неожиданных ситуациях.

Важная информация о некоторых компонентах Анальгин

Этот лекарственный препарат содержит крахмал пшеничный, подходящий для лиц с целиакией (глютеновая энтеропатия). Пациентам с аллергией на пшеницу (отличающейся от целиакии) не следует принимать этот лекарственный препарат.

3. КАК ПРИНИМАТЬ АНАЛЬГИН

Всегда принимайте Анальгин, в точности соблюдая указания в этом листке-вкладыше. Если Вы в чем-то не уверены, спросите у Вашего врача или фармацевта.

Таблетки принимают внутрь. Обычная доза составляет:

Взрослые и подростки старше 15-летнего возраста

По ½ - 1 таблетке 2-3 раза в день.

При необходимости можно принимать по 2 таблетки один раз в день. Не принимайте больше 6 таблеток в день.

Дети от 10 до 15-летнего возраста (весом от 32 кг до 53 кг)

По ½ таблетке 2-3 раза в день. Максимальная суточная доза - 4 таблетки.

Дети младше 10-летнего возраста

Эта лекарственная форма не является подходящей для применения детям младше 10 лет.

Пациенты старше 65-летнего возраста

Если Вы старше 65 лет и у Вас проблемы с печенью или почками, начните лечение более низкой дозой (по ½ таблетке 2-3 раза в день). При необходимости проконсультируйтесь с врачом.

Пациенты с нарушенной почечной или печеночной функцией

Если у Вас почечное или печеночное заболевание, начните лечение низкой дозой (½ рекомендуемой дозы для взрослых). Если необходимо более длительное лечение, проконсультируйтесь с врачом.

Длительность лечения

Принимайте Анальгин не более 3 до 5 дней. Если через 3 дня не наступает облегчение или продолжаете поддерживать высокую температуру, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Если Вы приняли дозу Анальгин, превышающую необходимую

Можно наблюдать тошноту, головокружение, боли в животе, ощущение вращения, слабость до потери сознания, резкое понижение кровяного давления и нарушения сердечного ритма.

При появлении таких признаков, как холодный пот, головокружение, тошнота, изменение цвета кожи и удушье, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Если Вы пропустили принять Анальгин

Не принимайте двойную дозу для компенсации пропущенной.

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Как и все лекарственные препараты, Анальгин может вызвать побочные действия, несмотря на то, что они не проявляются у каждого.

Побочные действия классифицируются по частоте следующим образом: очень частые ($\geq 1/10$), частые ($\geq 1/100$ и $<1/10$), нечастые ($\geq 1/1\ 000$ и $<1/100$), редкие ($\geq 1/10\ 000$ и $<1/1\ 000$), очень редкие ($<1/10\ 000$), с неизвестной частотой (на основании существующих данных нельзя сделать оценку).

Нечастые (проявляются у меньше, чем 1 на 100 потребителей)

Кожные высыпания, понижение кровяного давления, нарушения сердечного ритма (пальпитации, тахикардия).

Редкие (проявляются у меньше, чем 1 на 1 000 потребителей)

Лейкопения (уменьшение количества белых кровяных клеток, что увеличивает вероятность возникновения инфекции); макулопапулезная сыпь (образование кожных бляшек и узлов); реакции гиперчувствительности (анафилактические или анафилактоидные реакции) - зуд, жжение, покраснение кожи, крапивница, отеки (генерализованные или местные), затрудненное дыхание и редко жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, ангионевротический отек (включительно ларингальный), нарушения сердечного ритма, понижение кровяного давления;

почечные поражения, такие как появление белка в моче, уменьшение или повышение количества мочи, воспаление почек.

Очень редкие (проявляются у меньше, чем 1 на 10 000 потребителей) Агранулоцитоз (сильное уменьшение количества белых кровяных клеток, что увеличивает вероятность возникновения инфекций). Характерные признаки агранулоцитоза включают воспалительные изменения кожи и слизистой оболочки рта, горла, половых органов; боли в горле и повышенную температуру. При внезапном ухудшении общего состояния, в случае, когда высокая температура не понижается или появляется повторно, при появлении болезненных изменений со стороны слизистой оболочки и кожи, прекратите применение Анальгин и обратитесь к врачу.

Очень редко можно наблюдать также: тромбоцитопению (уменьшение количества тромбоцитов, что повышает риск кровотечения или образования синяков); гемолитическую анемию (уменьшение количества красных кровяных клеток, что может привести к бледности или желтению кожи, слабости или удушью); апластическую анемию (сильное уменьшение количества кровяных клеток, что ведет к слабости, появлению синяков или повышенной вероятности возникновения инфекций); астматический приступ (у пациентов с анафилактической астмой); синдром Стивенса-Джонсона или Лайелла (тяжелая реакция, сопровождающаяся образованием пузырей на коже, в полости рта, глазах и на половых органах); анафилактический шок (тяжелое жизнеугрожающее аллергическое состояние).

С неизвестной частотой: тошнота, рвота, боли в животе и дискомфорт, в редких случаях изъязвления или кровотечение из слизистой желудочно-кишечного тракта.

Если любое из побочных действий становится серьезным или Вы заметите другие, не описанные в этом листке-вкладыше побочные действия, просим уведомить об этом Вашего врача или фармацевта.

5. КАК ХРАНИТЬ АНАЛЬГИН

В оригинальной упаковке, в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Храните в недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 (пять) лет.

Не используйте препарат по истечении срока годности, отмеченного на упаковке. Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.

Лекарственные препараты не следует выбрасывать в канализацию или в контейнер для бытовых отходов. Спросите у Вашего фармацевта, как уничтожить ненужные Вам лекарственные препараты. Эти меры будут способствовать охране окружающей среды.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что содержится в Анальгин таблетки

- Активное вещество: метамизол натрия 500 мг в одной таблетке.

- Вспомогательные вещества: крахмал пшеничный, целлюлоза микрокристаллическая; магнезия стеарат, повидон, тальк.

Режим отпуска: Без рецепта

Как выглядит Анальгин таблетки и что содержится в упаковке

Круглые, плоские таблетки с делительной риской с одной стороны, диаметром 13 мм, от белого до почти белого цвета, без запаха. Делительная риска служит для разделения таблетки на две равные половины.

10 штук таблеток в блистере из ПВХ пленки/алюминиевой фольги; 2 блистера в картонной пачке, вместе с листком-вкладышем.

Владелец регистрационного свидетельства и производитель
АО СОФАРМА

ул. Илиенское шоссе 16, 1220 София, Болгария

Дата последнего одобрения листка-вкладыша: ноябрь 2016.