

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
РАСТВОР ПРОТАРГОЛА 3%

Регистрационный номер:

Торговое название препарата

Раствор протаргола 3% (Solutio Protargoli 3%)

Международное непатентованное название

Серебра протеинат (Silver Protein)

Основные синонимы

Argentoproteinum, Argentum Proteinicum, Protargolum, Strong Protargin, Strong Protein Silver, Strong Silver Protein

Лекарственная форма

Раствор

Состав на 100 мл

Активное вещество: серебра протеинат - 3,0 г

Вспомогательное вещество: вода дистиллированная - до 100 мл.

Описание: Коричневый раствор слабо горького или слегка вяжущего вкуса, без запаха. Протаргол состоит из белков, которые содержат 7,8-8,3% ионы серебра.

Фармакотерапевтическая группа: Антисептическое средство.

Код АТХ: D08AL

Фармакологические свойства

Раствор протаргола относится к группе антисептических средств. Представляет собой коллоидный препарат серебра. Распадаясь, образует малые концентрации ионов серебра. Обладает вяжущим, антисептическим и противомикробными свойствами. Способность активно связываться с белками обуславливает вяжущие свойства серебра, необходимые при лечении заболеваний во второй фазе воспаления. Противомикробные свойства серебра объясняются способностью его ионов блокировать SH-группы ферментов бактерий, подавляют усвоение фосфатов, угнетают функции ДНК бактериальной клетки, ингибируют трансмембранный транспорт органических и неорганических веществ в бактериальную клетку, связываясь с их ДНК. Серебро проявляет высокую бактерицидную активность к некоторым аэробным и анаэробным микроорганизмам.

Фармакокинетика

При нанесении на неповрежденную кожу и слизистые оболочки всасываемость серебра не наблюдается.

Проникновение серебра в системный кровоток через раны незначительное, так как оно плохо связывается с белками на раневой поверхности кожи. Поступившее в организм серебро выводится, главным образом, с желчью через кишечник.

Показания к применению

В урологии: при гонорейном хроническом уретрите.

Способ применения и режим дозирования

Применяется местно для промывания мочеиспускательного канала и мочевого пузыря.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату.

Применение при беременности и кормлении грудью

Во время беременности и в период грудного вскармливания препарат использовать не следует. При необходимости использования препарата в период лактации кормление ребенка грудью следует приостановить.

Побочные действия

Легкое раздражение слизистой оболочки в виде жжения, зуда.

Передозировка

При передозировке препаратов серебра возможно развитие аргирии – возникновение пигментаций (серо-голубого цвета) кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, глаз. В лечебных дозах токсическое действие препарата отсутствует.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата необходимо обратиться к врачу. Раствор протаргола 3% не рекомендуется применять более 3-5 дней. Более длительный прием может привести к окрашиванию слизистой и кожи в серо-голубой цвет.

Раствор протаргола 3% не влияет на способность к вождению автомобиля и к управлению различными механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В большинстве случаев препарат Раствор протаргола 3% можно использовать в сочетании с другими лекарственными препаратами, данных о взаимодействии с другими препаратами не существует. Но, перед использованием препарата необходимо сообщить врачу о применении других лекарственных средств.

Упаковка

По 15 мл в пластмассовые, светонепроницаемые флаконах-капельницах, помещенных в пачку из картона вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения

Хранить при температуре 15-25 °С, в защищенном от света и недоступном для детей месте.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке!

Срок годности – 1 год.

Условия отпуска из аптек

По рецепту врача.

Производитель

ООО “Эско-Фарм”

Республика Армения, Ереван 0079, ул. Микояна 13

Тел.: (+37410) 673929

E-mail: escopharm@yahoo.com