

ЛАКТО – G

Фармакотерапевтическая группа: Препарат регулирующий микрофлору кишечника [A07FA01].

СОСТАВ

1 г (2 капсулы) препарата содержит 10×10^9 CFU/g живых бактерий: *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium longum*, *Bifidobacterium bifidum*, *Bifidobacterium infantis* и фруктоолигосахариды (ФОС).

ДЕЙСТВИЕ

Входящие в состав препарата молочнокислые бактерии поддерживают и восстанавливают физиологическое равновесие кишечной микрофлоры. Бифидобактерии и лактобациллы, продуцируя молочную и уксусную кислоту, создают неблагоприятные условия для размножения и жизнедеятельности патогенных микроорганизмов; участвуют в процессе пищеварения и синтезе витаминов (В, К...), регулируют электролитный баланс, обмен белков, фосфолипидов, желчных и жирных кислот, билирубина, холестерина.

Естественные полисахариды – фруктоолигосахариды создают хорошую почву для размножения, колонизации и жизнедеятельности кишечных бактерий – зубиотиков. Фруктоолигосахариды не расщепляются под действием пищеварительных кислот и в неизменном виде поступают в нижних отделах кишечника.

ПОКАЗАНИЯ

- лечение и профилактика дисбактериозов (диарея, диспепсия, нарушение пищеварения, запоры, метеоризм, тошнота, отрыжка, рвота, боли в животе);
- дисбактериозы у детей и взрослых, возникающие во время лечения антибиотиками и химиотерапевтическими средствами.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентом препарата.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом перед приемом препарата, если у Вас:

- температура тела выше 38°C ,
- следы крови или слизи в стуле,
- диарея длится более двух дней и сопровождается острыми болями в животе, обезвоживанием и потерей веса,
- хронические заболевания - сахарный диабет, СПИД.

В период применения препарата не рекомендуется прием алкоголя.

Не отмечено нежелательного взаимодействия Лакто-G с другими лекарствами.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ

При необходимости применение препарата Лакто-G во время беременности и в период лактации возможно по показаниям.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Детям до 2 лет назначают содержимое одной капсулы смешенной с небольшим количеством жидкости (сок, подсахаренная вода), до приема пищи.

Детям 2-12 лет назначают по 1-2 капсулы в сутки до приема пищи, запивая небольшим количеством жидкости.

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 2-3 капсулы в сутки натощак или до приема пищи, запивая небольшим количеством жидкости.


Длительность лечения зависит от причины развития дисбактериоза и индивидуальных особенностей организма.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Препарат хорошо переносится, при применении препарата в рекомендуемых дозах побочные явления не отмечены.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре $10-25^{\circ}\text{C}$, в сухом, недоступном для детей месте.



Срок годности – 2 года. Препарат нельзя использовать после истечения срока годности.

ФОРМА ВЫПУСКА

В упаковке 10 капсул

НАЗНАЧЕНИЕ

Без рецепта врача

APPROVED BY / SCDMTE JSC
Expert / Date <i>[Signature]</i> 26.11.18
Applicant / Date <i>[Signature]</i> 27.11.18