Листок-вкладыш
Информация для потребителей

Гербион® сироп плюща
Сироп с сухим экстрактом листьев плюща

Торговое название
Гербион® сироп плюща (Herbion® ivy syrup)

Международное непатентованное название Hederae helicis folium
Общая характеристика
Описание
Сироп желтовато-коричневого цвета со специфическим запахом и вкусом.
Допускается наличие осадка.
Состав
В 1 мл сиропа содержится 7 мг сухого экстракта листьев плюща (5 – 7,5 : 1).
Растворитель для экстракции: этанол 30% (м/м)
Вспомогательные вещества с известным действием
В 5 мл сиропа (1 мерная ложка) содержится 0,5 мг этанола (компонент ароматизатора с запахом мелиссы) и 1750 мг сорбитола (Е420).
Вспомогательные вещества: сорбитол жидкий (некристаллизованный) (Е420), глицерин (Е422), натрия бензоат (Е211), лимонная кислота моногидрат (Е330), ароматизатор с запахом мелиссы (состоит из пропиленгликоля (Е1520), этанола, масла цитронеллы, цитраля ex. Litsea cubeba, масла лимона и масла кориандра), вода очищенная.

Лекарственная форма
Сироп

Фармакотерапевтическая группа
Код АТХ: R05CA12. Отхаркивающие средства.

Фармакологические свойства
Гербион® сироп плюща содержит сухой экстракт листьев плюща, основными компонентами которого являются тритерпеновые сапонины.

Показания к применению
Гербион® сироп плюща применяется в качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, сопровождающихся продуктивным кашлем.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также растениям семейства аралиевых (Araliaceae).
Прием лекарственного средства противопоказан детям до 2 лет из-за риска утяжеления симптомов респираторного заболевания.

Способ применения и дозировка

Препарат противопоказан детям младше 2 лет.
Гербион® сироп плюща принимают утром или в первой половине дня вне зависимости от приема пищи. Рекомендовано запивать достаточным количеством теплой воды.
Если симптомы сохраняются в течение недели после начала приема сиропа, то следует проконсультироваться с врачом. Длительность лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.
1 мерная ложка содержит 5 мл сиропа.
Детям от 2 до 5 лет: 2,5 мл сиропа (0,5 мерной ложки) два раза в день (соответствует 35 мг сухого экстракта листьев плюща в день).
Детям от 6 до 12 лет: 5 мл сиропа (1 мерная ложка) два раза в день (соответствует 70 мг сухого экстракта листьев плюща в день).
Взрослым и детям старше 12 лет: 5 - 7,5 мл (1 – 1,5 мерной ложки) сиропа два раза в день (соответствует 70 – 105 мг сухого экстракта листьев плюща в день).
Пациенты с нарушением функции печени и/или почек
Пациентам с нарушением функции печени и/или почек прежде чем принимать Гербион® сироп плюща, следует проконсультироваться с врачом, чтобы определить дозу препарата.

Меры предосторожности и особые указания
Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или в случае ухудшения состояния (возникновение одышки, повышение температуры, появление мокроты с примесью гноя или крови), следует незамедлительно проконсультироваться с врачом.
Совместное применение с противокашлевыми средствами, такими как кодеин или декстрометорфан, не рекомендовано без предварительной консультации с врачом.
Пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка следует соблюдать осторожность.
Применение у детей
В случае длительного или возникающего повторно кашля у ребенка в возрасте 2-4 лет перед началом лечения необходима консультация врача для уточнения диагноза.

Важная информация о некоторых ингредиентах препарата
Гербион® сироп плюща содержит сорбитол (Е420). Пациентам с непереносимостью фруктозы не следует принимать данное лекарственное средство. Сорбитол может оказывать слабое слабительное действие.
Гербион® сироп плюща содержит глицерин, может вызвать головную боль, расстройство желудка и диарею (понос).
В препарате содержится небольшое количество этанола (спирта) - менее чем 100 мг на дозу 5 мл сиропа.
Беременность и лактация
В связи с отсутствием данных прием лекарственного средства во время беременности и лактации не рекомендован.
Влияние на способность к управлению автотранспортом и потенциально опасными механизмами.
Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Нет данных о взаимодействии с другими лекарственными средствами и продуктами питания.

Передозировка
Не принимайте дозы, превышающие рекомендованные.
Симптомы: если Вы приняли дозу, превышающую суточную дозу более чем в два раза, возможны тошнота, рвота, диарея, возбужденное состояние. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу.
Лечение симптоматическое.
Не принимайте двойную дозу сиропа, чтобы компенсировать пропущенный прием.
Если у Вас есть какие-либо вопросы касательно применения препарата, обратитесь к лечащему врачу.

Побочное действие
Подобно всем лекарственным средствам Гербион® сироп плюща может вызывать побочные эффекты, которые проявляются не у всех.
Часто (□1/100 до <1/10):
- тошнота, рвота, диарея.
Нечасто (□1/1000 до <1/100):
- аллергические реакции, проявляющиеся в виде крапивницы, кожной сыпи, купероза или затруднения дыхания.
В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.
Сообщения о предполагаемых побочных реакциях
В случае возникновения побочных реакций, пожалуйста, сообщите о них лечащему врачу. Это могут быть реакции, не указанные в листке-вкладыше.
Сообщая о побочной реакции, Вы помогаете собрать больше информации о безопасности препарата.

Условия хранения
Не требует особых условий хранения.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
2 года.
Сироп следует использовать в течение 3 месяцев после вскрытия флакона.
Не использовать позднее даты, указанной на упаковке.

Условия отпуска
Без рецепта врача.

Упаковка
150 мл сиропа в стеклянном флаконе с пластиковой крышкой, мерной ложкой и листком-вкладышем в картонной коробке.

Производитель
КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения.