

Листок-вкладыш: Информация для потребителя

Дексалгин® инъект 50 мг/2 мл, раствор для инъекций/инфузий

Декскетопрофен

Перед началом применения данного лекарственного препарата внимательно и полностью прочтите настоящий листок-вкладыш, поскольку в нем содержится важная для Вас информация.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.
- Если у Вас есть дальнейшие вопросы, обратитесь к своему врачу или работнику аптеки.
- Данный лекарственный препарат назначен только Вам. Не передавайте его другим людям. Это может нанести им вред, даже если у них такие же признаки заболевания, как и у Вас.
- При появлении у Вас каких-либо побочных действий обратитесь к своему врачу или работнику аптеки. Это касается также любых возможных побочных действий, не указанных в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

Содержание данного листка-вкладыша

1. Что представляет собой препарат Дексалгин® инъект и для чего он используется
2. Что следует знать перед использованием Дексалгин® инъект
3. Как применять препарат Дексалгин® инъект
4. Возможные побочные действия.
5. Как хранить препарат Дексалгин® инъект
6. Содержимое упаковки и дополнительная информация.

1 Что представляет собой препарат Дексалгин® инъект и для чего он используется

Препарат Дексалгин® инъект представляет собой болеутоляющее и, противовоспалительное средство, которое относится к группе лекарственных средств под названием «нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)».

Он используется для лечения при острой боли от средней до выраженной интенсивности, если прием таблеток не является целесообразным – например, при боли после операции, почечной колике (сильная боль в области почек) и боли в пояснице.

2 Что необходимо знать перед использованием препарата Дексалгин® инъект

Препарат Дексалгин® инъект нельзя использовать

- Если у Вас аллергия на декскетопрофен или на любой другой из компонентов данного лекарственного средства (перечислены в разделе б).
- Если у Вас аллергия на ацетилсалициловую кислоту или другие нестероидные противовоспалительные средства.
- Если у Вас после приема ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных средств имели место приступы астмы, острый аллергический ринит (кратковременное воспаление слизистой оболочки носа), носовые полипы (уплотнения в носу из-за аллергии), крапивница (кожная сыпь), ангионевротический отек (отек лица, в области глаз, губ или языка либо респираторный дистресс) или свистящее дыхание.
- Если у Вас имели место фотоаллергические или фототоксические реакции (особая форма покраснения кожи и/или образование пузырей на коже при воздействии солнечного света) во время использования кетопрофена (нестероидное противовоспалительное

лекарственное средство) или фибратов (лекарственные средства, используемые для снижения содержания жиров в крови).

- Если у Вас пептическая язва/кровотечение в желудке или кишечнике или, если у Вас в прошлом имели место кровотечения в желудке или кишечнике, язва или перфорация язвы.
- Если у Вас имеются хронические расстройства пищеварения (например, несварение, изжога).
- Если у Вас сейчас или в прошлом после приема нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) с целью ослабления боли имели место кровотечения в желудке или кишечнике или же перфорация.
- Если Вы страдаете хроническим заболеванием кишечника воспалительной природы (болезнь Крона или язвенный колит).
- Если у Вас тяжелая сердечная недостаточность, нарушения со стороны почек средней или тяжелой степени или же нарушения со стороны печени тяжелой степени.
- Если у Вас повышенная кровоточивость или нарушение свертываемости крови.
- Если Вы очень обезвожены (потеряли много жидкости) из-за рвоты, поноса или недостаточного потребления жидкости.
- Если у Вас последние три месяца беременности или Вы кормите грудью.

Предупреждения и меры предосторожности

Перед приемом препарата Дексалгин® инъект обратитесь за консультацией к своему врачу или работнику аптеки:

- Если Вы в прошлом страдали хроническим заболеванием кишечника воспалительной природы (язвенный колит, болезнь Крона).
- Если у Вас имеются или же имели место в прошлом другие нарушения со стороны желудка или кишечника.
- Если Вы принимаете другие лекарственные средства, повышающие риск развития язвенной болезни или кровотечения – например стероидные препараты для приема внутрь, некоторые антидепрессанты (типа СИОЗС, т.е. селективные ингибиторы обратного захвата серотонина), средства, препятствующие образованию сгустков крови (например, аспирин), или антикоагулянты (например, варфарин). В этом случае перед применением препарата Дексалгин® инъект проконсультируйтесь со своим врачом, который/которая, возможно, назначит Вам средство, оказывающее на желудок защитное действие (например, мизопростол или лекарственные средства, подавляющие выработку кислоты в желудке).
- Если у Вас имеются нарушения со стороны сердца, Вы перенесли инсульт или же считаете, что входите в эту группу риска (например, если у Вас повышенное артериальное давление, сахарный диабет, повышенный уровень холестерина или Вы курите), Вам следует обсудить лечение со своим врачом или работником аптеки; такие лекарственные средства, как Дексалгин® инъект, возможно, связаны с небольшим повышением риска сердечного приступа (инфаркт миокарда) или инсульта. Любой риск возрастает с повышением дозы препарата и увеличением продолжительности лечения. Не превышайте рекомендованные дозы и продолжительность лечения;
- Если Вы человек пожилого возраста, то риск возникновения побочных действий у Вас выше (см. раздел 4). При возникновении любого из них незамедлительно обратитесь к своему врачу.
- Если Вы страдаете аллергией или страдали ею в прошлом.
- Если у Вас имеются или же имели место в прошлом нарушения со стороны почек, печени или сердца (артериальная гипертензия и/или сердечная недостаточность), а также задержка жидкости в организме.
- Если Вы принимаете мочегонные средства или же у Вас обезвоживание и уменьшение объема крови вследствие значительной потери жидкости (например, из-за чрезмерного мочевыделения, поноса или рвоты).
- Если Вы женщина, страдающая по поводу проблем с детородной функцией (препарат Дексалгин® инъект в состоянии вызывать нарушение детородной функции, и поэтому Вам

не следует его принимать, если Вы планируете забеременеть или находитесь на обследовании по поводу детородной функции).

- Если у Вас первые или вторые три месяца беременности.
- Если у Вас имеют место нарушения образования крови и формирования клеток крови.
- Если у Вас системная красная волчанка или смешанное заболевание соединительной ткани (нарушения со стороны иммунной системы с поражением соединительной ткани).
- Если у Вас инфекция – см. ниже «Инфекционные заболевания».
- Если Вы страдаете астмой в сочетании с хроническим ринитом, хроническим синуситом и/или полипами носа, поскольку Вы подвержены более высокому риску аллергии на ацетилсалициловую кислоту и/или НПВС, чем остальные. При приеме данного препарата могут иметь место приступы астмы или спазм бронхов – особенно у пациентов с аллергией на ацетилсалициловую кислоту или НПВС.

Инфекционные заболевания

Прием препарата Дексалгин® инъект может скрадывать такие признаки инфекции, как повышенная температура тела и боль. В связи с этим возможно, что из-за приема препарата Дексалгин® инъект может произойти задержка начала лечения при инфекционном заболевании, что, в свою очередь, может повышать риск развития осложнений.

Это наблюдалось при пневмонии, вызванной бактериями и инфекционными заболеваниями кожи при ветряной оспе.

Если Вы принимаете данный лекарственный препарат и в это же время у Вас имеет место инфекционное заболевание, проявления которого продолжают беспокоить или даже усугубляются, немедленно обратитесь к врачу.

При ветряной оспе рекомендуется избегать приема данного лекарственного препарата.

Дети и подростки

Исследования по применению препарата Дексалгин® инъект у детей и подростков не проводились. Поэтому безопасность и эффективность препарата у детей и подростков не установлены, и в данной возрастной группе его применять не следует.

Другие лекарственные средства и Дексалгин® инъект

Если Вы принимаете сейчас, принимали недавно, или собираетесь принимать какие-либо другие лекарственные средства, включая препараты, отпускаемые без рецепта, сообщите об этом своему врачу или работнику аптеки. Существуют лекарственные средства, которые нельзя сочетать друг с другом, а есть такие, при совместном применении которых необходимо проведение коррекции дозы.

Если в дополнение к препарату Дексалгин® инъект Вы принимаете или же Вам вводят какие-либо из перечисленных ниже лекарственных средств, обязательно сообщите об этом своему врачу, стоматологу или работнику аптеки:

Нежелательные комбинации:

- ацетилсалициловая кислота, кортикостероиды или другие противовоспалительные лекарственные средства;
- варфарин, гепарин или другие лекарственные средства для предотвращения образования сгустков крови;
- литий, препараты которого используются для лечения при некоторых расстройствах настроения;
- метотрексат (препарат, применяемый при раке или в качестве иммунодепрессанта) в высоких дозах (15 мг в неделю);
- гидантоины и фенитоин, применяемые при эпилепсии;
- сульфаметоксазол, применяемый при бактериальных инфекциях;

Комбинации препаратов, при применении которых требуется осторожность:

- ингибиторы АПФ, мочегонные средства, и антагонисты рецепторов ангиотензина II, используемые при повышенном артериальном давлении и нарушениях со стороны сердца;
- пентоксифиллин и окспентифиллин, используемые для лечения при хронических язвах, имеющих место при заболеваниях вен;
- зидовудин, используемый для лечения при вирусных инфекциях;
- антибиотики из группы аминогликозидов, применяющиеся для лечения при бактериальных инфекциях;
- препараты сульфонилмочевины (например, хлорпропамид и глибенкламид), используемые для лечения при сахарном диабете;
- метотрексат в низких дозах – менее 15 мг в неделю;

Хорошо должно быть обосновано совместное применение следующих средств:

- хинолоновые антибиотики (например, ципрофлоксацин, левофлоксацин), применяющиеся для лечения при бактериальных инфекциях;
- циклоспорин или такролимус, применяющиеся для лечения при заболеваниях иммунной системы, а также при пересадке органов;
- стрептокиназа и другие тромболитические или фибринолитические лекарственные средства, т. е. препараты, используемые для разрушения кровяных сгустков;
- пробенецид, используемый для лечения при подагре;
- дигоксин, используемый для лечения при хронической сердечной недостаточности;
- мифепристон, применяемый в качестве средства, вызывающего аборт (прерывание беременности);
- антидепрессанты, относящиеся к группе селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС);
- антиагреганты, используемые для уменьшения прилипания тромбоцитов друг к другу и образования кровяных сгустков;
- бета-адреноблокаторы, используемые при повышенном артериальном давлении и нарушениях со стороны сердца;
- тенофовир, деферазирокс, пеметрексед;

Если у Вас появятся вопросы по поводу приема препарата Дексалгин® инъект вместе с другими лекарственными средствами, обратитесь к врачу или работнику аптеки.

Беременность, грудное вскармливание и детородная функция

Не используйте Дексалгин® инъект в течение последних трех месяцев беременности или в период кормления грудью.

Он может вызвать проблемы с почками и сердцем у Вашего будущего ребенка. Это может повлиять на склонность к кровотечениям у Вас и Вашего ребенка и привести к задержке начала родов или увеличению их продолжительности.

Вы не должны принимать препарат Дексалгин® инъект в течение первых 6 месяцев беременности, за исключением случаев крайней необходимости и по рекомендации лечащего врача. Если Вам необходимо лечение в этот период или в то время, когда Вы пытаетесь забеременеть, следует использовать самую низкую дозу в течение как можно более короткого времени. Если принимать препарат Дексалгин® более нескольких дней, начиная с 20 недели беременности, он может вызвать проблемы с почками у вашего будущего ребенка, что может привести к низкому уровню амниотической жидкости, которая окружает ребенка (маловодие) или сужению кровеносного сосуда (артериального протока) в сердце ребенка. Если Вам требуется лечение дольше нескольких дней, лечащий врач может рекомендовать установить дополнительное наблюдение.

Использование препарата Дексалгин® инъект женщинами, пытающимися забеременеть, или проходящими обследование по поводу бесплодия, не рекомендуется.

В отношении потенциального воздействия на детородную функцию у женщин см. также раздел 2 «Предупреждения и меры предосторожности».

Управление транспортными средствами и обслуживание механизмов

Поскольку при применении препарата Дексалгин® инъект в качестве его побочных эффектов возможно появление головокружения или состояния сонливости, он может оказывать незначительное влияние на Вашу способность к управлению транспортными средствами и обслуживанию механизмов. При появлении таких эффектов, воздержитесь от управления транспортными средствами и обслуживания механизмов до тех пор, пока эти симптомы не исчезнут. Проконсультируйтесь со своим врачом.

В препарате Дексалгин® инъект содержится этанол и натрий

В одной ампуле (2 мл) данного лекарственного препарата содержится до 200 мг спирта (этанол), что соответствует 3 мг/кг на дозу (10% мас./об.). Это количество в одной ампуле (2 мл) данного лекарственного препарата соответствует 5 мл пива или 2 мл вина.

Небольшое количество этилового спирта, содержащегося в этом препарате, не оказывает значимого действия.

В данном лекарственном препарате содержится менее, чем 1 ммоль натрия (23 мг) на единицу дозирования, то есть можно считать, что практически «натрий не содержится».

3 Как применять препарат Дексалгин® инъект

Всегда используйте данный препарат в точности так, как Вам рекомендовал Ваш врач или работник аптеки. Если у Вас имеются сомнения, проконсультируйтесь со своим врачом или работником аптеки.

Для ослабления симптомов следует принимать препарат в минимальной эффективной дозе при наименьшей длительности применения. Если у Вас инфекционное заболевание, незамедлительно обратитесь к врачу, если симптомы (такие, как повышенная температура тела и боль) сохраняются или происходит их усугубление (см. раздел 2).

Ваш врач должен назначить Вам Дексалгин® инъект в необходимой Вам дозе – в зависимости от вида, тяжести и продолжительности Ваших симптомов. Рекомендуемая доза, обычно, составляет 1 ампулу (50 мг) препарата Дексалгин® инъект каждые 8-12 часов. При необходимости инъекцию можно повторить уже через 6 часов.

Ни в коем случае не превышайте общую суточную дозу препарата Дексалгин® инъект, составляющую 150 мг (3 ампулы).

Используйте препарат в виде инъекции только в острый период (т.е. не более двух дней). По возможности переходите на болеутоляющие средства для приема внутрь.

У людей пожилого возраста с нарушением функции почек и пациентов с заболеваниями почек или печени общую суточную дозу препарата Дексалгин® инъект, равную 50 мг (1 ампула), превышать не следует.

Способ применения:

Дексалгин® инъект можно вводить внутримышечно или внутривенно (технические подробности о внутривенном введении см. в разделе 7).

При внутримышечном введении препарата Дексалгин® инъект его следует вводить сразу после того, как раствор набран из цветной ампулы; вводят глубоко в мышцу медленно.

Раствор можно использовать, только если он прозрачен и бесцветен.

Применение у детей и подростков

Данный лекарственный препарат не следует применять у детей и подростков до 18 лет.

Если Вам введен препарат Дексалгин® инъект в большем количестве, чем следовало

Если Вам введен данный препарат в чрезмерном количестве, немедленно сообщите об этом своему врачу или работнику аптеки либо обратитесь в приемное отделение ближайшей больницы. Не забудьте взять с собой упаковку данного препарата или этот листок-вкладыш.

Если Вы забыли ввести препарат Дексалгин® инъект

Не вводите препарат в двойной дозе для восполнения пропущенного введения. В следующее назначенное время введите препарат в положенной дозе (в соответствии с разделом 3 «Как применять препарат Дексалгин® инъект»).

Если у Вас имеются дальнейшие вопросы касательно применения данного препарата, обратитесь к своему врачу или работнику аптеки.

4 Возможные побочные действия

Как и все лекарственные средства, данный препарат может обладать побочными действиями, хотя они возникают не у всех.

Возможные побочные действия перечислены ниже в зависимости от частоты их возникновения.

Побочные действия, возникающие часто: могут наблюдаться у 1 из 10 человек

Тошнота и/или рвота, боль в месте инъекции, реакции в месте инъекции, в том числе воспаление, возникновение синяков или кровоизлияния.

Побочные действия, возникающие иногда: могут наблюдаться у 1 из 100 человек

Кровь в рвотных массах, пониженное артериальное давление, повышение температуры тела, помутнение поля зрения, головокружение, сонливость, нарушения сна, головная боль, анемия, боль в животе, запор, нарушения пищеварения, понос, сухость во рту, приливы крови, сыпь, дерматит, зуд, повышенная потливость, ощущение усталости, боли, ощущение холода.

Побочные действия, возникающие редко: могут наблюдаться у 1 из 1000 человек

Пептическая язва, кровотечение из пептической язвы или перфорация пептической язвы, повышенное артериальное давление, состояние обморока, очень редкое дыхание, воспаление поверхностных вен вследствие образования тромбов (тромбофлебит поверхностных вен), отдельные пропуски сокращений сердца (экстрасистолы), учащенное сердцебиение, периферические отеки, отек гортани, потеря аппетита (анорексия) неестественные ощущения, ощущение лихорадки и озноба, звон в ушах (тиннитус), зудящая сыпь, желтуха, угри, боль в спине, боль в области почек, частое мочеиспускание, нарушения менструального цикла, нарушения со стороны предстательной железы, скованность мышц, скованность суставов, мышечные судороги, отклонение от нормы результатов функциональных проб печени (анализы крови), повышенный уровень сахара в крови (гипергликемия), снижение уровня сахара в крови (гипогликемия), повышение содержания жиров (триглицеридов) в крови (гипертриглицеридемия), кетоновые тела в моче (кетонурия), белок в моче (протеинурия), поражение клеток печени (гепатит), острая почечная недостаточность.

Очень редко: могут наблюдаться у 1 из 10000 человек

Анафилактические реакции (реакции повышенной чувствительности вплоть до коллапса), появление язв на коже, во рту, в области глаз и половых органов (синдром Стивенса-Джонсона и синдром Лайелла), отек лица или губ и горла (ангионевротический отек), чувство нехватки воздуха из-за сокращения мышц дыхательных путей (бронхоспазм), одышка, панкреатит, кожные реакции повышенной чувствительности, в том числе реакции повышенной чувствительности к свету, повреждение почек, пониженный уровень лейкоцитов (нейтропения), пониженный уровень тромбоцитов (тромбоцитопения).

Незамедлительно сообщите своему врачу, если Вы в начале лечения заметите какие-либо побочные действия со стороны желудка/кишечника (например, боль в желудке, изжога или кровотечение) либо если у Вас уже имели место такие побочные действия при длительном применении противовоспалительных средств и, в особенности, если Вы человек пожилого возраста.

При обнаружении кожных высыпаний, любого другого повреждения слизистых оболочек (например, во рту) или признаков аллергии, использование препарата Дексалгин® инъект следует немедленно прекратить.

При лечении нестероидными противовоспалительными лекарственными средствами сообщалось о задержке жидкости в организме и отеках (особенно в области лодыжек и ног), повышении артериального давления и сердечной недостаточности.

Такие лекарственные средства, как Дексалгин® инъект, возможно, связаны с небольшим повышением риска сердечного приступа (инфаркт миокарда) или нарушения мозгового кровообращения (инсульт).

У пациентов, страдающих системной красной волчанкой или смешанным заболеванием соединительной ткани (нарушения со стороны иммунной системы, приводящие к изменениям соединительной ткани), на фоне применения противовоспалительных средств возможны, хотя и редко, повышение температуры тела, головная боль и скованность шеи в затылочной области.

Чаше всего наблюдаются нежелательные явления со стороны желудочно-кишечного тракта. Возможно появление пептических язв, перфорации язвы или желудочно-кишечного кровотечения, иногда со смертельным исходом – особенно у людей пожилого возраста. Имеются сообщения о появлении тошноты, рвоты, поноса, обильного отхождения газов, запора, диспепсии (нарушение пищеварения), боли в животе, дегтеобразного стула, рвоты с кровью, язвенного стоматита, а также об усугублении колита и болезни Крона после приема препарата. Реже наблюдается воспаление слизистой оболочки желудка (гастрит).

Как и в случае других НПВС, возможны реакции со стороны крови (пурпура, апластическая и гемолитическая анемия и в редких случаях – агранулоцитоз и гипоплазия костного мозга).

При появлении признаков инфекции или при ухудшении состояния на фоне применения препарата Дексалгин® инъект немедленно обратитесь к своему врачу.

Сообщение о побочных действиях

При появлении у Вас каких-либо побочных действий обратитесь к своему врачу или работнику аптеки. Это касается также любых возможных побочных действий, не указанных в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о побочном действии непосредственно через национальную систему оповещения. Сообщая о побочных действиях, Вы можете помочь собрать больше информации о безопасности данного лекарственного препарата.

5 Как хранить препарат Дексалгин® инъект

Данный лекарственный препарат храните в недоступном для детей месте.

Не используйте данное лекарственное средство после истечения срока годности, указанного на картонной коробочке и ампуле. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Срок годности: 60 месяцев.

Для защиты от воздействия света ампулы хранить во внешней картонной упаковке. При хранении данного лекарственного средства особого температурного режима не требуется.

Не используйте данное лекарственное средство, если Вы заметили, что раствор не является прозрачным и бесцветным и при этом имеются признаки ухудшения его качества (например, частицы). Дексалгин® инъект раствор для инъекций/инфузий предназначен для однократного применения, и его следует использовать сразу же после вскрытия упаковки. Весь неиспользованный препарат необходимо утилизировать (см. ниже подраздел «Утилизация»).

Никакие лекарственные препараты не выбрасывайте в канализацию или с бытовым мусором. Проконсультируйтесь с работником аптеки относительно мер по утилизации ненужных лекарств, а также использованных игл и шприцов. Эти меры способствуют защите окружающей среды.

6 Содержание упаковки и дополнительная информация.

Состав препарата Дексалгин® инъект

- Действующим веществом является декскетопрофен (в виде декскетопрофена трометамола). В одной ампуле содержится 50 мг декскетопрофена.
- Прочими компонентами являются спирт (этанол, см. раздел 2 «В препарате Дексалгин® инъект содержится этанол»), натрия хлорид, натрия гидроксид и вода для инъекций.

Внешний вид препарата Дексалгин® инъект и содержимое упаковки

Дексалгин® инъект представляет собой раствор для инъекций/инфузий.

Он выпускается в упаковках по 1, 5 или 10 ампул цветного стекла (стекло типа I); в одной ампуле содержится 2 мл прозрачного и бесцветного раствора.

В продаже могут находиться упаковки не всех размеров.

Ограничения на отпуск

Лекарственный препарат отпускается по рецепту.

Владелец регистрационного удостоверения

Менарини Интернэшнл Оперейшнз Люксембург С.А.
1, Авеню де ла Гар
1611 Люксембург
Люксембург

Производитель:

А. Менарини Мэнюфекчеринг Лоджистикс энд Сервисиз С.р.л.
Виа Сеттэ Санти, 3
50131 Флоренция (Флоренция)
Италия

Уполномоченный представитель:

БЕРЛИН-ХЕМИ АГ
Глиникер Вег 125
12489 Берлин, Германия

Дата последней редакции данного листка-вкладыша: 09.2022

7 Информация для работников системы здравоохранения

Следующая информация предназначена только для работников системы здравоохранения:

Внутривенное применение:

Внутривенная инфузия: содержимое одной ампулы (2 мл) препарата Дексалгин® инъект разводят в 30-100 мл физиологического раствора, 5%-го раствора глюкозы или раствора Рингера-лактата. Разведенный раствор следует вводить в виде медленной внутривенной инфузии в течение 10-30 мин. Раствор должен быть всегда защищен от воздействия естественного дневного света.

Внутривенная инъекция (болюсное введение): при необходимости содержимое одной ампулы (2 мл) препарата Дексалгин® инъект вводят медленно внутривенно струйно в течение не менее 15 секунд.

Внутримышечное введение:

Содержимое одной ампулы (2 мл) препарата Дексалгин® инъект вводят медленно глубоко в мышцу.

Из-за возможного появления анафилактических реакций вплоть до шока, пациент должен находиться под наблюдением в течение не менее одного часа после введения препарата Дексалгин® инъект; при этом функциональный набор скорой помощи держат наготове. Пациенту следует сообщить о целях данной меры. В зависимости от симптомов, любое необходимое в таких случаях лечение должно проводиться врачом с соответствующей специализацией.

Дексалгин® инъект – из-за содержания в нем этанола – противопоказан для нейроаксиального (интратекального или эпидурального) введения.

Указания по обращению с препаратом:

При внутривенной инъекции препарата Дексалгин® инъект (болюсное введение) раствор следует вводить сразу после того, как он набран из цветной ампулы.

Для внутривенной инфузии раствор следует развести в асептических условиях, не допуская воздействия естественного дневного света.

Раствор можно использовать, только если он прозрачен и бесцветен.

Совместимость:

Дексалгин® инъект можно **смешивать в малых объемах** (например, в шприце) с инъекционными растворами гепарина, лидокаина, морфина и теофиллина.

Раствор для инъекций, разведенный в соответствии с указаниями, представляет собой прозрачный раствор. Дексалгин® инъект, разведенный в **100 мл** физиологического раствора или раствора глюкозы, можно смешивать с инъекционными растворами дофамина, гепарина, гидроксизина, лидокаина, морфина, петидина и теофиллина.

При хранении разведенных растворов препарата Дексалгин® инъект в пластиковых пакетах или в приспособлениях для введения, изготовленных из этилвинилацетата (ЭВА), пропионата целлюлозы (ПЦ), полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) и поливинилхлорида (ПВХ), абсорбции действующего вещества не обнаружено.

Срок годности после вскрытия упаковки:

Разведенный раствор сохраняет свои химические свойства в течение 24 часов при температуре 25°C при условии, что он защищен от воздействия естественного дневного света. С учетом аспекта микробиологической чистоты раствор следует использовать сразу после приготовления. Если раствор не использован немедленно, то ответственность за продолжительность и условия его хранения перед применением ложится на пользователя. Как правило, раствор хранится не более 24 часов при температуре 2-8°C, кроме тех случаев, когда его разведение проводили в контролируемых и валидированных асептических условиях.