



ՀՀ, Երևան 0079, Միկոյան փ. 13
RA, Yerevan 0079, ul. Mikoyan 13
Հեռ./Տեղ /Tel.: (+374 10) 67 39 03
E - mail: info@escopharm.am
Website: www.escopharm.am

«ԷՍԿՈ-ՖԱՐՄ» ՍՊԸ • «ЭСКО-ФАРМ» ООО • «ESCO-PHARM» LLC

ГЛИЦЕРИН

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВА

Название лекарства

Глицерин

Международное непатентованное название

Глицерол (Glycerol)

Основной синоним

Глицерин, Глицерол

Состав на 100 г

Активное вещество – 90 г глицерин.

Вспомогательное вещество – 10 г вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор для наружного и местного (микроклизма) применения

Фармакотерапевтическая группа

Препарат с дерматопротекторным и смягчающим кожу действием

Код АТХ - D11AX, A06AG04

Терапевтические показания

Запоры различного генеза (в т.ч. привычные, возрастные, при ограниченной подвижности).

Сухость кожи (для наружного применения).

Способы применения и режим дозирования

Ректально – детям до 6 лет вводят до 5 мл, взрослым и детям старше 6 лет 5 - 15 мл,

1 раз в день, желательно через 15 - 20 мин после завтрака.

Способ ректального применения: микроклизма 5мл и 10мл готова к применению. Необходимо вскрыть полиэтиленовый пакет, снять крышечку с аппликатора и использовать необходимый объем. Микроклизма предназначена для одноразового применения.

Наружно - смазывают пораженные участки по мере необходимости.

Противопоказания

При ректальном применении - геморрой в фазе обострения, трещины заднего прохода, воспалительные заболевания и опухоли прямой кишки;

При наружном применении - повышенная чувствительность к глицеролу.

Специальные предостережения и особые меры предосторожности

Регулярное применение в качестве слабительного средства не рекомендуется. При применении в качестве слабительного средства лечение прекращают после восстановления нормальной перистальтики кишечника. В качестве слабительного средства не принимать более одной недели.

Взаимодействия

Клинически значимое взаимодействие с какими-либо другими лекарствами не описано, но нежелательно одновременное назначение с другими лекарственными средствами для наружного применения.

Применение при беременности и кормлении грудью

Глицерин можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания, однако перед применением препарата необходимо обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами

Препарат не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Побочные действия

При длительном наружном применении: раздражение, аллергические реакции.

При длительном ректальном применении: явления раздражения прямой кишки, ослабление физиологического процесса дефекации.

Передозировка.

Данных о симптомах передозировки препарата нет.

Фармакологическое действие

Слабительное средство для местного применения. Оказывает легкое раздражающее действие на слизистую оболочку прямой кишки и рефлекторно стимулирует перистальтику. Способствует размягчению каловых масс.

При наружном применении оказывает дерматопротекторное действие, смягчает кожу.

Фармакокинетика

Глицерол практически не всасывается в кожу, но хорошо абсорбируется слизистыми оболочками.

Вспомогательные вещества

Вода очищенная

Несовместимость

Глицерин несовместим: с цинка окисью - под влиянием света разлагается до альдегида, с перекисью водорода - окисление до щавелевой и винной кислот; при сочетании с натрия тетраборатом образуется смесь натрия глицеробората и глицероборной кислоты, обладающей сильноокислой реакцией.

Упаковка

По 100мл в пластиковых флаконах; по 30мл в стеклянных флаконах; по 5 мл и 10мл в пластмассовых тарах (микроклизма), упакованных в индивидуальные полиэтиленовые пакеты.

Условия хранения

Хранить при температуре 15- 25°C, недоступном для детей месте.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке!

Срок годности – 4 года.

Условия отпуска из аптек – Отпускается без рецепта врача.

Производитель

ООО “ЭСКО-ФАРМ”

Республика Армения, Ереван 0079, 5-ый Нор Норкский массив, ул. Микояна 13

Тел.: (+37410) 673903; e-mail: farm-esco@mail.ru

Держатель регистрационного сертификата

ООО “ЭСКО-ФАРМ”

Республика Армения, Ереван 0079, 5-ый Нор Норкский массив, ул. Микояна 13

Тел.: (+37410) 673903; e-mail: farm-esco@mail.ru

Дата последнего пересмотра документации

27.08.2019