

# ԴԵՏՐԱԼԵՔՍ 1000 մգ

Թաղանթապատ դեղահատ  
(ֆլավոնոիդային միկրոնիզացված մաքրված ֆրակցիա)

Ուշադիր կարդացեք ներդիր-թերթիկն ամբողջությամբ՝ նախքան դեղի ընդունումը, քանի որ այն պարունակում է կարևոր տեղեկատվություն:

Դետրալեքսը դեղատնից բաց է թողնվում առանց դեղատոմսի: Այնուամենայնիվ, լավագույն արդյունք ստանալու համար պետք է այն օգտագործել զգուշությամբ:

- Պահեք այս ներդիր-թերթիկը: Հնարավոր է այն կրկին կարողալու կարիք լինի:
- Եթե ունեք լրացուցիչ հարցեր, դիմեք բժշկի կամ դեղագետի:
- Եթե հիվանդության ախտանիշները վատթարացել են կամ չեն բարելավվել, դիմեք բուժող բժշկին կամ դեղագետին:
- Եթե ի հայտ է եկել որևէ կողմնակի ազդեցություն, այդ թվում նաև այնպիսիները, որոնք թվարկված չեն այս ներդիր-թերթիկի 4-րդ բաժնում, ապա խորհրդակցեք բժշկի կամ դեղագետի հետ:

## Ինչ բովանդակություն ունի այս ներդիր-թերթիկը

1. Ինչ է Դետրալեքս դեղը և ինչի համար է այն օգտագործվում:
2. Ինչ պետք է իմանալ Դետրալեքս դեղն ընդունելուց առաջ:
3. Ինչպես ընդունել Դետրալեքս դեղը:
4. Ինչպիսի կողմնակի ազդեցություններ կարող են առաջանալ:
5. Ինչպես պահել Դետրալեքս դեղը:
6. Ինչ է պարունակում դեղի փաթեթը և այլ տեղեկություններ:

## 1. ԻՆՉ Է ԴԵՏՐԱԼԵՔՍ ԴԵՂԸ ԵՎ ԻՆՉԻ ՀԱՄԱՐ Է ԱՅՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ

### Դեղաբուժական խումբ

Մազանոթները կայունացնող դեղեր, կենսաֆլավոնոիդներ:

### Անատոմիական բուժական քիմիական ծածկագիր

C05CA53

Դետրալեքսը ցուցված է՝

- ստորին վերջույթների երակների քրոնիկական ֆունկցիոնալ և օրգանական անբավարարության ախտանիշների (ծանրություն և ցավ ուղեկցող, գիշերային ջղաձգումներ) բուժման համար,
- թուրքի սուր նոպայի ֆունկցիոնալ ախտանիշների բուժման համար:

## **2. ԻՆՉՊԵՏՔ Է ԻՄԱՆԱԼ ԴԵՏԲԱԼԵՔՍ ԴԵՂՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ**

Մի օգտագործեք Դետրալեքս դեղը, եթե հայտնի է, որ ունեք ալերգիա (գերզգայնություն) ակտիվ բաղադրատարրի կամ օժանդակ նյութերից որևէ մեկի նկատմամբ (դրանք թվարկված են ստորև «Ինչ է պարունակում դեղի փաթեթը և այլ տեղեկություն» ճ-րդ բաժնում):

### **Կիրառման հատուկ հրահանգներ և նախազգուշացումներ**

Հոսպիտալացված կամ անշարժացված պացիենտների կողմից Դետրալեքսի ընդունումը կարող է անբավարար լինել ֆլեքիտի զարգացման ռիսկը կանխելու համար:

Երակային անբավարարության դեպքում կարող է պահանջվեն հատուկ միջոցառումներ. օրինակ՝ առաձգական գուլպաներ կրելու անհրաժեշտություն:

Եթե թուրքի բուժման ընթացքում հետանցքից արյունահոսությունը և ցավը չեն դադարում, դիմեք բժշկի, քանի որ այդ ախտանիշները կարող են պայմանավորված լինեն այլ հիվանդությամբ:

50 տարեկանից բարձր պացիենտները, որոնք առանց տեսանելի պատճառների ունենում են արյունահոսություն հետանցքից, պետք է խորհրդակցեն բժշկի հետ:

Անոռեկտալ հատվածի այլ հիվանդությունների բուժումը չի կարող փոխարինվել թուրքի սուր նոպայի ախտանիշային բուժման նպատակով Դետրալեքսի ընդունմամբ:

Եթե ախտանիշներն արագ չեն անհետանում, անհրաժեշտ է իրականացնել պրոկտոլոգիական հետազոտություն և վերանայել բուժումը:

### **Դետրալեքս դեղի և այլ դեղերի միաժամանակյա կիրառում**

Տեղյակ պահեք բժշկին կամ դեղագետին, եթե ընդունում եք, վերջերս ընդունել եք կամ պատրաստվում եք ընդունել որևէ այլ դեղ՝ ներառյալ առանց դեղատոմսի ձեռք բերված դեղերը:

### **Կիրառումը հղիության և կրծքով կերակրման շրջանում**

Եթե հղի եք կամ կերակրում եք կրծքով, ենթադրում եք, որ հղի եք կամ պլանավորում եք հղիություն, ապա Դետրալեքս դեղի ընդունումից առաջ խորհրդակցեք բուժող բժշկի կամ դեղագետի հետ:

### **Հղիություն**

Կանխարգելիչ նկատառումներով ցանկալի չէ Դետրալեքս դեղն օգտագործել հղիության ընթացքում:

### **Կրծքով կերակրման շրջան**

Քանի որ Դետրալեքսի՝ մարդու կրծքի կաթ ներթափանցելու վերաբերյալ տվյալները բացակայում են, կրծքով կերակրման շրջանում անհրաժեշտ է խուսափել Դետրալեքսի օգտագործումից:

### **Ազդեցություն ուշադրություն պահանջող գործողությունների վրա (փոխադրամիջոցների վարում, սարքավորումների հետ աշխատանք)**

Դետրալեքսը չի ազդում փոխադրամիջոցների վարման և սարքավորումների հետ աշխատանքների վրա, կամ այդ ազդեցությունն աննշան է:

## **3. ԻՆՉՊԵՏ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ԴԵՏԲԱԼԵՔՍ ԴԵՂԸ**

Դեղն անհրաժեշտ է օգտագործել բժշկի նշանակմանը և դեղագետի ցուցումներին համապատասխան: Եթե համոզված չեք, թե ինչպես պետք է դեղն ընդունել, դիմեք բժշկի կամ դեղագետի:

## Դեղաչափ

Երակների քրոնիկական հիվանդությունների դեպքում անհրաժեշտ է ընդունել 1 դեղահատ, օրական մեկ անգամ, նախընտրելի է առավոտյան՝ ուտելու ընթացքում:

Թուրքի սուր նոպայի դեպքում առաջին 4 օրվա ընթացքում անհրաժեշտ է ընդունել 1 դեղահատ, օրական 3 անգամ (առավոտյան, կեսօրին և երեկոյան), ապա հաջորդ 3 օրերի ընթացքում՝ 1 դեղահատ, օրական 2 անգամ (առավոտյան և երեկոյան): Դեղն անհրաժեշտ է ընդունել ուտելու ընթացքում:

## Ընդունման եղանակը

Դեղահատը նախատեսված է ներքին ընդունման համար:

## Ընդունման տևողությունը

Բժիշկը կամ դեղագետը տեղեկացրել են դեղի ընդունման տևողության վերաբերյալ: Եթե անհրաժեշտ է դադարեցնել դեղի ընդունումը, ապա խորհրդակցեք բժշկի կամ դեղագետի հետ:

## **Եթե զերազանցել եք դեղաչափը**

Եթե Դետրալեքսի ավելի շատ դեղահատ եք ընդունել, քան պահանջվում է, ապա անհապաղ տեղեկացրեք բուժող բժշկին կամ դեղագետին:

Դետրալեքսի գերդեղաչափման վերաբերյալ տվյալները սահմանափակ են. հաղորդվել են այնպիսի ախտանիշներ, ինչպիսիք են՝ փորլուծություն, սրտխառնոց, ցավ որովայնում, քոր և ցան:

## **Եթե դուք մոռացել եք ընդունել Դետրալեքս դեղը**

Եթե մոռացել եք ընդունել դեղահատը, ապա այն պարզապես ընդունեք հաջորդ ընդունման համար նախատեսված ժամին: Չի կարելի ընդունել կրկնակի դեղաչափ՝ բաց թողնված դեղաչափը լրացնելու նպատակով:

Եթե դեղի օգտագործման հետ կապված հարցեր են առաջացել, դիմեք բուժող բժշկին կամ դեղագետին:

## **4. ԻՆՉՊԻՍԻ ԿՈՂՄՆԱԿԻ ԱԶԻԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ**

Ինչպես բոլոր դեղերը, Դետրալեքսը նույնպես կարող է առաջացնել կողմնակի ազդեցություններ, թեև ոչ բոլոր պացիենտների մոտ դրանք կարող են դրսևորվել:

Ըստ հանդիպման հաճախականության կողմնակի ազդեցությունները դասակարգվում են հետևյալ կերպ.

**հաճախ հանդիպող կողմնակի ազդեցություններ ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ )**՝ փորլուծություն, մարսողության խանգարում, սրտխառնոց, փսխում,

**ոչ հաճախ հանդիպող կողմնակի ազդեցություններ ( $\geq 1/1000$ ,  $< 1/100$ )**՝ կոլիտ (հաստ աղու բորբոքում),

**հազվադեպ հանդիպող կողմնակի ազդեցություններ ( $\geq 1/10000$ ,  $< 1/1000$ )**՝ զլխապտույտ, զլխացավ, տկարություն, ցան, քոր, եղնջացան,

**անհայտ հաճախականությանը կողմնակի ազդեցություններ (առկա տվյալների հիման վրա հնարավոր չէ գնահատել հաճախականությունը)**՝ դեմքի, շուրթերի, կոպերի սահմանափակ այտուց, ցավ որովայնում, եզակի դեպքերում՝ Կվինկեի այտուց:

## **Կասկածելի կողմնակի ազդեցությունների վերաբերյալ հաղորդում**

Կողմնակի ազդեցության ի հայտ գալու դեպքում այդ մասին տեղեկացրեք բժշկին կամ դեղագետին: Դա վերաբերում է նաև այս ներդիր-թերթիկում չնշված որևէ այլ կողմնակի ազդեցությանը: Դուք կարող եք կողմնակի ազդեցության մասին ուղղակիորեն առցանց հաղորդել է. Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն՝ հետևյալ հղումով. [www.pharm.am](http://www.pharm.am) կամ զանգահարել թեժ գիծ՝ հետևյալ հեռախոսահամարներով. (+374 10) 20 05 05 և (+374 96) 22 05 05:

Կողմնակի ազդեցության մասին կարելի է հաղորդել նաև դեղի գրանցման հավաստագրի իրավատիրոջը՝ Լես Լաբորատորիես Սերվիե, նամակ ուղարկելով Ֆրանսիա, 92284 Սուրեն սեղեքս, Կարնո փ., շենք 50 հասցեով:

Կողմնակի ազդեցությունների մասին հաղորդելով՝ դուք նպաստում եք այս դեղի անվտանգության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվության ապահովմանը:

## **5. ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՃԵԼ ԴԵՏՐԱԼԵՔՍ ԴԵՂԸ**

Դետրալեքսը պահեք երեխաների համար անտեսանելի և անհասանելի տեղում:

Պիտանիության ժամկետը 4 տարի է:

Մի օգտագործեք դեղը փաթեթի վրա նշված պիտանիության ժամկետի ավարտից հետո:

Դեղը պահեք իր փաթեթում՝ 30 °C ջերմաստիճանից ցածր պայմաններում:

## **6. ԻՆՉ Է ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ ԴԵՂԻ ՓԱԹԵԹԸ ԵՎ ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ**

### **Ինչ է պարունակում Դետրալեքս դեղը**

Դեղի ակտիվ բաղադրատարրը.

Ֆլավոնոիդային միկրոնիզացված մաքրված ֆրակցիա – 1000 մգ, այդ թվում՝

- դիոսմին – 900 մգ,
- ֆլավոնոիդներ (հեսպերիդինի ձևով) – 100 մգ:

Օժանդակ նյութերն են՝ ժելատին, մագնեզիումի ստեարատ, միկրոբյուրեղային ցելյուլոզա, օսլայի նատրիումի գլիկոլյատ, գլիցերին, պոլիէթիլենգլիկոլ 6000, հիպրոմելոզա, երկաթի կարմիր օքսիդ (E172), նատրիումի լաուրիլսուլֆատ, տիտանի երկօքսիդ (E171), երկաթի դեղին օքսիդ (E172):

### **Ինչ տեսք ունեն Դետրալեքսի դեղահատերը և ինչ է պարունակում փաթեթը**

Սարնջավարդագույն թաղանթապատ դեղահատ:

Յուրաքանչյուր բլիստերում առկա է 9 կամ 10 թաղանթապատ դեղահատ: 18, 30 կամ 60 դեղահատերով բլիստերները տեղադրված են սովորաբար թուփի մեջ՝ դեղի օգտագործման հրահանգի (ներդիր թերթիկի) հետ միասին:

Շուկայում ոչ բոլոր տուփերը կարող են առկա լինել:

### **Գրանցման հավաստագրի իրավատեր**

Լես Լաբորատորիես Սերվիե

Ֆրանսիա, 92284 Սուրեն սեղեքս, Կարնո փ., շենք 50

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex France

### **Արտադրող**

Լես Լաբորատորիես Սերվիե Ինդուստրի,

Ֆրանսիա, 45520 Ժիդի, Սարան մ., 905

Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran, 45520 Gidy France

Ներդիր-Թերթիկի վերջին խմբագրման ամսաթիվը՝ 01.2019