

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(Информация для потребителей)
СЕНАДЕКСИН
таблетки
Сеннозиды А и В

Следует прочитать внимательно этот листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данный лекарственный препарат, так как он содержит важную информацию для вас.

- Следует сохранить этот листок-вкладыш. Возможно, его придется прочитать еще раз.
- Если у Вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы, следует обратиться к лечащему врачу или фармацевту.
- Данный лекарственный препарат выписан для Вас. Не следует давать его другим лицам. Он может навредить им, даже если у них схожие симптомы.
- Если у вас появились какие-либо побочные эффекты, обратитесь к вашему врачу или фармацевту. Возможны побочные эффекты, не перечисленные в этом листке-вкладыше (см. раздел 4).

Содержание листка-вкладыша:

1. Что такое Сенадексин и для чего он применяется.
2. Что необходимо знать перед применением Сенадексина.
3. Как принимать Сенадексин.
4. Возможные побочные эффекты.
5. Как хранить Сенадексин.
6. Содержимое упаковки и дополнительная информация.

1. Что такое Сенадексин и для чего он применяется

В качестве активного вещества Сенадексин содержит сумму кальциевых солей сеннозидов А и В из кассии (сенны) остролистной листьев в пересчете на сухое вещество 20,0 %. Оказывает слабительное действие, которое обусловлено антрагликозидами (в основном сеннозидами А и В), а также другими гликозидами. При применении внутрь гликозиды сенны проходят через желудок и тонкий кишечник в неизменённом виде, не всасываясь.

В толстом кишечнике антрагликозиды расщепляются кишечными бактериями на фармакологически активные антроны и антранолы, которые раздражают интерорецепторы толстой кишки, усиливают перистальтику и ускоряют опорожнение кишечника. Антроны и антранолы препятствуют всасыванию воды и электролитов, способствуют диффузии воды в просвет кишечника. Вследствие осмотического эффекта происходит разрыхление каловых масс и увеличение их объема, способствующее послабляющему эффекту антрагликозидов.

Слабительное действие проявляется через 6-10 часов. При длительном применении препарата интенсивность его действия может снижаться вследствие уменьшения содержания калия в организме.

Метаболиты антрагликозидов сенны практически не всасываются, в основном выводятся с калом, а также с мочой. Выводятся также с потом, проникают в грудное молоко.

➤ Применяют при хроническом запоре, гипо- и атонии кишечника, для регулирования стула при геморрое, проктите и анальных трещинах, для очищения кишечника перед диагностическими и лечебными процедурами.

2. Что необходимо знать перед применением Сенадексина

Не принимайте Сенадексин, если у Вас

- Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;
- Маточные кровотечения;
- Кишечная непроходимость;
- Спастический запор;
- Острые воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит, аппендицит);
- Перитонит;
- Пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
- Желудочно-кишечные кровотечения;
- Ущемленная грыжа;
- Цистит;
- Боль в области живота неустановленного генеза;
- Тяжелые нарушения водно-электролитного баланса;
- Беременность;
- Период грудного вскармливания;
- Дефицит лактазы;
- Непереносимость лактозы;
- Глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- Возраст до 12 лет.

С осторожностью

Лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов.

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

- Сахарный диабет;
- Заболевания печени и/или почек;

Применение препарата у детей

- Возраст от 12 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом.

Препарат рекомендуется применять только в том случае, если нормализации стула не удается добиться изменением диеты или применением препаратов, увеличивающих объем кишечного содержимого.

При длительном применении препарата может развиться привыкание, в связи, с чем его прием целесообразно чередовать с другими слабительными средствами.

Больным сахарным диабетом необходимо учитывать, что в одной таблетке содержится около 0,17 г углеводов (0,014 ХЕ).

Специальные предостережения: Если у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата. Содержит 0,0340 г лактозы на дозу, что необходимо учитывать пациентам с сахарным диабетом (лактозы моногидрат).

Может вызывать аллергические реакции (в том числе, отсроченные) и, в исключительных случаях, бронхоспазм (метилпарагид-роксibenзоат (нипагин)).

Другие лекарственные препараты и Сенадексин

При длительном применении или применении в высоких дозах препарат усиливает эффект сердечных гликозидов и антиаритмических средств вследствие снижения содержания калия в организме, нарушает абсорбцию антибиотиков тетрациклинового ряда.

При одновременном применении с тиазидными диуретиками, гормонами коры надпочечников и препаратами солодки повышается риск развития гипокалиемии.

Снижает эффективность препаратов, которые медленно всасываются в желудочно-кишечном тракте.

Беременность и грудное вскармливание

Применение препарата у беременных противопоказано в связи с более высокой вероятностью развития побочных эффектов (абдоминальные боли, диарея). На время лечения препаратом кормление грудью рекомендуется прекратить, так как компоненты препарата могут проникать в грудное молоко и вызывать частый стул у младенца.

Вождение автотранспорта и управление механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. Как принимать Сенадексин

Всегда принимайте препарат именно так, как Вам порекомендовал Ваш лечащий врач или фармацевт. Если у вас есть сомнения по поводу приема препарата, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или фармацевтом. Подходящую для вас дозу определит Ваш лечащий врач в зависимости от вашего состояния.

Принимают внутрь, один раз в сутки вечером перед сном, запивая водой.

Взрослым и детям старше 12 лет – по 1-2 таблетки; при отсутствии эффекта дозу увеличивают до 2-3 таблеток на прием. Максимальная суточная доза – 3 таблетки.

Следует применять наименьшую дозу, необходимую для получения мягкого кала. В процессе подбора одну и ту же дозу следует применять в течение нескольких дней и при отсутствии эффекта постепенно увеличивать дозу на ½ таблетки. Если при применении максимальной дозы в течение трех дней дефекации не происходит, необходимо обратиться к врачу. Не следует применять препарат более двух недель.

При необходимости курсового применения препарата по рекомендации врача, после двух недель применения следует сделать перерыв на две недели.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данный листок-вкладыш. Не принимайте больше, чем рекомендовал Ваш врач.

Передозировка

Симптомы: диарея, рвота, боли в области живота, нарушение водно-электролитного баланса.

Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия, восполнение жидкости и электролитов (особенно калия) для восстановления водно-электролитного равновесия.

4. Возможные побочные эффекты.

- Со стороны желудочно-кишечного тракта: спастические боли в животе, тошнота, рвота, диарея, метеоризм, атония толстого кишечника, пигментация толстого кишечника (отложения пигмента меланина в слизистой оболочке толстой кишки).
- Аллергические реакции: кожный зуд, эритема, кожная сыпь.
- Со стороны мочеполовой системы: желтовато-коричневое или красноватое окрашивание мочи (за счет метаболитов, выводящихся почками; это не является патологическим признаком и проходит после отмены препарата), протеинурия, гематурия (при длительном применении, особенно в высоких дозах).
- Нарушения метаболизма: гиповолемия, гипокалиемия, (при длительном приеме, особенно в высоких дозах, на фоне приема диуретиков, кортикостероидов и сердечных гликозидов), вторичный гиперальдостеронизм.
- Прочие: утомляемость, спутанность сознания, мышечные судороги (при длительном применении).

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

5. Как хранить Сенадексин

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 3 года. Не применять по истечении срока годности.

6. Содержимое упаковки и дополнительная информация.

Состав на 1 таблетку: **Активный компонент:** сенадексин [сумма кальциевых солей сеннозидов А и В из кассии (сенны) остролистной листьев в пересчете на сухое вещество 20,0 %] – 0,07 г.

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, лактозы моногидрат, тальк, кальция стеарат, магния стеарат, ванилин, метилпарагидроксибензоат.

Как выглядит Сенадексин и содержимое упаковки:

Таблетки круглые плоскоцилиндрической формы с фаской и риской, от серовато-коричневого до коричневого цвета с более темными и более светлыми вкраплениями со слабым характерным запахом.

Описание упаковки

Таблетки. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку. 2 или 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 60 или 140

контурных ячейковых упаковок вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку или в ящик из картона.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/предприятие, принимающее претензии

Закрытое акционерное общество «ВИФИТЕХ» (ЗАО «ВИФИТЕХ»), Московская обл., Серпуховский муниципальный район, район рабочего поселка Оболенск, шоссе Оболенское, стр. 20, Россия.

Тел./факс: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Владелец регистрационного удостоверения

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Адрес: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел./факс: (495) 716-15-81, 716-15-90.