

	ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և Դեղագործական Քիմիայի Գիտատեխնոլոգիական Կենտրոնի Ա. Լ. Մնջոյանի անվ. Նուրբ Օրգանական Քիմիայի Ինստիտուտ ՊՈԱԿ	էջ՝
	Կ ա պ Ր Ո Ֆ է Ր լուծույթ, դեղի բժշկական կիրառման հրահանգ	

ԿԱՊՐՈՖԵՐ
CAPROFERR
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ

Դեղի ապրանքային անվանումը

Կապրոֆեր (Caprofer)

Քիմիական անվանումը

Եռաքլոր երկաթի (վեցմոլեկուլ բյուրեղաջրով) և ϵ – ամինակապրոաթթվի խառնուրդ՝ նատրիումի քլորիդի իզոտոնիկ լուծույթում

Դեղի միջազգային չափաբանությունը

Caprofer

Ֆիզիկա-քիմիական հատկությունները

Մուգ շագանակագույն յուրահատուկ հոտով, տալուդ, թթվաշ համով կիսաթափանցիկ հեղուկ

Դեղաձևը

Արտաքին օգտագործման լուծույթ

Թողարկման ձևը

20 մլ լուծույթ սրվակներով՝ արտաքին օգտագործման համար

Քանակական կազմը

Ակտիվ բաղադրամասեր. (1 մլ-ում պարունակվում է)

- Եռաքլորեկաթվեցմոլեկուլբյուրեղաջրով՝ 0,947 գ
- ϵ – ամինակապրոաթթու՝ 0,024 գ

Օժանդակ բաղադրամասեր

- նատրիումի քլորիդի իզոտոնիկ լուծույթ 0,9 % - 0,448 գ

ԱՐՔ / ATC ծածկագիրը

B02BC

Դեղաբուժական խումբը

Տեղային արնեկանգ (հեմոստատիկ) միջոց

Դեղաբանական ազդեցությունը (դեղադինամիկա)

Կապրոֆերը օժտված է տեղային արնեկանգ ազդեցությամբ, որը հասնումնում է անմիջապես տեղային օգտագործումից հետո: Պատրաստուկը արյան հետ փոխազդելիս առաջացած մակարդուկը ֆիքսվում է վերքի մակերեսին՝ կանխելով կրկնակի արյունահոսությունը և երկրորդային ինֆեկցիաների ներթափանցումը: Խթանում է վերականգնողական (ռեգեներացիոն) պրոցեսը և վերքի մակերեսի հետ վիրահատական էպիթելիզացիան, նպաստում է հատիկավոր (գրանուլյացիոն) հյուսվածքի ձևավորմանը: Պատրաստուկը թողնում է նաև հակաբորբոքային, հակաալոոցային, հակասնկային և բակտերիաստատիկ ազդեցություն:


Դեղակիներական

Չեն կատարվել

Կիրառման ցուցումները

Կիրառվում է առամնաբուժական պրակտիկայում՝ որպես բարձրաէֆֆեկտիվ տեղային նեմոստատիկ միջոց՝ օժտվա ծակաբորբոքային և հակաալոոցային ազդեցությամբ:

- Ատամի հեռացումից հետո առաջացող երկրորդային, կրկնակի արյունահոսություններ
- Վիրաբուժությանմեջ. ընդհանուր դիմաձնոտային, արյունահոսություններ

	ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և Դեղագործական Քիմիայի Գիտատեխնոլոգիական Կենտրոնի Ա. Լ. Մնջոյանի անվ. Նուրբ Օրգանական Քիմիայի Ինստիտուտ ՊՈԱԿ	Էջ՝
	Կ ա պ ռ Ֆ է Ր լուծույթ, դեղի բժշկական կիրառման հրահանգ	

- Հենքային հիվանդություններ (գերճնշումային հիվանդություն, արտահայտված արյունահոսություններ) ունեցող հիվանդների մոտ երկրորդային արյունահոսությունը կան խարգելելու նպատակով
- Արյան մակարդման համակարգի ախտահարմամբ հիվանդների մոտ ատամնաբուժական միջամտությունների ժամանակ, ընդհանուր հեմոթերապիայի հետ զուգակցմամբ
- Պոլիպիտների բուժման ժամանակ
- Պարադոնտիտների բուժման ժամանակ
- Մաշկի կանդիդոզ, այրվածքներ

Օգտագործման եղանակը և դոզավորումը

0.5×0.5 սմ, պատրաստուկով թրջված թանգիֆե խծուծը ներմուծել արյունահոսող գրպանիկ. առաջանում է մակարդուկ: Հետագա, շերտ առ շերտ, մակարդուկի առաջացման նպատակով մի քանի անգամ կրկնել ներմուծումը: Երկարատև արյունահոսությա նդեպքում խծուծը թողնել մեկ օրվա ընթացքում:

Ատամնաբուժական պրակտիկայում և այլ վերքային մակերեսների դեպքում կիրառումը համանման է:

Կողմնակի ազդեցությունները

Կապրոֆերի բազմակի ներմուծումներից հնարավոր է ատամների էմալի ժամանակավոր գունափոխում (շագանակագույն), որ նանհետանում է պատրաստուկի օգտագործումը դադարեցնելիս:

Հակացուցումները

Նկարագրված է անհատական անտանելիություն պատրաստուկի բաղադրիչների նկատմամբ

Նախազգուշական միջոցառումներ

Դեղի բազմակի օգտագործման ժամանակ կարող է դիտվել ատամների էմալի ժամանակավոր մուգ գունափոխում, որ նանհետանում է կիրառումը դադարեցնելիս:

Դեղի ազդեցությունը ուշադրություն պահանջող աշխատանքների ժամանակ

Դեղը որևէ ազդեցություն չի թողնում կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա, կարելի է կիրառել ուշադրություն պահանջող աշխատանքների, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցներ վարելու ժամանակ:

Կիրառումը հղիության և կրծքով կերակրման շրջանում

Հղիության և կրծքով կերակրման շրջանում օգտագործելիս խորհրդակցել բժշկի հետ

Փոխազդեցությունը այլ դեղերի հետ

Հնարավոր վտանգավոր փոխազդեցություն նկարագրված չէ: Կարելի է զուգակցել հեմոթերապիայի հետ:

Պահպանման պայմանները

Չոր, լույսից պաշտպանված և երեխաներին անհասանելի տեղում, 25°C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանում:

Պիտանելիության ժամկետը

3 տարի

Բաց թողման պայմանները

Առանց բժշկի դեղատոմսի

Փաթեթավորումը

Արտաքին օգտագործման 20 մլ լուծույթ՝ պլաստմասե հերմետիկ փակված կաթոցիկով սրվակներում: Սրվակները պիտակավորված են արտաքին օգտագործման պիտակներով, յուրաքանչյուր սրվակ բժշկական կիրառման հրահանգի հետ միասին տեղադրված է սովարաթղթե տուփի մեջ:

	ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և Դեղագործական Քիմիայի Գիտատեխնոլոգիական Կենտրոնի Ա. Լ. Մնջոյանի անվ. Նուրբ Օրգանական Քիմիայի Ինստիտուտ ՊՈԱԿ	էջ՝
	Կ ա ա ղ ը Ֆ է ը լուծույթ, դեղի բժշկական կիրառման հրահանգ	

Արտադրող

«Արփիմեդ» ՍՊԸ Արտադրատարածքի հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Կոտայքի մարզ,
ք. Արովյան, 2204, 2-րդ միկրոշրջան, 19 շենք:

Գրանցման հավաստագրի իրավատեր

ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և Դեղագործական Քիմիայի Գիտատեխնոլոգիական Կենտրոնի Ա. Լ. Մնջոյանի անվ. Նուրբ Օրգանական Քիմիայի Ինստիտուտ, Հայաստանի Հանրապետություն,
ք. Երևան, Ազատության պող. 26, հեռ. (+37410) 288-334, e-mail: nanraifok54@mail.ru,
www.stcopc.sci.am:

	Институт Тонкой Органической Химии им. А.Л. Мнджояна Научно – Технологического Центра Органической и Фармацевтической Химии Национальной Академии Наук Республики Армения ГНКО	стр.
	Капрофер для инъекций Инструкция по медицинскому применению	

КАПРОФЕР CAPROFERR

Инструкция по медицинскому применению препарата

Торговое название

Капрофер

Химическое название

Железа (III) хлорид 6-водное и ε-аминокапроновая кислота

Физико – химические свойства

Прозрачная жидкость темно-коричневого цвета с вязущим кисловатым вкусом, специфическим запахом.

Состав препарата

Каждый мл раствора содержит :

активные ингредиенты

- железа (III) хлорид 6-водное – 0.947г
- ε-аминокапроновая кислота – 0.024 г

Вспомогательные вещества

- Раствор натрия хлорида изотонического 0,9 % - 0.448 г

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения

Фармакологическая группа

Гемостатическое средство для местного применения

Код АТХ

B02BC

Фармакологическое действие (фармакодинамика)

Фармакологическое действие - гемостатическое.

Комбинированный препарат, оказывает местное гемостатическое действие, наступающее непосредственно после его нанесения. При взаимодействии с кровью, образуется кровяной сгусток, плотно фиксирующийся на раневой поверхности, предупреждает повторное кровотечение и препятствует проникновению вторичной инфекции. Ускоряет регенерацию и послеоперационную эпителизацию раневой поверхности, образование грануляционной ткани. Обладает также противоотечным и противовоспалительным действием.

Фармакокинетика

Не проведено

Показания к применению

Кровотечения (при различных стоматологических вмешательствах, при лечении пульпитов, для остановки кровотечения из каналов зубов после экстирпации пульпы зуба), прихирургических вмешательствах на тканях пародонта для остановки кровотечения и снятия коллатеральных отеков мягких тканей в послеоперационном периоде.

Способ применения и дозы

Ватный тампон 0.5x0.5 см, пропитанный раствором, вводят в кровоточащую лунку. При этом должен образоваться кровяной сгусток. Образующийся темно – коричневого цвета, с черноватым оттенком кровяной сгусток имеет плотную упругую консистенцию. При стойких кровотечениях ватный тампон можно оставлять в лунке в течение суток. Тампон отторгается самостоятельно. В каналы зубов и зубодесневые карманы препарат вводят на 2 – 5 сек. с помощью турунд, после чего турунды удаляют.

Противопоказания

Гиперчувствительность к препарату.

Побочные действия

При частом применении временное окрашивание эмали зубов в темный цвет (исчезает после отмены).

Действие препарата на работы требующие повышенного внимания

Препарат не оказывает никакого действия на центральную нервную систему: можно применять при вождении транспортных средств, также при других работах, требующих повышенного внимания.

Применение во время беременности и кормления грудью

Нет данных о применении препарата при беременности и в период кормления грудью.

	Институт Тонкой Органической Химии им. А.Л. Мнджояна Научно – Технологического Центра Органической и Фармацевтической Химии Национальной Академии Наук Республики Армения гнко	стр.
	К а п р о ф е р для инъекций Инструкция по медицинскому применению	

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не исследованно

Форма выпуска

В пластмассовых, герметически закрытых флаконах-капельницах по 20 мл. Флаконы с этикетками наружного применения и инструкциями по медицинскому применению вложены в картонную коробку.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

Срок годности

3 года

Условия отпуска

Без рецепта врача

Производитель

ООО “Арпимед” Адрес Производственного участка: Республика Армения, Котайкский регион, г. Абовян, 2204, 2-ой микрорайон, зд. 19.

Владелец регистрационного удостоверения

Институт Тонкой Органической Химии им. А.Л. Мнджояна Научно – Технологического Центра Органической и Фармацевтической Химии Национальной Академии Наук Республики Армения, Армения, г. Ереван 0014, пр. Азатутяна 26; тел./факс (+37410) 28 83 37; тел. 28 83 34; e-mail: nanraifok54@mail.ru, www.stcopc.sci.am.