

	ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և Դեղագործական Քիմիայի Գիտատեխնոլոգիական Կենտրոնի Ա. Լ. Մնջոյանի անվ. Նուրբ Օրգանական Քիմիայի Ինստիտուտ ՊՈԱԿ Կ ա պ ը Ֆ է ը լուծույթ, դեղի ընդհանուր բնութագիր	էջ՝
---	--	------------

ԿԱՊՐՈՖԵՐ
CAPROFERR
Դեղի ընդհանուր բնութագիր

Դեղի ապրանքային անվանումը

ԿԱՊՐՈՖԵՐ, КАПРОФЕР

Որակական և քանակական կազմը . (1 մլ-ում պարունակվում է)

Ակտիվ նյութեր

Երկաթի (III) քլորիդ 6 մոլեկուլ բյուրեղաջրով - 0.947 գ

ε-ամինակապրոտաթթու - 0.024 գ

Օժանդակ նյութեր

Նատրիումի քլորիդի 0,9 % իզոտոնիկ լուծույթ - 0.448 գ

Դեղաձևը

Արտաքին կիրառման լուծույթ

Թողարկման ձևն ու փաթեթավորումը

Արտաքին օգտագործման 20 մլ լուծույթ պլաստմասե, հերմետիկ փակված, կաթոցիկով սրվակներում:
Սրվակները պիտակավորված են արտաքին օգտագործման պիտակներով, յուրաքանչյուր սրվակ
բժշկական կիրառման հրահանգի հետ միասին տեղադրված է ստվարաթղթե /քրոմ-էրգաց/ տուփի մեջ
ըստ ԳՕՍՏ 7933-75:

Բուժական բնութագրիչները

Ցուցումները

Արյունահոսություններ (ատամնաբուժական տարբեր միջամտությունների, կակղանաբորբի
(պուլպիտների) բուժման ժամանակ, ատամի կակղանի (պուլպայի) էքստիրպացիայից հետո
արյունահոսության դադարեցման նպատակով), պարօդոնտի հյուսվածքի վիրաբուժական
միջամտությունների ժամանակ արյունահոսությունը կանգնեցնելու նպատակով, ինչպես նաև
հետվիրահատական շրջանում փափուկ հյուսվածքների կոլլատերալ այտուցների վերացման
նպատակով:

Կիրառման ձևերը

0.5×0.5 սմ, դեղով թրջված բամբակյա խծուծը ներմուծում են արյունահոսող ատամնաբուն. պետք է
ձևավորվի արյան մակարդուկ: Առաջացած՝ մուգ շագանակագույն, սև երանգով արյան մակարդուկը,
ամուր և առաձգական կոնսիստենցիա ունի: Երկարատև արյունահոսությունների դեպքում բամբակյա
խծուծը ատամնաբնում կարելի է թողնել մինչև 1 օր (բամբակյա խծուծը ինքնուրույն պոկվում է
հյուսվածքից): Արմատախողովակներում և ատամի լնդագրպանիկներում դեղը ներմուծում են թղթե
բույրերի օգնությամբ՝ 2 - 5 վայրկյանով, որից հետո վերջիններս հեռացնում են:

Հակացուցումները

Նկարագրված չեն: Գերզգայունություն դեղի հանդեպ:

Նախազգուշացումները

Հաճախակի կիրառումից ատամների էմալի ժամանակավոր գունափոխում (շագանակագույն), որն
անհետանում է կիրառումը դադարեցնելիս:

Փոխազդեցությունները

Ուսումնասիրություններ չկան

Կիրառումը հղիության և կրծքով կերակրման շրջանում

Հղիության և կրծքով կերակրման շրջանում դեղի կիրառման վերաբերյալ տվյալներ չկան:

	ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և Դեղագործական Քիմիայի Գիտատեխնոլոգիական Կենտրոնի Ա. Լ. Մնջոյանի անվ. Նուրբ Օրգանական Քիմիայի Ինստիտուտ ՊՈԱԿ	էջ՝
	Կ ա պ ռ Ֆ ե ը լուծույթ, դեղի ընդհանուր բնութագիր	

Ազդեցությունը ուշադրություն պահանջող գործունեության վրա

Դեղը որևէ ազդեցություն չի թողնում կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա, կարելի է կիրառել ուշադրություն պահանջող գործունեության, տրանսպորտային միջոցներ վարելու ժամանակ

Կողմնակի ազդեցությունները

Հաճախակի կիրառման դեպքում ատամի էմալի ժամանակավոր մգացում, որն անհետանում է դեղի կիրառման դադարեցումից հետո:

Գերդեղաչափման ժամանակ ձեռնարկվող միջոցառումները

Գերդեղաչափման ժամանակ հարկավոր է վերքի, լորձաթաղանթի մակերեսը լվանալ նատրիումի քլորիդի իզոտոնիկ լուծույթով:

Դեղաբանական բնութագրիչները

Դեղադինամիկա

Դեղաբանական ազդեցությունը՝ արնեկանգ (հեմոստատիկ)

Համակցված դեղ է, ցուցաբերում է տեղային արնեկանգ ազդեցություն, որը հասունանում է անմիջապես տեղային օգտագործումից հետո: Արյան հետ փոխազդելիս առաջանում է արյան մակարդուկ, որը ֆիքսվելով վերքի մակերեսին՝ կանխում է կրկնակի արյունահոսությունը եւ երկրորդային ինֆեկցիաների ներթափանցումը: Խթանում է վերականգնողական (ռեգեներացիոն) պրոցեսը եւ վերքի մակերեսի հետվիրահատական էպիթելիզացիան, նպաստում է հաստիկավոր (գրանուլյացիոն) հյուսվածքի ձևավորմանը: Օժտված է նաեւ հակաբորբոքային և հակաալոստոցային ազդեցությամբ:

Դեղակինետիկա

Կատարված չէ

Դեղագործական բնութագրիչները

Օժանդակ նյութերը

Նատրիումի քլորիդի իզոտոնիկ լուծույթ

Անհամատեղելիություններ

Չկան

Պիտանիության ժամկետը

3 տարի

Բաց թողման պայմանները

Բժշկի դեղատոմսով

Պահման պայմանները

Չոր, լույսից պաշտպանված և երեխաներին անհասանելի տեղում, 25°C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանում:

Փաթեթի բնութագրիչները

20 մլ պլաստմասե, հերմետիկ փակված, կաթոցիկով սրվակներ: Սրվակները պիտակավորված են արտաքին օգտագործման պիտակներով, յուրաքանչյուր սրվակ բժշկական կիրառման հրահանգի հետ միասին տեղադրված է ստվարաթղթե /քրոմ-էրգաց/ տուփի մեջ ըստ ԳՕՍՏ 7933-75:

Օգտագործման հատուկ հրահանգները և նախազգուշացումները

Օգտագործման հատուկ հրահանգներ և նախազգուշացումներ չկան:

Արտադրող

«Արփիմեդ» ՍՊԸ Արտադրատարածքի հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Կոտայքի մարզ, ք. Արովյան, 2204, 2-րդ միկրոշրջան, 19 շենք:

	ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և Դեղագործական Քիմիայի Գիտատեխնոլոգիական Կենտրոնի Ա. Լ. Մնջոյանի անվ. Նուրբ Օրգանական Քիմիայի Ինստիտուտ ՊՈԱԿ	էջ՝
	Կ ա պ ը Ֆ է ը լուծույթ, դեղի ընդհանուր բնութագիր	

Գրանցման հավաստագրի իրավատեր

ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և Դեղագործական Քիմիայի Գիտատեխնոլոգիական Կենտրոնի Ա. Լ. Մնջոյանի անվ. Նուրբ Օրգանական Քիմիայի Ինստիտուտ, Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Ազատության պող. 26, հեռ. (+37410) 288-334, e-mail: nanraifok54@mail.ru, www.stcopc.sci.am: