

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Медицинский Спирт, 96%,

концентрат для приготовления раствора для наружного применения

Медицинский Спирт, 70%,

концентрат для приготовления раствора для наружного применения

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Перед применением препарата полностью прочитайте листок вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.
- Всегда применяйте препарат в точности как описано в этом листке вкладыше или с рекомендациями Вашего лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет Медицинский Спирт и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Медицинский Спирт.
3. Применение препарата Медицинский Спирт.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Медицинский Спирт.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Медицинский Спирт, и для чего его применяют

Этанол относится к группе антисептических и дезинфицирующих средств, обладает противомикробной активностью в отношении бактерий и вирусов. Действующим веществом препарата Медицинский Спирт является этанол (спирт этиловый) 96%.

Показания к применению

Лекарственный препарат Медицинский Спирт показан к применению у взрослых и детей.

Применяют в качестве антисептического, дезинфицирующего и местно-раздражающего средства.

Лечение начальных стадий гнойно–септических заболеваний: фурункулез, панариций, мастит; обработка рук хирурга (способы Фюрбрингера, Альфреда), обработка операционного поля (в т.ч. у лиц с повышенной чувствительностью к другим антисептикам, у детей и при операциях на областях с тонкой кожей у взрослых - шея, лицо).

2. О чем следует знать перед применением препарата Медицинский Спирт

Противопоказания

Не применяйте препарат Медицинский Спирт:

- если у Вас аллергия (гиперчувствительность) на этанол (спирт этиловый).

Необходимые меры предосторожности при применении

Перед применением препарата Медицинский Спирт проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Этанол относится к легко воспламеняемым веществам. Не применять вблизи открытого огня!

Дети и подростки

Этанол при наружном применении частично всасывается через кожу, что нужно учитывать при его использовании у детей.

Виды взаимодействия с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия (например, с алкоголем, табаком, пищей), способные повлиять на действие лекарственного препарата

При одновременном применении с препаратами для наружного применения, которые содержат органические соединения, может вызывать денатурацию белковых компонентов. Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты, в том числе и препараты, отпускаемые без рецепта.

Беременность и грудное вскармливание

Данные о безопасности применения препарата в периоды беременности и грудного вскармливания не изучены. Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Лекарственный препарат Медицинский Спирт, применяемый как концентрат для приготовления раствора для наружного применения, не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. При длительном применении в больших дозах возможно всасывание в системный кровоток, что может вызвать снижение психомоторных реакций, что следует учитывать, при управлении транспортными средствами, механизмами.

3. Применение препарата Медицинский Спирт

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Режим дозирования и способ применения

Применяйте препарат наружно, в виде примочек, компрессов и обтираний. Для обработки операционного поля и предоперационной дезинфекции рук хирурга используйте 70% раствор, для компрессов и обтираний (во избежание ожога) рекомендуется использовать 40% раствор. 96% раствор разведите до необходимых концентраций и используйте по показаниям.

Если Вы применили препарата Медицинский Спирт больше, чем следовало, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Медицинский Спирт является наркотическим веществом, при чрезмерном применении вызывает характерное алкогольное возбуждение, в больших дозах угнетает функции центральной нервной системы, возможно усиление побочных эффектов.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При возникновении следующих серьезных нежелательных реакций следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Серьезные нежелательные реакции, которые наблюдались с неизвестной частотой при применении препарата Медицинский Спирт (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно): аллергические реакции, ожоги кожи, гиперемия и болезненность кожи в месте наложения компресса.

При наружном применении частично всасывается через кожу и может оказывать резорбтивное общетоксическое действие (угнетение центральной нервной системы).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в этом листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий» ГНКО электронная почта vigilance@pharm.am или позвонить по номеру (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05.

О нежелательных реакциях препарата также можно сообщить держателю регистрационного удостоверения: АООТ «Лизин»; адрес: 2501 г. Чаренцаван, ул. Горцаранаин 14 Республика Армения; телефон: (+374 94) 49 69 39, (+374 94) 88 28 99; e-mail: info@lizin.am, galya.azaryan@yandex.ru.

5. Хранение препарата Медицинский Спирт

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке или на картонной пачке после слов «Годен до». Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Хранить при температуре не выше 25°C, в хорошо укупоренной таре, вдали от огня.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

Действующее вещество: этанол

Состав на 100 мл

Медицинский спирт 96%

Действующее вещество: Спирт этиловый ректифицированный

Медицинский спирт 70%

Действующее вещество: Спирт Этиловый (этанол) 96% - 72,9 части

Вспомогательное вещество: Вода дистиллированная - 27,1 части

Внешний вид препарата Медицинский Спирт и содержимое упаковки

Концентрат для приготовления раствора для наружного применения

Препарат представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с характерным запахом.

Упаковка

Первичная: Пластиковые бутылки.

Вторичная: Картонная коробка.

Медицинский Спирт 96 %

Концентрат для приготовления раствора для наружного применения по 50мл, 100мл, 250мл, 500мл, 1000мл, 5000мл в пластиковых бутылках.

Пластиковые бутылки укупоривают винтовой крышкой с контрольным вскрытием, наклеивают этикетку и упаковывают в картонные коробки: по 24 бутылки по 50мл, 100мл, 250мл, 500мл и по 6 бутылей по 1000мл. Пластиковые бутылки по 5000мл в картонные коробки не упаковываются.

Медицинский Спирт 70 %

Концентрат для приготовления раствора для наружного применения по 50мл, 100мл, 250мл, 1000мл, 5000мл в пластиковых бутылках.

Пластиковые бутылки укупоривают винтовой крышкой с контрольным вскрытием, наклеивают этикетку и упаковывают в картонные коробки: по 24 бутылки по 50мл, 100мл, 250мл и по 6 бутылей по 1000мл. Пластиковые бутылки по 5000мл в картонные коробки не упаковываются.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

АООТ «Лизин»

2501 г. Чаренцаван, ул. Горцаранаин 14

Республика Армения

Телефон: +374 94 49 69 39, +374 94 88 28 99

Дата последнего пересмотра текста

05.03.2026