

## **Листок-вкладыш – информация для потребителя**

### **Граммидин® детский, таблетки для рассасывания 1,5 мг + 1 мг**

**Действующие вещества:**

гамицидина С дигидрохлорид – 1,60 мг (в пересчете на гамицидин С – 1,50 мг);  
цетилпиридиния хлорида моногидрат – 1,05 мг (в пересчете на цетилпиридиния хлорид – 1,00 мг).

*Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.*

*Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача.*

*Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.*

*Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.*

*Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.*

*Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 7 дней вам следует обратиться к врачу.*

#### **СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША**

1. Что из себя представляет препарат ГРАММИДИН® ДЕТСКИЙ, и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед применением препарата ГРАММИДИН® ДЕТСКИЙ.
3. Применение препарата ГРАММИДИН® ДЕТСКИЙ.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата ГРАММИДИН® ДЕТСКИЙ.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

#### **1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ГРАММИДИН® ДЕТСКИЙ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ**

Комбинированный препарат для симптоматического лечения инфекционно-воспалительных заболеваний горла и полости рта. В состав препарата входит противомикробное средство гамицидин С и антисептическое средство - цетилпиридиния хлорид. Механизм действия гамицидина С связан с повышением проницаемости цитоплазматической мембраны микробной клетки, что нарушает ее устойчивость и вызывает гибель. Гамицидин С оказывает антибактериальное (бактерицидное) действие в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Цетилпиридиния хлорид относится к антисептическим средствам, подавляет рост и размножение возбудителей инфекционных заболеваний полости рта. Препарат оказывает противомикробное действие, уменьшает воспаление, смягчает неприятные ощущения в горле, облегчает глотание, при рассасывании вызывает гиперсаливацию, что способствует механическому очищению полости рта и глотки от микроорганизмов.

#### ***Показания к медицинскому применению***

Симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и горла, сопровождающихся болью в горле и в ротовой полости: фарингит, тонзиллит, пародонтит, гингивит, стоматит.

## **2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ГРАММИДИН® ДЕТСКИЙ**

### ***Противопоказания***

- гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1;
- фенилкетонурия (препарат содержит аспартам);
- наследственная непереносимость фруктозы (препарат содержит сорбитол);
- период кормления грудью;
- детский возраст до 4 лет.

### ***Особые указания и меры предосторожности***

Непосредственно после применения препарата следует воздержаться от приема пищи и напитков в течение 1-2 часов.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 7 дней приема препарата рекомендуется обращение к врачу.

Не следует применять препарат при наличии открытых ран в полости рта, поскольку цетилпиридиния хлорид замедляет заживление ран.

Содержит источник фенилаланина. Может оказаться вредным для людей с фенилкетонурией.

Если у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

Может оказывать слабое слабительное действие. Сорбитол содержит 2,6 ккал/г калорий.

### ***Беременность, грудное вскармливание и fertильность***

#### **Беременность**

Беременным женщинам необходимо проконсультироваться с врачом перед применением препарата. Применение препарата возможно, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода.

#### **Кормление грудью**

Нет данных о проникновении компонентов препарата в грудное молоко. На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

#### **Фертильность**

Контролируемые исследования нарушения фертильности у людей не проводились.

### ***Управление транспортными средствами и работа с механизмами***

Препарат не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

## **3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ГРАММИДИН® ДЕТСКИЙ**

### ***Режим дозирования***

*Взрослые:* по 2 таблетки (одну за другой в течение 20-30 минут). Максимальная суточная доза - 8 таблеток.

Дозировка для детей старше 12 лет: по 2 таблетки (одну за другой в течение 20-30 минут). Максимальная суточная доза - 8 таблеток.

Дозировка для детей от 4 до 12 лет: по 1 таблетке. Максимальная суточная доза - 4 таблетки.

### ***Метод и путь введения***

Местно. Применяется после еды, путем рассасывания во рту, не разжевывая.

### ***Частота применения с указанием времени приема***

4 раза в день.

### ***Длительность лечения***

Длительность лечения без консультации врача 7 дней.

*Меры, которые необходимо принять в случае передозировки*

Симптомы: прием препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, может вызвать нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта вследствие изменения бактериальной микрофлоры: тошноту, рвоту, диарею.

Лечение: следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

*Меры, необходимые при пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата*

В случае пропуска отдельных доз не следует принимать двойную дозу препарата.

*Указание на наличие риска симптомов отмены*

О случаях симптомов отмены до настоящего времени не сообщалось.

*При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу*

#### 4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

*Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.*

Определение частоты побочных явлений проводится в соответствии со следующими критериями: очень часто ( $\geq 1/10$ ), часто ( $\geq$  от 1/100 до  $< 1/10$ ), нечасто ( $\geq$  от 1/1000 до  $< 1/100$ ), редко ( $\geq 1/10000$  до  $< 1/1000$ ), очень редко ( $< 1/10000$ ), неизвестно (невозможно оценить на основании имеющихся данных)

*Частота неизвестна:*

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата, желудочно-кишечные расстройства (тошнота, диарея).

*Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.*

#### 5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ГРАММИДИН® ДЕТСКИЙ

*Срок годности*

2 года.

Не применять после истечения срока годности.

*Условия хранения*

В защищенном от света месте при температуре не выше 25° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### 6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

*Состав*

Одна таблетка содержит:

действующие вещества:

грамицидина С дигидрохлорид – 1,60 мг (в пересчете на грамицидин С - 1,50 мг);  
цетилпиридиния хлорида моногидрат – 1,05 мг (в пересчете на цетилпиридиния хлорид – 1,00 мг);

вспомогательные вещества:

кремния диоксид коллоидный, тальк, лимонной кислоты моногидрат, аспартам, ароматизатор малиновый, сорбитол, магния стеарат.

*Внешний вид ГРАММИДИН® ДЕТСКИЙ и содержимое упаковки*

Круглые двояковыпуклые таблетки белого или почти белого цвета с тиснением «GR» на одной стороне и запахом малины. Допускается незначительная мраморность.

По 9 таблеток в контурную ячейковую упаковку или в контурную ячейковую упаковку с перфорацией      из      пленки      поливинилхлоридной      или      пленки

поливинилхлоридной/поливинилиденхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению на русском и государственном языках помещают в пачку из картона.

*Держатель регистрационного удостоверения и производитель*  
Акционерное общество «Валента Фармацевтика» (АО «Валента Фарм»)  
141101, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.  
Телефон: +7 (495) 933-48-62, факс +7 (495) 933-48-63  
Электронный адрес: [info@valentapharm.com](mailto:info@valentapharm.com)

*За любой информацией о препарате следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения:*

Акционерное общество «Валента Фармацевтика» (АО «Валента Фарм»)  
141101, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.  
Телефон: +7 (495) 933-48-62, факс +7 (495) 933-48-63  
Электронный адрес: [info@valentapharm.com](mailto:info@valentapharm.com)