

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

БИСАКОДИЛ ГРИНДЕКС *Bisacodylum*

Перед приемом лекарственного препарата полностью прочитайте инструкцию, поскольку в ней содержатся важные для вас сведения.

- Сохраните эту инструкцию. Возможно, вам потребуется прочитать её еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Лекарственный препарат предназначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к врачу или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на те, которые не перечислены в данной инструкции. Смотреть раздел 4.

В этой инструкции вы можете узнать:

1. Что из себя представляет Бисакодил Гриндекс и для чего его применяют
2. Что вам следует знать перед приемом Бисакодил Гриндекс
3. Как применять Бисакодил Гриндекс
4. Возможные нежелательные реакции
5. Как хранить Бисакодил Гриндекс
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет Бисакодил Гриндекс и для чего его применяют

Бисакодил Гриндекс содержит активное вещество бисакодил, которое является синтетическим слабительным средством. При контакте со слизистой кишечника бисакодил усиливает перистальтические сокращения гладкой мускулатуры толстой кишки и вызывает ее опорожнение.

Бисакодил Гриндекс применяют:

- для лечения запоров различного происхождения;
- как слабительное средство для подготовки к хирургическим операциям и диагностическим процедурам (например, колоноскопия, радиологическое обследование).

2. Что вам следует знать перед приемом Бисакодил Гриндекс

Не применяйте Бисакодил Гриндекс в следующих случаях:

- Если у вас аллергия на бисакодил или на любые другие ингредиенты препарата (перечисленные в разделе 6);
- при нарушении продвижения содержимого кишечника в результате непроходимости кишечника различного происхождения;
- при наличии внезапной острой боли в животе (синдром острого живота) с тошнотой и рвотой, включая аппендицит и перитонит;
- если у вас кровотечение из желудочно-кишечного тракта;
- если у вас тяжелое обезвоживание с электролитными нарушениями;
- если у вас острые воспалительные заболевания тонкого и толстого кишечника, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона;

- детский возраст до 12 лет.

Особые меры и предосторожности

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, прежде чем принимать Бисакодил Гриндекс.

Как и все слабительные средства бисакодил не следует принимать ежедневно с продолжительностью более 5 дней без установления причин запора.

Следует избегать длительного периода времени и регулярного применения стимулирующих слабительных средств, так как это может привести к нарушению функции кишечника.

Если слабительные средства необходимы каждый день, следует выяснить причину запора. Данный лекарственный препарат следует использовать только в том случае, если терапевтический эффект не может быть достигнут путем изменения диеты или назначения средств, увеличивающих объем кишечного содержимого.

Длительный прием высоких доз лекарственного препарата может приводить к потере жидкости, нарушению баланса электролитов, гипокалиемии.

Потеря жидкости через кишечник может привести к обезвоживанию, которое может сопровождаться такими симптомами, как чувство жажды и олигурия. Обезвоживание может нанести вред организму (например, при почечной недостаточности, у пожилых пациентов), поэтому при вышеперечисленных симптомах прием лекарственного препарата должен быть прекращен и возобновлен только под наблюдением врача.

Стимулирующие слабительные средства, включая бисакодил, не способствуют снижению массы тела.

При приеме бисакодила может наблюдаться наличие неизменённой крови в испражнениях. Данное проявление обычно слабо выражено и проходит самостоятельно.

Возможны возникновения головокружения и/или обморока при приеме бисакодила. Эти случаи могут быть связаны с обмороком при дефекации (или обмороком, вызванным напряжением при дефекации) или с парасимпатической сосудистой реакцией на боль в животе, которая могла быть обусловлена запором, и не обязательно связаны с применением лекарственного препарата.

Сообщалось об отдельных случаях возникновения боли в животе и кровавой диареи, возникающих после приема бисакодила. Некоторые случаи были связаны с ишемией слизистой оболочки толстого кишечника.

Другие препараты и Бисакодил Гриндекс

Сообщите врачу о том, что вы применяете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Одновременное применение с препаратами, снижающие кислотность желудка, блокаторами H_2 -гистаминовых рецепторов (например, циметидином, ранитидином, фамотидином), ингибиторами протонного насоса, щелочными минеральными водами или молочными продуктами может уменьшить прочность оболочки таблетки и вызвать слишком быстрое выделение активного вещества, что, в свою очередь, может вызвать расстройство пищеварения и сильное раздражение желудка. Следует соблюдать 1-2 часовой интервал между приемом бисакодила и употреблением щелочных продуктов.

Одновременное применение высоких доз препарата Бисакодил Гриндекс и диуретиков или глюко-кортикостероидов увеличивает риск нарушения электролитного баланса.

Нарушение электролитного баланса может приводить к повышенной чувствительности к действию сердечных гликозидов.

Применение бисакодила одновременно с другими слабительными средствами может усиливать нежелательные побочные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта.

Бисакодил Гриндекс с пищей, напитками и алкоголем

Применение Бисакодил Гриндекс одновременно с продуктами, нейтрализующими желудочную кислоту (например, щелочная минеральная вода, молочные продукты), может вызвать воспаление слизистой оболочки пищеварительного тракта.

Беременность, кормление грудью и фертильность

Если вы беременны или кормите ребенка грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с врачом.

В период беременности и кормления грудью Бисакодил Гриндекс можно принимать только по назначению врача.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Бисакодил Гриндекс не влияет на способность управлять транспортными средствами и работу с механизмами. Некоторые люди могут чувствовать головокружение или слабость во время приема этого лекарства. Если это случилось с вами, подождите, пока эти чувства не исчезнут, прежде чем водить машину или пользоваться машиной.

Бисакодил Гриндекс содержит сахарозу, лактозы моногидрат и краситель желтый «солнечный закат» (E 110)

Если у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

Краситель желтый «солнечный закат» может вызвать аллергические реакции.

3. Как применять Бисакодил Гриндекс

Всегда применяйте лекарственный препарат в полном соответствии с инструкцией или с рекомендациями врача или работника аптеки.

Рекомендуемая суточная доза составляет 5-10 мг бисакодила (1-2 таблетки) за один прием перед сном.

Подготовка к хирургическим операциям и диагностическим процедурам: по 10 мг (2 таблетки) на ночь за 2 ночи до процедуры.

Рекомендуется начинать с наименьшей дозы. Для того чтобы достичь регулярного стула, доза может повышаться до максимальной рекомендуемой. Не следует превышать максимальную рекомендуемую суточную дозу.

Лекарственное средство не следует принимать с продуктами, понижающими кислотность в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта, такими как молоко, антациды или ингибиторы протонного насоса, чтобы избежать преждевременного растворения кишечнорастворимой оболочки препарата.

Лекарственное средство не следует применять дольше 5 дней подряд без назначения врача.

Инструкция по применению

Для эффективной дефекации утром бисакодил следует применять внутрь перед сном, независимо от приема пищи.

Таблетки проглатывают целиком, не разжевывая, запивая с достаточным количеством жидкости.

Если приняли Бисакодил Гриндекс больше, чем следовало

При передозировке Бисакодил Гриндекс усиливается диарея, что способствует обезвоживанию с нарушением электролитного баланса, в особенности потери ионов калия. При хронической передозировке возможно развитие атонии толстой кишки.

При передозировке следует незамедлительно обратиться к врачу!

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Наиболее часто сообщалось о возникновении болей в животе и диареи.

Частота нежелательных реакций указана в соответствии со следующей классификацией:

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- судороги в области живота
- боль в животе
- понос и тошнота.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- головокружение
- наличие свежей крови в кале
- рвота
- дискомфорт в области живота
- дискомфорт в области заднего прохода.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000)

- тяжелые аллергические реакции, включая отек лица или горла, затруднённое дыхание или головокружение
- высыпания из-за аллергической реакции
- колит, включая ишемический колит (воспаление толстого кишечника с болью в животе и поносом)
- обезвоживание
- обморок.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в этой инструкции. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности лекарственного препарата.

5. Как хранить БИСАКОДИЛ ГРИНДЕКС

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности 5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Не выбрасывайте лекарственные препараты в канализацию или с бытовыми отходами. Уточните у фармацевта как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Что содержит Бисакодил Гриндекс

- *Активное вещество* – бисакодил (*Bisacodylum*). Одна таблетка содержит 5 мг бисакодила.
- *Другие ингредиенты*:

Ядро: сахароза, лактозы моногидрат, крахмал картофельный, тальк, кальция стеарат, метилцеллюлоза, полисорбат 80 (твин 80).

Оболочка: сополимер метакриловой кислоты – этилакрилата, тальк, титана диоксид (Е 171), триэтилцитрат, краситель желтый «солнечный закат» (Е 110).

Внешний вид Бисакодил Гриндекс и упаковка

Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой.

Описание: круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые светло-оранжевой оболочкой, в изломе ядро белое.

По 10 таблеток в блистере из фольги алюминиевой и пленки поливинилхлоридной.

По 4 блистера вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.

Условия отпуска из аптек

Отпускается без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения и производитель

АО «Гриндекс».

Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия

Телефон: +371 67083205

Факс: +371 67083505

Электронная почта: grindeks@grindeks.lv

Инструкция последний раз пересмотрена 11/2020