

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ВИПРОСАЛ В® мазь для наружного применения

Перед применением лекарственного препарата полностью прочитайте инструкцию по медицинскому применению, так как она содержит важную для Вас информацию.

Всегда применяйте лекарственный препарат именно так, как указано в этой инструкции, или же так, как указал врач или фармацевт.

- Сохраните эту инструкцию. Возможно, что Вам потребуется прочитать ее еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к фармацевту.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к врачу или фармацевту. Данная рекомендация распространяется на возможные нежелательные реакции, в том числе на те, которые не перечислены в данной инструкции. См. раздел 4.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание инструкции по медицинскому применению:

1. Что представляет собой лекарственный препарат Випросал В® и для чего его применяют
2. Что Вам следует знать перед применением Випросал В®
3. Как применять Випросал В®
4. Возможные нежелательные реакции
5. Как хранить Випросал В®
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что представляет собой лекарственный препарат Випросал В® и для чего его применяют

Випросал В® является комбинированным препаратом, который содержит активные вещества: яд гадюки обыкновенной сухой, камфора рацемическая, скипидар живичный и салициловая кислота. Компоненты мази оказывают раздражающее и болеутоляющее действие.

Салициловая кислота вызывает размягчение кожи и отторжение наружного ороговевшего слоя кожи.

Випросал В® является болеутоляющим средством для наружного применения при ревматических болях, невралгии, радикулите и заболеваниях с сопутствующим болевым синдромом.

2. Что Вам следует знать перед применением Випросал В®

Не применяйте Випросал В® в следующих случаях:

- если у Вас имеется аллергия на активные вещества или любые другие вспомогательные вещества препарата, перечисленные в разделе 6 инструкции;

- если у Вас имеются язвы или другие заболевания кожи;
- если у Вас острый туберкулез легких;
- если у Вас имеются нарушения мозгового и сердечного кровообращения;
- если у Вас предрасположенность к спазмам сосудов головного мозга (ангиоспазмам);
- если у Вас имеются тяжелые нарушения функции почек или печени;
- если Вы беременны или кормите ребенка грудью.

Не применяйте этот лекарственный препарат, если у Вас имеется любое из упомянутых заболеваний или состояний. Если Вы не уверены, перед применением Випросал В[®] проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Особые указания и меры предосторожности при применении

Не применяйте мазь на поврежденную поверхность кожи.

Во избежание сильного раздражения необходимо следить, чтобы мазь не попадала в глаза и на слизистые оболочки.

Дети и подростки

Применение данного лекарственного препарата у детей и подростков не рекомендуется, так как отсутствуют достаточные данные о применении в этой возрастной группе.

Другие лекарственные средства и Випросал В[®]

Сообщите врачу или фармацевту о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие лекарственные препараты.

Исследования взаимодействия не проводились.

Випросал В[®] вместе с пищей, напитками и алкоголем

Випросал В[®] предназначен только для наружного применения. Мазь можно применять независимо от приема пищи. Не проглатывать!

Беременность, кормление грудью и фертильность

Если Вы беременны или кормите ребенка грудью, если считаете, что беременны или планируете беременность, перед началом применения этого препарата проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

В связи с отсутствием соответствующих данных о безопасности нельзя применять Випросал В[®] во время беременности и кормления грудью.

Управление транспортными средствами и обслуживание механизмов

Випросал В[®] не влияет на способность управлять транспортными средствами и обслуживать движущиеся механизмы.

Випросал В[®] содержит цетостеариловый спирт

Цетостеариловый спирт может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

3. Как применять Випросал В®

Всегда применяйте этот лекарственный препарат в полном соответствии с инструкцией по медицинскому применению или с рекомендациями врача или фармацевта.

При появлении сомнений посоветуйтесь с врачом или фармацевтом.

Випросал В® предназначен для применения на кожу! Не проглатывать!

Взрослые

Учитывая размеры болезненного участка, на поверхность кожи в болезненном месте маленькими порциями наносят 5-10 г (1-2 чайные ложки) мази и втирают ее в кожу в зависимости от интенсивности боли 1-2 раза в сутки до исчезновения боли. Продолжительность курса лечения зависит от характера и степени тяжести заболевания.

Если Вы чувствуете, что действие Випросал В® слишком сильное или слишком слабое, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Если Вы использовали большее количество Випросал В®, чем указано

О случаях передозировки не сообщалось.

При попадании на слизистые оболочки мазь вызывает сильное раздражение.

Если Вы случайно проглотили Випросал В®

Проглатывание мази может вызвать нарушения деятельности пищеварительного тракта, например, рвоту и понос.

При случайном проглатывании больших количеств могут проявляться симптомы острого отравления, такие как тошнота, рвота, боль в животе и головная боль, головокружение, ощущение жара/покраснения, судороги, угнетение дыхания и кома.

Если Вы случайно проглотили Випросал В®, незамедлительно обратитесь к врачу. Возьмите с собой упаковку препарата.

Если ребенок случайно проглотил Випросал В®, незамедлительно проконсультируйтесь с врачом. Нельзя вызывать рвоту.

Если Вы забыли применить Випросал В®

Если Вы забыли применить Випросал В®, примените его как только вспомните и продолжайте применять как обычно.

Если приближается время следующего применения мази, пропустите забытую дозу и продолжайте применение как указано. Не применяйте двойную дозу, чтобы заменить забытую дозу.

Если Вы прекратили применять Випросал В®

Если у Вас есть какие-либо вопросы о применении этого лекарственного препарата, спрашивайте врача или фармацевта.

4. Возможные нежелательные реакции

Как и все лекарственные средства, этот препарат может вызывать нежелательные реакции, однако не у всех они возникают.

Аллергические реакции

У пациентов с повышенной чувствительностью кожи к компонентам мази ее применение может вызвать аллергические реакции (зуд, отек, крапивницу). В этом случае следует прекратить лечение и смыть мазь с поверхности кожи. Упомянутые симптомы обычно проходят после прекращения лечения.

Во избежание побочных действий рекомендуется предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения чувствительности к препарату.

Сообщение о нежелательных побочных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в инструкции. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности лекарственного препарата.

5. Как хранить Випросал В®

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не хранить в холодильнике и морозильной камере.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 3 года.

Не применяйте лекарственный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Не выбрасывайте лекарственные средства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Уточните у фармацевта, как уничтожаются лекарственные препараты, которые больше не используются. Эти меры помогают защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Что содержит Випросал В®

Активные вещества: яд гадюки обыкновенной сухой, камфора рацемическая, скипидар живичный и салициловая кислота. 1 г мази содержит яда гадюки обыкновенной сухого – 0,05 МЕД, камфоры рацемической – 30 мг, скипидара живичного – 30 мг и салициловой кислоты – 10 мг.

Вспомогательные вещества: вазелин, цетостеариловый спирт, парафин твердый, натрия цетилстеарилсульфат, глицерол, натрия хлорид и вода очищенная.

Описание внешнего вида Випросал В® и содержание упаковки

Мазь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета, с запахом камфоры и скипидара.

По 30 г, 50 г или 75 г в тубе алюминиевой.

По 1 тубе вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения и производитель

Владелец регистрационного удостоверения

АО «Гриндекс».

Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия

Телефон: + 372 67083205

Факс: + 371 67083505

Электронная почта: grindeks@grindeks.lv

Производитель

АО Таллиннский фармацевтический завод.

Тонди 33, 11316 Таллинн, Эстония

Телефон: + 372 612 0201

Электронная почта: farma@tft.ee

Дата последнего пересмотра текста

Март 2020 г.