

ԴԵՂԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ

(ՆԵՐՂԻՐ-ԹԵՐԹԻԿ)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՅԻՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Լեսպեֆրիլ Բիոստա, ներքին ընդունման լուծույթ

Ակտիվ բաղադրատարր՝ երկգույն թավառվույտի (*Lespedeza bicolor*) ընձյուղներ

Դեղը ենթակա է լրացուցիչ մշտադիտարկման, որը նպաստում է դեղի անվտանգության վերաբերյալ նոր տվյալների արագ բացահայտմանը: Դա հնարավորություն կտա կարճ ժամանակահատվածում բացահայտել անվտանգության վերաբերյալ նոր տեղեկություններ: Առողջապահության համակարգի մասնագետներին խնդրում ենք հայտնել ցանկացած կասկածելի կողմնակի ազդեցության մասին:

Կողմնակի ազդեցությունների հաղորդման եղանակը նկարագրված է ներդիր-թերթիկի 4-րդ բաժնում:

Նախքան դեղի կիրառումը ուշադիր կարդացեք ներդիր-թերթիկն ամբողջությամբ, քանի որ այն պարունակում է կարևոր տեղեկատվություն:

- Պահեք այս ներդիր-թերթիկը: Հնարավոր է այն կրկին կարդալու կարիք լինի:
- Եթե ունեք լրացուցիչ հարցեր, դիմեք բուժող բժշկին կամ դեղագետին:
- Եթե ի հայտ է եկել որևէ կողմնակի ազդեցություն, այդ թվում՝ նաև այնպիսին, որը ներառված չէ այս ներդիր-թերթիկի 4-րդ բաժնում, դիմեք բուժող բժշկին կամ դեղագետին:

Ինչ բովանդակություն ունի այս ներդիր-թերթիկը

1. Ինչ է Լեսպեֆրիլ Բիոստա դեղը և ինչի համար է այն օգտագործվում:
2. Ինչ պետք է իմանալ Լեսպեֆրիլ Բիոստա դեղն օգտագործելուց առաջ:
3. Ինչպես օգտագործել Լեսպեֆրիլ Բիոստա դեղը:
4. Ինչպիսի կողմնակի ազդեցություններ կարող են առաջանալ:
5. Ինչպես պահել Լեսպեֆրիլ Բիոստա դեղը:
6. Ինչ է պարունակում դեղի փաթեթը և այլ տեղեկություններ:

1. ԻՆՉ Է ԼԵՍՊԵՖՐԻԼ ԲԻՈՍՏԱ ԴԵՂԸ ԵՎ ԻՆՉԻ ՀԱՄԱՐ Է ԱՅՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ

Լեսպեֆրիլ Բիոստա դեղը պարունակում է երկգույն թավառվույտի ընձյուղներում առկա ակտիվ բաղադրատարր: Լեսպեֆրիլ Բիոստա դեղը նպաստում է երիկամային ֆիլտրացիայի մեծացմանը, նվազեցնում է արյան մեջ ազոտի պարունակությունը, ուժեղացնում է նյութափոխանակության ազոտային արգասիքների արտազատումը մեզի միջոցով, ուժեղացնում է դիուրետիկ, ինչպես նաև՝ նատրիումի իոնների և ավելի փոքր աստիճանով՝ կալիումի իոնների արտազատումը:

Լեսպեֆրիլ Բիոստա դեղը՝ որպես արյան մեջ ազոտի պարունակությունը նվազեցնող և միզամուղ միջոց, ցուցված է չափահասների շրջանում քրոնիկական երիկամային

անբավարարության (տարբեր ծագմամբ, թաքնված (լատենտ), կոմպենսացված և ընդմիջվող փուլերում, համալիր բուժման կազմում) ախտանիշային բուժման համար:

2. ԻՆՉ ՊԵՏՔ Է ԻՄԱՆԱԼ ԼԵՍՊԵՖՐԻԼ ԲԻՈՍՏԱ ԴԵՂՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒՅ ԱՌԱՋ Մի օգտագործեք Լեսպեֆրիլ Բիոստա դեղը, եթե՝

- ունեք անհատական զգայունություն դեղի բաղադրատարրերի նկատմամբ:
- հղի եք,
- կրծքով կերակրում եք,
- ունեք յարդի հիվանդություններ,
- տառապում եք ալկոհոլիզմով,
- ունեք Էպիլեպսիա,
- ունեք գանգուղեղային վնասվածքներ,
- ունեք գլխուղեղի հիվանդություններ,
- Ձեր տարիքը 18-ից ցածր է:

Եթե ունեք նշված հիվանդություններից որևէ մեկը, դեղն ընդունելուց առաջ անպայման խորհրդակցեք բժշկի հետ:

Կիրառման հատուկ հրահանգներ և նախազգուշացումներ

Հիպոնատրիեմիայի զարգացման դեպքում պետք է կիրառել նատրիումի իոններ պարունակող դեղեր:

Օժանդակ նյութեր

Դեղը պարունակում է 40%-ից ոչ պակաս Էթանոլ: Դեղի առավելագույն միանվագ դեղաչափը պարունակում է 4,7 գրամից ոչ պակաս մաքուր Էթիլ սպիրտ, իսկ առավելագույն օրական դեղաչափը՝ 18,8 գրամից ոչ պակաս մաքուր Էթիլ սպիրտ:

Երեխաներ և դեռահասներ

Լեսպեֆրիլ Բիոստա դեղը նախատեսված չէ մինչև 18 տարեկան երեխաների շրջանում կիրառման համար:

Լեսպեֆրիլ Բիոստա դեղի և այլ դեղերի միաժամանակյա կիրառում

Հայտնեք բուժող բժշկին կամ դեղագետին, եթե ընդունում եք, վերջերս ընդունել եք կամ պատրաստվում եք ընդունել որևէ այլ դեղ:

Լեսպեֆրիլ Բիոստա դեղի բաղադրության մեջ Էթանոլի առկայությամբ պայմանավորված՝ դիսուլֆիրամի, հանգստացնող ազդեցությամբ դեղերի, մոնոամինօքսիդազ ֆերմենտի ոչ ընտրողական արգելակիչների, ինսուլինի, մետֆորմինի, սուլֆոնամիդի հետ Լեսպեֆրիլ Բիոստա դեղի միաժամանակյա կիրառումը հակացուցված է:

Որոշ դեղերի հետ միաժամանակյա նշանակման դեպքում պետք է հաշվի առնել Լեսպեֆրիլ Բիոստա դեղի բաղադրության մեջ Էթանոլի առկայությունը, քանի որ այն կարող է փոփոխել կամ ուժեղացնել այլ դեղերի ազդեցությունը:

Հղիություն և կրծքով կերակրման շրջան

Եթե հղի եք կամ կարծում եք, որ հղի եք, կամ կրծքով կերակրում եք, կամ պատրաստվում եք հղիանալ, այս դեղն ընդունելուց առաջ խորհրդակցեք բժշկի հետ:

Հղիություն

Հղիության ընթացքում Լեսալեֆրիլ Բիոստա դեղի կիրառումը հակացուցված է:

Կրծքով կերակրման շրջան

Կրծքով կերակրման շրջանում Լեսալեֆրիլ Բիոստա դեղի կիրառումը հակացուցված է:

Ազդեցությունը փոխադրամիջոցների վարելու և սարքավորումների հետ աշխատելու կարողության վրա

Լեսալեֆրիլ Բիոստա դեղի կիրառման ընթացքում անհրաժեշտ է խուսափել պոտենցիալ վտանգավոր գործունեություն իրականացնելուց, որի դեպքում պահանջվում է ուշադրության խիստ կենտրոնացում և փսիխոմոտոր ռեակցիաների արագություն (փոխադրամիջոցների վարում, շարժվող սարքավորումների հետ աշխատանք, դիսպետչերի և օպերատորի աշխատանք):

3. ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ԼԵՍՊԵՖՐԻԼ ԲԻՈՍՏԱ ԴԵԴԸ

Լեսալեֆրիլ Բիոստա դեղը միշտ անհրաժեշտ է օգտագործել բուժող բժշկի հրահանգներին խիստ համապատասխան: Եթե համոզված չեք, թե ինչպես պետք է դեղն ընդունել, խորհրդակցեք բուժող բժշկի հետ:

Թույլատրելի դեղաչափ

Անհրաժեշտ է ընդունել 5-15 մլ (1 թեյի գդալ – 1 ճաշի գդալ)՝ օրական 3-4 անգամ: Բուժման տևողությունը 3-4 շաբաթ է: Բուժումը հնարավոր է կրկնել 2-3 շաբաթ անց՝ բժշկի հետ խորհրդակցելուց հետո:

Եթե բուժումից հետո Ձեր առողջական վիճակը չի բարելավվել կամ ախտանիշները բարդացել են կամ ի հայտ են եկել նոր ախտանիշներ, անհրաժեշտ է խորհրդակցել բժշկի հետ: Դեղն օգտագործեք միայն ըստ ներդիր-թերթիկում նշված ցուցումների, կիրառման ձևի և դեղաչափերի:

Կիրառումը երեխաների և դեռահասների շրջանում

Լեսալեֆրիլ Բիոստա դեղը ցուցված է կիրառել միայն չափահասների, տարեցների և 18 տարեկանից բարձր երեխաների շրջանում:

Կիրառման ձև

Դեղը նախատեսված է ներքին ընդունման համար: Խորհուրդ է տրվում օգտագործելուց առաջ թափահարել: Թույլատրվում է օգտագործելուց առաջ դեղը նոսրացնել ջրով:

Եթե Լեսալեֆրիլ Բիոստա դեղն ավելի շատ եք օգտագործել, քան թույլատրելի է

Գերդեղաչափման դեպքում հնարավոր է դեղաչափակախայալ կողմնակի ազդեցությունների ուժեղացում:

Բուժումն ախտանիշային է:

Եթե մոռացել եք օգտագործել Լեսպեֆրիլ Բիոստա դեղը

Մի ընդունեք կրկնակի դեղաչափ Լեսպեֆրիլ Բիոստա դեղի բաց թողնված դեղաչափը լրացնելու նպատակով:

Եթե Լեսպեֆրիլ Բիոստա դեղի դեղաչափը մոռացել եք ընդունել նախատեսված ժամին, հաջորդ դեղաչափն ընդունեք այնպես, ինչպես նախկինում:

Եթե դադարեցրել եք Լեսպեֆրիլ Բիոստա դեղի ընդունումը

Դեղի օգտագործման վերաբերյալ հարցերի դեպքում դիմեք բուժող բժշկին:

4. ԻՆՉՊԻՍԻ ԿՈՂՄՆԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ

Ինչպես բոլոր դեղերը, Լեսպեֆրիլ Բիոստա դեղը նույնպես կարող է առաջացնել կողմնակի ազդեցություններ, թեև ոչ բոլոր պացիենտների շրջանում դրանք կարող են դրսևորվել:

Կողմնակի ազդեցություններն են՝

- ալերգիկ ռեակցիաներ,
- հիպոնատրիեմիա:

*Ներդիր-թերթիկում նշված որևէ կողմնակի ազդեցության բարդացման կամ ներդիր-թերթիկում չնշված այլ կողմնակի ազդեցության ի հայտ գալու դեպքում **այդ մասին հայտնեք բժշկին:***

Կողմնակի ազդեցությունների վերաբերյալ հաղորդում

Կողմնակի ազդեցության ի հայտ գալու դեպքում խորհրդակցեք բժշկի կամ դեղագետի հետ: Սա վերաբերում է նաև այս ներդիր-թերթիկում չնշված որևէ այլ կողմնակի ազդեցությանը: Դուք կարող եք նաև կողմնակի ազդեցությունների, այդ թվում՝ դեղերի անարդյունավետության մասին ուղղակիորեն առցանց հաղորդել ՀՀ ԱՆ Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն՝ հետևյալ հղումով. www.pharm.am կամ զանգահարել թեժ գիծ. հեռախոսահամարներ՝ (+374 10) 20 05 05 և (+374 96) 22 05 05:

Կողմնակի ազդեցությունների մասին հաղորդելով՝ Դուք նպաստում եք այս դեղի անվտանգության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվության ապահովմանը:

5. ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՀԵԼ ԼԵՍՊԵՖՐԻԼ ԲԻՈՍՏԱ ԴԵՂԸ

Դեղը պահեք երեխաների համար անհասանելի և անտեսանելի տեղում:

Մի օգտագործեք դեղը պիտանիության ժամկետի ավարտից հետո, որը նշված է դեղի փաթեթի վրա: Պիտանիության ժամկետն ավարտվում է տուփի վրա նշված ամսվա վերջին օրը:

Դեղը պահեք 15°C-ից մինչև 25°C ջերմաստիճանային պայմաններում:

Դեղերը չի կարելի նետել կոյուղի:

Չօգտագործված դեղերի հետ վարվելու մասին հարցրեք դեղագետին: Այս միջոցառումներն ուղղված են շրջակա միջավայրի պահպանությանը:

6. ԻՆՉ Է ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ ԴԵՂԻ ՓԱԹԵԹԸ ԵՎ ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Լեսպեֆրիլ Բիոստա դեղի ակտիվ բաղադրատարր՝ երկգույն թավառվույտի ընձյուղներ:

1000 մլ ծավալով լուծույթ պատրաստելու համար օգտագործում են՝

երկգույն թավառվույտի ընձյուղներ - 708 գ:

Օժանդակ նյութեր

Էթիլ սպիրտ (Էթանոլ) 95%,

մաքրված ջուր,

անիսոնի յուղ:

Ինչ տեսք ունի Լեսպեֆրիլ Բիոստա դեղը և ինչ է պարունակում փաթեթը

Նարնջագույն երանգով բաց դարչնագույնից մինչև կարմրադարչնագույն, բնորոշ հոտով հեղուկ: Թույլատրվում է նստվածքի առկայություն:

Ներքին ընդունման լուծույթ:

100 մլ լուծույթը լցված է նարնջագույն ապակե սրվակի մեջ, որը փակված է խցանով և պտուտակվող կափարիչով:

100 մլ լուծույթը լցված է նարնջագույն ապակե սրվակի մեջ, որը փակված է պոլիմերային միջադիր ունեցող այլումինե ծակոտկեն կափարիչով:

100 մլ լուծույթը լցված է պոլիէթիլենտերեֆթալատից պատրաստված սրվակի մեջ, որը փակված է առաջին բացումը հսկելու համակարգ ունեցող կափարիչով:

Սրվակների վրա փակցված են պիտակային կամ գրելու թղթից պատրաստված պիտակներ կամ ինքնակաշուն պիտակներ:

Յուրաքանչյուր սրվակը տեղադրված է սպառողական փաթեթի համար նախատեսված ստվարաթղթե տուփի մեջ՝ ներդիր-թերթիկի հետ միասին:

Արտադրող

«Վիֆիտեխ» ՓԲԸ,

Ռուսաստանի Դաշնություն

Մոսկվայի մարզ, քաղաք Մերայուխով, ավան Օբոլենսկ, տարածք Կվարտալ A, տուն 14

Ֆրանցման հավաստագրի իրավատեր

«Վիֆիտեխ» ՓԲԸ

Ռուսաստանի Դաշնություն

142279, Մոսկվայի մարզ, քաղաք Մերայուխով, ավան Օբոլենսկ,

Կիրառական մանրէաբանության պետական գիտական կենտրոն (ԿՄ ՊԳԿ)

Հեռախոս՝ +7 (495) 716-15-81, 716-15-90

Էլ. փոստ՝ vifiteh@mail.ru

Դեղի վերաբերյալ ցանկացած տեղեկություն ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել գրանցման հավաստագրի իրավատիրոջ ներկայացուցչին:

«Վիֆիտեխ» ՓԲԸ

Ռուսաստանի Դաշնություն

142279, Մոսկվայի մարզ, քաղաք Սերպուխով, ավան Օբոլենսկ,

Կիրառական մանրէաբանության պետական գիտական կենտրոն (ԿՄ ՊԳԿ)

Ներդիր-թերթիկը վերանայվել է

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Леспефрил Биоста, раствор для приема внутрь

Действующие вещество: леспедецы двухцветной побег

Лекарственный препарат подлежит дополнительному мониторингу, который способствует быстрому выявлению новых сведений о безопасности. Это позволит в короткий срок выявить новую информацию о безопасности. Обращаемся к работникам системы здравоохранения с просьбой сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях. Способ сообщения о нежелательных реакциях описан в разделе 4 листка-вкладыша.

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Леспефрил Биоста и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Леспефрил Биоста.
3. Применение препарата Леспефрил Биоста.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Леспефрил Биоста.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ Леспефрил Биоста И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Препарат Леспефрил Биоста содержит действующее вещество леспедецы двухцветной побег. Средства, применяемые в урологии; другие средства, применяемые в урологии. Способствует увеличению почечной фильтрации, уменьшает азотемию, увеличивает выведение азотистых шлаков с мочой, повышает диурез и выведение ионов натрия и в меньшей степени ионов калия. Препарат применяют у взрослых для симптоматической терапии в качестве гипозотемического и диуретического средства при хронической

почечной недостаточности (различного происхождения, в латентной, компенсированной и интермиттирующей стадиях, в составе комбинированной терапии).

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА Леспефрил Биоста

Не применяйте препарат Леспефрил Биоста, если:

- если у Вас повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;
- если у Вас беременность;
- если у Вас период грудного вскармливания;
- если у Вас заболевания печени;
- если у Вас алкоголизм;
- если у Вас эпилепсия;
- если у Вас черепно-мозговые травмы;
- если у Вас заболевания головного мозга;
- если у Вас возраст до 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

При развитии гипонатриемии ее следует компенсировать введением препаратов, содержащих ионы натрия.

Вспомогательные вещества

Препарат содержит не менее 40 % этанола. В максимальной разовой дозе препарата содержится не менее 4,7 г абсолютного этилового спирта, в максимальной суточной дозе содержится не менее 18,8 г абсолютного этилового спирта.

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Дети и подростки

Препарат Леспефрил Биоста не предназначен для применения у детей до 18 лет.

Другие препараты и препарат Леспефрил Биоста

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

В связи с содержанием этанола в препарате противопоказан одновременный прием дисульфирама, седативных лекарственных средств, неселективных ингибиторов моноаминоксидазы, инсулина, метформина, сульфонамида.

При совместном назначении нескольких лекарственных средств необходимо принимать во внимание наличие этанола в препарате, так как он может изменять или усиливать действие других препаратов.

Беременность и период грудного вскармливания

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с врачом.

Беременность

Применение препарата противопоказано.

Период грудного вскармливания

В период грудного вскармливания применение препарата противопоказано.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

В период применения препарата необходимо воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА Леспефрил Биоста

Всегда принимайте препарат Леспефрил Биоста в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

По 5-15 мл (1 чайная – 1 столовая ложка) 3-4 раза в сутки. Курс лечения составляет 3-4 недели. Проведение повторного курса лечения возможно через 2-3 недели, после консультации с врачом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Применение у детей и подростков

Леспефрил Биоста предназначен только для взрослых, пожилых и детей в возрасте от 18 лет.

Путь и способ введения

Внутрь. Перед применением рекомендуется взбалтывать. Допускается разбавление препарата водой перед употреблением.

Если Вы применили препарат Леспефрил Биоста больше, чем следовало

При передозировке возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое.

Если Вы забыли применить препарат Леспефрил Биоста

Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу препарата Леспефрил Биоста.

Если вы забыли применить Леспефрил Биоста в нужное время, начните применять препарат снова так же, как и раньше.

Если Вы прекратили применение препарата Леспефрил Биоста

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Леспефрил Биоста может вызывать нежелательные реакции, однако возникают они не у всех.

- аллергические реакции;
- гипонатриемия.

Если любые из указанных в инструкции нежелательных реакций усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую в информационную базу по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов («ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕКАРСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» ГНКО). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА Леспефрил Биоста

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препарата, который Вы больше не употребляете. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Действующее вещество: леспедецы двухцветной побегов.

Для приготовления 1000 мл препарата используют: 708 г леспедецы двухцветной побегов.

Вспомогательные вещества:

Спирт этиловый 95 % (этанол);

Вода очищенная;

Анисовое масло.

Внешний вид препарата Леспефрил Биоста и содержимое упаковки

Жидкость от светло-коричневого с оранжевым оттенком до красновато-коричневого цвета с характерным запахом. Допускается наличие осадка.

Раствор для приема внутрь.

По 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками и крышками навинчиваемыми.

По 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные колпачками алюминиевыми с перфорацией с прокладками полимерными.

По 100 мл во флаконы из полиэтилентерефталата с колпачками системы контроля первого вскрытия.

На флаконы наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или этикетки самоклеящиеся.

Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 14.

Держатель регистрационного удостоверения

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ

Телефон: (495) 716-15-81, 716-15-90

Адрес электронной почты: vifiteh@mail.ru

За любой информацией о препарате следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения:

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ

Листок-вкладыш пересмотрен