ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Вермокс, таблетки 100 мг
мебендазол

Перед началом приема препарата внимательно прочтите весь листок-вкладыш, он содержит важную для Вас информацию.
- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к вашему врачу или работнику аптеки.
- Это препарат был выписан лично Вам. Не передавайте его другим людям. Это может нанести им вред, даже если симптомы их заболевания похожи на Ваши.
- При возникновении любых побочных эффектов на фоне приема препарата, пожалуйста, сообщите об этом вашему врачу или работнику аптеки. Это относится к любым возможным побочным эффектам, не указанным в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

Содержание данного листка - вкладыша:

1. Что представляет собой Вермокс, таблетки 100 мг (далее Вермокс), и для чего он применяется
2. Что нужно знать перед применением препарата Вермокс
3. Применение препарата Вермокс
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить препарат Вермокс
6. Содержимое упаковки и другая информация

1. Что представляет собой Вермокс, и для чего он применяется

Препарат Вермокс является противогельминтным средством (лекарственный препарат способный выводить из организма один или несколько видов паразитических гельминтов, таких как острицы, аскариды, власоглавы, ленточные черви), назначаемым детям, и взрослым

2. Что нужно знать перед применение препарата Вермокс

Не принимайте препарат Вермокс
- если у Вас аллергия на мебендазол или любой другой компонент данного препарата, (перечислены в разделе 6);
- в случае подтвержденной или возможной беременности.

Особые указания и меры предосторожности
Проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки перед приемом препарата Вермокс.

Принимайте Вермокс строго в соответствии с рекомендациями врача и проходите назначенное обследование вплоть до исчезновения симптомов (например, выполните назначенное исследование фекалий).

Соблюдение правил личной гигиены во время лечения и после его завершения имеет первостепенное значение для предотвращения рецидивов и передачи инфекции другим лицам.

Если у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

Применение у детей
Не рекомендуется применять препарат Вермокс у детей младше 2 лет, за исключением случаев соответствующих назначений лечащего врача.

Другие лекарственные средства и препарат Вермокс
Если Вы недавно принимали, принимаете или будете принимать любые другие лекарственные препараты, сообщите об этом своему врачу или работнику аптеки.
Одновременный прием других лекарственных препаратов (таких как циметидин, применяемый для лечения изжоги) может повлиять на эффективность препарата Вермокс. Поэтому в таких случаях следует проконсультироваться с врачом.
Следует избегать одновременного применения препарата Вермокс с метронидазолом (препарат для лечения некоторых протозойных и бактериальных инфекций) по причине возможных тяжелых побочных эффектов.

Вермокс и прием пищи/ напитков
Таблетки рекомендуется принимать после приема пищи, проглатывая их целиком или в раздробленном виде, запивая небольшим количеством воды.
Во время лечения нет необходимости прибегать к приему слабительных средств или соблюдения специальной диеты.

Беременность и период грудного вскармливания
Если Вы беременны, или кормите ребенка грудью, полагаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед применением данного препарата проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Не рекомендуется принимать данный препарат в случае подтвержденной или возможной беременности. В период грудного вскармливания прием препарата Вермокс возможен только в исключительных случаях, по рекомендации врача.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами
Вермокс не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Вермокс содержит лактозу (молочный сахар) и натрий
Если Ваш врач ранее отметил у Вас симптомы непереносимости некоторых сахаров, посоветуйтесь с ним, прежде чем принимать данный препарат.

Лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в 1 таблетке, то есть фактически не содержит натрия.

3. Применение препарата Вермокс

Всегда принимайте препарат строго в соотвествии с рекомендациеями врача или работника аптеки. В случае каких-либо сомнений проконсультируйтесь со своим врачом или работником аптеки еще раз.

Дозу и продолжительность лечения определяет лечащий врач с учетом типа паразита.
Продолжительность лечения обычно не превышает 3 дней.

Необходимо строго придерживаться назначенной врачом дозы и продолжать назначенное обследование до исчезновения симптомов (например, выполнять назначенное исследование фекалий).

При определенных паразитарных заболеваниях, возможно, потребуется повторить курс лечения через 2 и 4 недели в соответствии с рекомендациями лечащего врача.

Таблетки рекомендуется принимать после приема пищи, проглатывая их или разжевывая и запивая небольшим количеством воды. Линия разлома предназначена только для упрощения разламывания таблетки и удобства проглатывания, а не для ее деления на равные дозы. Во время лечения нет необходимости прибегать к приему слабительных или специальной диете.

Применение у детей
Для облегчения проглатывая таблетки маленькими детьми допускается ее дробление.

Если Вы приняли больше назначенной дозы препарата Вермокс
Если Вы случайно приняли большее количество таблеток, чем следовало, у Вас могут развиться спастические боли в животе, тошнота, рвота и диарея.
Если Вы случайно приняли большее количество таблеток, чем следовало, или у Вас появились описанные выше симптомы, немедленно сообщите об этом лечащему врачу или обратитесь за медицинской помощью в отделение неотложной помощи ближайшей больницы. Возьмите с собой упаковку и листок-вкладыш препарата.

Если Вы забыли принять Вермокс
Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную. Примите следующую дозу в обычное время и продолжайте принимать препарат в соответствии с рекомендациями врача.

Если Вы прекратили принимать Вермокс
В этом случае возможно уменьшение эффективности лечения.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы по приему препарата, обратитесь к врачу или работнику аптеки.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарственные препараты, этот препарат может вызывать побочные эффекты, хотя они наблюдаются не у всех пациентов.

Прием препарата в рекомендованной дозе, как правило, не сопровождается развитием каких-либо нежелательных симптомов.
При массивной паразитарной инвазии может отмечаться преходящая боль в нижнем отделе живота и диарея. Редко (примерно у 1 из 1000 пациентов) в клинических исследованиях наблюдались дискомфорт в нижней части живота, метеоризм, диарея и сыпь.

Как и при приеме любого другого лекарственного средства, при приеме препарата Вермокс могут развиться тяжелые реакции гиперчувствительности. Поэтому, если у Вас отмечается какой-либо симптом из перечисленных ниже, *сразу же прекратите прием препарата и обратитесь к врачу:*
- кожная сыпь, крапивница, аллергический отек (ангионевротический отек; отек

лица, глотки, полости рта или гортани), затруднение дыхания, обморочное состояние.
- тяжелое заболевание с образованием волдырей на коже, во рту, в области глаз и половых органов. Генерализованная сыпь с волдырями и шелушением кожи *(синдром Стивенса- Джонсона)*.
- тяжелое заболевание с образованием волдырей (десквамацией кожи с поражением более 30% поверхности тела - токсический эпидермальный некролиз).

Также на фоне применения препарата Вермокс были зарегистрированы следующие побочные эффекты:

Частые побочные эффекты (встречаются примерно у 1 из 10 пациентов):
- боль в животе

Нечастые побочные эффекты (встречаются примерно у 1 из 100 пациентов):
- тошнота, рвота

Побочные эффекты с неизвестной частотой (по имеющимся данным частоту их развития оценить невозможно):
- уменьшение количества определенных видов лейкоцитов, сопровождающееся увеличением частоты инфекционных заболеваний
- реакции гиперчувствительности, иногда серьезные
- судороги
- нарушение функции печени
- воспалительное поражение печени

При длительном приеме препарата в дозах, значительно превосходящих рекомендованные, отмечались следующие нежелательные реакции:
Очень редкие побочные эффекты (развиваются у 1 из 10 000 пациентов):
- значительное уменьшение количества лейкоцитов, сопровождающееся увеличением риска инфекций

Частота развития побочных эффектов не установлена (по имеющимся данным частоту их развития оценить невозможно):
- воспалительные заболевания почек

Сообщение о побочных эффектах
При возникновении любых побочных эффектов на фоне приема препарата, пожалуйста, сообщите об этом вашему врачу или работнику аптеки. Это относится к любым возможным побочным эффектам, не указанным в данном листке-вкладыше. Кроме того, Вы можете напрямую сообщать о нежелательных реакциях, используя национальную систему для сбора информации. Сообщая о побочных эффектах, Вы помогаете собрать больше информации о безопасности данного препарата.

5. Как хранить препарат Вермокс

Хранить при температуре от +15 ºС до +30 ºС.
Хранить в недоступном для детей месте.

Не используйте препарат Вермокс таблетки после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

6. Содержимое упаковки и другая информация

Препарат Вермокс содержит
- Действующее вещество: 100 мг мебендазола в каждой таблетке.
- Вспомогательные вещества: натрия лаурилсульфат, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, натрия сахарин, тальк, крахмал кукурузный, лактозы моногидрат.

Как выглядит Вермокс и содержимое упаковки
Плоские таблетки белого или почти белого цвета с легким характерным запахом, формы диска с фаской, с надписью “VERMOX” на одной стороне и риской на другой. Таблетка на изломе белого цвета.
Линия разлома предназначена только для упрощения разламывания таблетки и удобства проглатывания, а не для деления ее на равные дозы.

Упаковка:
6 таблеток в блистере из ПВХ/Ал.
1 блистер в картонной коробке с приложенной инструкцией по применению.

Условия отпуска:
По рецепту.

Владелец регистрационного удостоверения
ОАО «Гедеон Рихтер»
1103 Будапешт, ул. Демреи, 19-21, Венгрия.

Производитель
Гедеон Рихтер Румыния А.О., Тыргу Муреш, Румыния для ОАО «Гедеон Рихтер», Будапешт, Венгрия.

Ответственный за выпуск в оборот
ОАО «Гедеон Рихтер»
1103 Будапешт, ул. Демреи, 19-21, Венгрия.