

# ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

## Витамин В комплекс раствор для инъекций Vitamin B complex solution for injection

**Внимательно прочтайте информацию в инструкции перед применением этого лекарственного препарата.**

- Сохраните эту инструкцию. Возможно Вам потребуется прочесть её снова.
- Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста обратитесь к Вашему лечащему врачу или фармацевту.
- Данный препарат назначен Вам лично и Вы не должны его предоставлять кому-либо другому. Он может нанести вред другим лицам, даже если у них имеются схожие с Вашими симптомы.
- Если любое из побочных действий становится серьезным или Вы заметите другие, не указанные в данной инструкции, пожалуйста, сообщите об этом лечащему врачу или фармацевту.

### **В этой инструкции:**

1. Что представляет собой Витамин В комплекс и в каких случаях применяют
2. Перед тем, как применять Витамин В комплекс
3. Как применять Витамин В комплекс
4. Возможные побочные действия
5. Как хранить Витамин В комплекс
6. Дополнительная информация

### **1. Что представляет Витамин В комплекс и для чего применяют**

Витамины группы В являются абсолютно необходимыми для жизненных функций человека. Проявляют биологическую активность в низких концентрациях и регулируют клеточные функции, участвуют в регулировании обмена углеводов, белков и жиров, а также в синтезе нуклеиновых кислот. Комбинированное применение витаминов из группы В ведет к синергизму их действия.

Витамин В комплексы применяют при доказанном дефиците витаминов группы В ( $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_6$ ) и никотинамида.

### **2. Перед тем как начнете применять Витамин В комплекс**

#### **Не применяйте Витамин В комплекс**

- если у Вас имеется повышенная чувствительность (аллергия) к активным веществам или любому другому компоненту препарата;
- при повышенном давлении крови (артериальная гипертония II-III степени).

#### **Необходимо проявлять осторожность при лечении Витамин В комплекс в следующих случаях**

- Уведомите Вашего врача, если у Вас имеются следующие заболевания:

- злокачественные заболевания;
- заболевания печени, заболевания желчного пузыря и желчных путей, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, гастрит, геморрагии, подагра.

- При приеме высоких доз в течение длительного времени, возможно развитие периферической невропатии, проявляющейся нарушениями координации и жгучими болями в стопах с 1 месяца до 3 лет с начала лечения.
- Препарат может вызвать ложноположительные результаты при определении уробилиногена в моче с использованием реактива Эрлиха.
- Препарат может окрасить мочу в желто-оранжевый цвет.

#### **Прием других лекарственных препаратов**

Пожалуйста, сообщите Вашему врачу или фармацевту, если Вы принимаете или недавно применяли другие лекарственные препараты, в том числе и такие, которые отпускаются без рецепта.

- Наличие витамина В<sub>1</sub> может привести к уменьшению эффекта некоторых лекарственных препаратов для лечения повышенного кровяного давления (антагипертензивных средств), а также и угнетение снотворного эффекта барбитуратов и глутетимида.
- Витамин В<sub>1</sub> может усилить действие лекарственных препаратов для лечения депрессивных состояний (имипрамин, дезипрамин), особенно у пациентов пожилого возраста.
- Витамин В<sub>6</sub> уменьшает антипаркинсонический эффект леводопы.
- Одновременный прием никотинамида и противоэпилептических средств (карбамазепин, диазепам и натрия валпроат) может усилить их противосудорожный эффект.
- Хлорпромазин увеличивает выведение витамина В<sub>2</sub> с мочой.
- Пробенецид подавляет тубулярную секрецию витамина В<sub>2</sub>, в результате чего замедляется его экскреция с мочой и могут усилиться терапевтические и побочные действия.
- Из-за различных несовместимостей не допускается одновременное применение (в одном и том же шприце) вместе с бензилпенициллином и оксациллином, макролидами, хлорамфениколом (антибиотики), витамином В<sub>12</sub>, витамином С.

Необходимо информировать Вашего лечащего врача в случае любого сопутствующего лечения другими лекарственными средствами, чтобы избежать возможное взаимодействие между ними.

#### **Беременность, грудное вскармливание и fertильность**

Обратитесь за советом к Вашему врачу или фармацевту перед применением любого лекарственного препарата.

Препарат можно применять в терапевтических дозах во время беременности.

Не рекомендуется прием Витамина В комплекс во время грудного вскармливания. Если его прием является необходимым, грудное вскармливание следует прекратить.

#### **Вождение транспортных средств и работа с машинами**

Можно без риска использовать препарат при вождении автомашин и работе на сложных машинах.

#### **Важная информация о некоторых вспомогательных веществах**

- Лекарственный препарат содержит метил парагидроксибензоат в качестве вспомогательного вещества, который может вызвать аллергические реакции (возможно замедленного типа), а в исключительных случаях – бронхоспазм.
- Лекарственный препарат содержит меньше 1 ммоль натрия (23 мг) на дозу, т.е. всущности „без содержания натрия”.

### **3. Как применять Витамин В комплекс**

Витамин В комплекс инъекционный раствор применяется по назначению врача. В случаях любых сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

**Взрослые:** Препарат обычно вводится внутримышечно или редко внутривенно в дозе 1-2 мл в день или через день в течение 5-10 дней.

**Дети:** Парентеральное применение не рекомендуется для детей.

Дозировка и продолжительность лечения определяются лечащим врачом в зависимости от тяжести заболевания и переносимости препарата.

При первой возможности переходят к применению Витамина В комплекс в форме таблеток.

#### **Если Вы применили лекарство в большем количестве от рекомендованного**

Передозировка лекарством маловероятна, так как препарат вводится квалифицированными специалистами.

При инцидентном приеме больших количеств обратитесь за советом к Вашему врачу.

#### **Если Вы пропустили применение препарата**

Не употребляйте двойную дозу для компенсации пропущенного.

Продолжайте применение в соответствии с назначением врача.

Если у Вас есть любые дополнительные вопросы, связанные с применением этого лекарственного препарата, просим обратиться к Вашему врачу или фармацевту.

### **4. Возможные побочные действия**

Как и все другие лекарственные средства, Витамин В комплекс может вызвать побочные действия, хотя они и не наблюдается у всех пациентов.

В большинстве случаев лекарственный препарат хорошо переносится.

В исключительно редких случаях возможно появление аллергической кожной сыпи, зуда, отека гортани, покраснение кожи лица и шеи, приливы жара, которые более часто проявляются у предрасположенных к аллергическим реакциям пациентов. В очень редких случаях – анафилактический шок.

Побочные реакции исчезают при прекращении лечения.

Если у Вас появятся какие-либо побочные действия, не указанные в данной инструкции, пожалуйста, сообщите об этом лечащему врачу или фармацевту.

### **5. Как хранить витамин в комплекс**

Препарат хранят в оригинальной упаковке для защиты от света, при температуре не выше 25°C.  
Не замораживать!

Хранить в недоступном для детей месте.

Не используйте Витамин В комплекс после истечения срока годности, указанного на упаковке. Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.

Лекарственные препараты не следует выбрасывать в канализацию или в контейнер для бытовых отходов. Спросите Вашего фармацевта, как уничтожить ненужные Вам лекарства. Эти меры будут способствовать охране окружающей среды.

## **6. Дополнительная информация**

### **Что содержит Витамин В комплекс**

В каждой ампуле раствора для инъекций по 2 мл содержится:

Активные вещества: тиамина гидрохлорид (витамин В<sub>1</sub>) 10 мг, рибофлавина натрия фосфат, эквивалентный рибофлавину (витамин В<sub>2</sub>) 2 мг, пиридоксина гидрохлорид (витамин В<sub>6</sub>) 10 мг, никотинамид (витамин PP) 100 мг.

Вспомогательные вещества: динатрия эдетат, метил парагидроксибензоат, глицерол, хлористоводородная кислота, вода для инъекций.

### **Как выглядит Витамин В комплекс и что содержится в упаковке**

Прозрачная жидкость желто-зеленого цвета.

Ампулы из коричневого стекла /I-го гидролитического класса/ вместимостью 2 мл, с маркировкой для вскрытия ампул (цветная точка). 10 (девять) ампул в блистере из ПВХ пленки. По 1 (одному) блистеру в картонной пачке, вместе с инструкцией с указаниями по применению.

### **Срок годности**

2 года.

### **Владелец регистрационного удостоверения и производитель**

АО СОФАРМА

1220 София, ул. Илиенское шоссе 16, Болгария

**Дата последней актуализации инструкции:** июнь, 2020.