

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: информация для пациента

Оксолин-АВ

Мазь назальная 0,25 %, 10 г

**Действующее вещество: диоксотетрагидрокситетрагидронафталин
(оксолин)**

- Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.
- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, вам следует обратиться к врачу.

В этом листке-вкладыше содержится следующая информация:

1. Что из себя представляет препарат Оксолин-АВ, мазь назальная 0,25 % и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Оксолин-АВ, мазь назальная 0,25 %.
3. Применение препарата Оксолин-АВ, мазь назальная 0,25 %.
4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Оксолин-АВ, мазь назальная 0,25 %.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ОКСОЛИН-АВ, МАЗЬ НАЗАЛЬНАЯ 0,25 % И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ.

Оксолин-АВ, мазь назальная 0,25 % содержит действующее вещество диоксотетрагидрокситетрагидронафталин (оксолин), относится к фармакотерапевтической группе противовирусных препаратов прямого действия, прочим противовирусным препаратам.

Оксолин-АВ, мазь назальная 0,25 % применяется для профилактики гриппа, лечения вирусных ринитов.

Способ действия препарата Оксолин-АВ, мазь назальная 0,25 %:

Препарат обладает противовирусной активностью, блокируя места связывания вируса гриппа с поверхностью клеточной мембраны, защищает клетки от проникновения в них вируса. При нанесении на слизистую оболочку всасывается до 20 % препарата.

В организме не кумулирует и выводится в основном почками в течение суток.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ОКСОЛИН-АВ, МАЗЬ НАЗАЛЬНАЯ 0,25 %.

Не применяйте Оксолин-АВ, мазь назальная 0,25 %: если у вас аллергия (повышенная чувствительность) на диоксотетрагидрокситетрагидронафталин или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Оксолин-АВ, мазь назальная 0,25 % проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

С осторожностью применяйте препарат при беременности, в период грудного вскармливания, если ребенку менее двух лет.

Другие препараты и препарат Оксолин-АВ, мазь назальная 0,25 %

Взаимодействие не изучалось.

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (работа диспетчера, управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ОКСОЛИН-АВ, МАЗЬ НАЗАЛЬНАЯ 0,25 %.

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза и способ введения

Для профилактики гриппа: полоской мази от 3 до 5 мм смазывают ежедневно 2-3 раза в день слизистую оболочку носа в период подъема и максимального развития эпидемической вспышки гриппа (на протяжении 25 дней) или при контакте с больным гриппом.

Лечение вирусного ринита: полоской мази от 3 до 5 мм смазывают слизистую оболочку носа 2-3 раза в день в течение 3-4 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходима повторная консультация.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ.

Подобно всем лекарственным средствам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении препарата возможны быстропроходящее чувство жжения слизистой оболочки носа, ринорея. В редких случаях – синее окрашивание слизистой оболочки носа.

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую в «Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий имени академика Э. Габриеляна» АОЗТ, перейдя на сайт www.pharm.am в раздел “Сообщить о побочном эффекте лекарства” и заполнив форму “Карта сообщений о побочном действии лекарства”.

Телефон горячей линии научного центра: (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05.

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ОКСОЛИН-АВ, МАЗЬ НАЗАЛЬНАЯ 0,25 %.

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и алюминиевой тубе. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Хранить при температуре от 2 до 8 °С.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ.

Препарат Оксолин-АВ, мазь назальная 0,25 % содержит: действующим веществом является диоксотетрагидрокситетрагидронафталин.

100 г препарата Оксолин-АВ, мазь назальная 0,25 % содержит 0,25 г действующего вещества.

Прочими (вспомогательными) веществами являются: вазелиновое масло (парафин жидкий), вазелин.

Внешний вид препарата Оксолин-АВ, мазь назальная 0,25 % и содержимое его упаковки

Однородная мазь от белого до светло-желтого цвета. При хранении допускается появление розового оттенка.

Мазь назальная 0,25 %.

По 10 г в тубу алюминиевую. Тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Владелец регистрационного удостоверения/производитель/организация, принимающая претензии потребителей

АО «Алтайвитамины»

Адрес: 659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, д. 69

Телефон: (3854) 338-719, 326-948

Факс (3854) 326-943.