

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

БЕНЗИЛОР 5 мг/5 мг, таблетки для рассасывания со вкусом апельсина

Хлоргексидина дигидрохлорид/Бензокаин

Перед тем, как начать прием препарата, внимательно прочтите этот листок-вкладыш до конца, так как он содержит важную для вас информацию.

-) Сохраните этот листок-вкладыш. Вам может придется его перечитать.*
-) Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к своему лечащему врачу или фармацевту.*
-) Всегда принимайте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или фармацевта.*
-) Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 2 дня вам следует обратиться к врачу.*
-) Если у вас появятся какие-либо побочные эффекты, поговорите с вашим врачом или фармацевтом. Это касается и побочных эффектов, не указанных в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.*

В этом вкладыше содержится следующая информация:

1. Что такое Бензилор и в каких случаях он применяется
2. Что необходимо знать перед применением Бензилор
3. Как применять Бензилор
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить Бензилор
6. Содержимое упаковки и другая информация

1. ЧТО ТАКОЕ БЕНЗИЛОР И В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ

Хлоргексидин и бензокаин, действующие вещества этого лекарства, действуют, сочетая антисептическое и дезинфицирующее действие хлоргексидина с местным анестезирующим действием бензокаина.

Это лекарство показано для симптоматического и временного облегчения легких инфекционных процессов полости рта и горла, таких как язвы и боли в горле, которые возникают с болью и без повышения температуры у взрослых и детей в возрасте от 6 лет.

Вы должны обратиться к врачу, если вы не почувствуете себя лучше или почувствуете себя хуже через 2 дня.

2. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ БЕНЗИЛОР

Не применять Бензилор:

-) если у вас аллергия на хлоргексидин, бензокаин или любые другие компоненты препарата (перечислены в разделе 6);*
-) если вы не переносите другие местные анестетики, такие как пара-аминобензойная кислота (ПАБК), парабены или парафенилендиамин (компонент краски для волос).*

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом Бензилора проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом:

-) если у вас серьезная или обширная травма рта;
-) если вы страдаете пародонтитом (заболеванием десен), поскольку хлоргексидин может вызвать увеличение наддесневых камней (зубной камень, который появляется над деснами);
-) если у вас астма;
-) если у вас есть пломбы передних зубов и если поверхность пломбы или ее края шероховатые, поскольку с хлоргексидином они могут приобрести стойкую окраску;
-) не использовать перед едой или питьем;
-) не используйте количества, превышающие рекомендованные в разделе 3 (Как применять Бензилора).

Соблюдайте надлежащую гигиену полости рта, чтобы уменьшить образование зубного камня и возможное окрашивание зубов, которое может быть вызвано хлоргексидином.

Вмешательство в диагностические тесты

Если вы собираетесь выполнить какие-либо диагностические тесты (включая кровь, мочу, кожные пробы с использованием аллергенов и т. д.), Сообщите врачу, что вы принимаете это лекарство, так как это может изменить результаты.

Это лекарство влияет на диагностические тесты для определения функции поджелудочной железы с применением бентиротида. Не принимайте это лекарство по крайней мере за 3 дня до теста и сообщите об этом врачу.

Дети

Это лекарство не следует применять детям до 6 лет.

Дети от 6 до 12 лет могут использовать его только под присмотром взрослых.

Пациенты пожилого возраста

Люди старше 65 лет и ослабленные пациенты могут быть более чувствительны к бензокаину.

Другие лекарственные препараты и Бензилор

Сообщите вашему врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать другие лекарственные средства (включая лекарственные препараты, отпускаемые без рецепта).

Это особенно важно в случае:

-) Другие антисептики для рта или горла.
-) Ингибиторы холинэстеразы (препараты Альцгеймера).
-) Сульфамиды (используются при инфекциях).

Анионные соединения и суспендирующие вещества (обычные компоненты зубных паст) снижают эффективность хлоргексидина, поэтому после использования зубной пасты следует хорошо прополоскать рот.

Прием препарата Бензилор с едой и напитками

Это лекарство нельзя использовать непосредственно перед едой или питьем.

Беременность и кормление грудью

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Влияние на способность управления автомобилем и пользования механизмами

Данный медицинский препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Важная информация о некоторых вспомогательных веществах, содержащихся в составе Бензилор

Может оказывать легкое слабительное действие, поскольку содержит маннитол.

3. КАК ПРИМЕНЯТЬ БЕНЗИЛОР

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, или так, как вам объяснили врач или фармацевт. Обратитесь к лечащему врачу или фармацевту, если вы в чем-то не уверены.

Бензилор - это лекарство для орофарингеального применения. Поэтому таблетки следует медленно рассасывать во рту, не разжевывая и не проглатывая их, поскольку они имеют полностью местный эффект, и их действие проявляется только при прямом контакте с воспаленной областью.

Рекомендуемая доза составляет

Взрослые и дети старше 12 лет: медленно рассасывать во рту по 1 таблетке каждые 2 или 3 часа, при необходимости до 8 таблеток в день.

Дети от 6 до 12 лет: использовать только под присмотром взрослых. Медленно рассасывайте по 1 таблетке во рту каждые 4 или 5 часов, при необходимости, максимум до 6 таблеток в день.

Применение у детей

Это лекарство не следует применять детям до 6 лет.

Дети от 6 до 12 лет могут использовать его только под присмотром взрослых.

Пациенты пожилого возраста

Людям старше 65 лет и ослабленным пациентам следует проконсультироваться со своим врачом, поскольку они могут быть более чувствительны к воздействию бензокаина.

Вы должны поговорить с врачом, если вы не почувствуете себя лучше или почувствуете себя хуже после 2 дней лечения.

Если вы заметили, что через 2 дня после начала лечения у вас поднялась температура, появилась головная боль, тошнота или рвота, вам следует как можно скорее проконсультироваться с врачом.

Если вы применили больше Бензилор, чем вам рекомендовано

Признаки передозировки проявляются невнятной речью, онемением, шаткой походкой, нечеткостью или двоением в глазах, головокружением, возбуждением или судорогами, звоном в ушах, повышенным потоотделением и / или низким артериальным давлением.

В случае передозировки или случайного проглатывания немедленно обратитесь в медицинский центр, указав лекарство и принятое количество.

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарства, обратитесь к врачу или фармацевту.

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым подвержены не все.

Возможные побочные эффекты, частота которых точно не определена

Возможно окрашивание зубов. Эта пигментация или окрашивание может возникать особенно у людей, у которых есть скопления зубного камня. Это изменение цвета зубов не является постоянным и может быть устранено с помощью чистки полости рта. Цвет пломбы также может быть изменен, и в этом случае это окрашивание может быть постоянным.

У некоторых людей может развиваться изменение вкусового восприятия.

В некоторых случаях Бензилор может вызвать раздражение во рту или на кончике языка, которое обычно носит временный характер, а также аллергические реакции на хлоргексидин или бензокаин.

Отчетность о побочных эффектах

Если вы отметили какие-либо побочные эффекты, сообщите об этом своему лечащему врачу или фармацевту, в том числе и о побочных эффектах, не перечисленных в этом листке-вкладыше.

5. КАК ХРАНИТЬ БЕНЗИЛОР

Хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности – 24 месяца.

Не используйте Бензилор после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Не следует спускать лекарства в сточные воды или в канализацию. Спросите у фармацевта, как распорядиться с препаратом, который вам больше не понадобится. Эти меры направлены на защиту окружающей среды.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что содержит Бензилор

Активные вещества: каждая таблетка для рассасывания со вкусом апельсина, содержит 5 мг хлоргексидина дигидрохлорида и 5 мг бензокаина.

Вспомогательные вещества: маннитол (Е-421), микрокристаллическая целлюлоза, повидон, магния стеарат, натрия цикламат, натрия сахаринат, ментоловый ароматизатор, апельсиновый ароматизатор.

Как выглядит Бензилор и содержимое упаковки

Круглые, желтовато-белые таблетки, со скошенным краем и риской с одной стороны.

Описание упаковки

Таблетки для рассасывания со вкусом апельсина (по 5 мг/5 мг), по 10 таблеток для рассасывания в ячейковой упаковке с алюминиевым покрытием с ПВХ и чередующимися ПВХ/ПЭ/ПВДХ, в картонной упаковке 2 блистера вместе с листочком-вкладышем.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача!

Владелец торговой лицензии/регистрации

GM Pharmaceuticals Ltd.

Адрес: ГРУЗИЯ, г. ТБИЛИСИ, ПОНИЧАЛА 65

телефон: +995 32 2404801/02;

Факс: +995 32 2404803

Производитель

Laboratorios Alcala Farma, S.L., Испания