

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ – ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

СМЕКТИКА МЕД

Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 3 г

Смектит диоктаэдрический

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки, или медицинской сестры.

Сохраните листок-вкладыш.

Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.

Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки, или медицинской сестре.

Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается через 7 дней, вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Смектика мед, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Смектика мед.
3. Применение препарата Смектика мед.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Смектика мед.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ СМЕКТИКА МЕД, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ.

Смектика мед - противодиарейное лекарственное средство, представляет собой алюмосиликат природного происхождения, обладает выраженными сорбционными (за счет дискоидно-кристаллической структуры) и обволакивающими (вследствие высокого уровня текучести) свойствами.

Смектика мед показан для симптоматического лечения:

- острой диареи у детей старше 2-х лет и взрослых в комплексной терапии с раствором для пероральной регидратации;
- хронической функциональной диареи у взрослых;

- боли в животе, которая связана с функциональными расстройствами кишечника у взрослых.

Рекомендуемый курс лечения – 3-7 дней.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА СМЕКТИКА МЕД.

Не принимайте препарат Смектика мед, если:

- у вас аллергия на действующие вещества или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- у вас кишечная непроходимость;
- у вас фенилкетонурия.

Если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам, не принимайте данный препарат. Если Вы не уверены, прежде чем принять препарат Смектика мед, посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки:

- если у Вас тяжелые хронические запоры в анамнезе;

Если Вы не уверены, относится ли что-либо из вышеуказанного к Вам, перед приемом данного препарата посоветуйтесь с врачом или фармацевтом.

Состояния, на которые необходимо обратить внимание

У взрослых регидратация назначается при необходимости.

Продолжительность регидратации оральным или внутривенным регидратационным раствором назначается в зависимости от течения заболевания, возраста и особенностей пациента.

Пациент должен быть информирован о необходимости проведения регидратации солеными или сладкими растворами для восполнения потери жидкости из-за диареи (ежедневная норма потребления жидкости для взрослого – до 2 литров). Необходимо следить за рационом питания во время диареи: исключить из рациона сырые фрукты и овощи, острую и жареную пищу, консервированные продукты и напитки.

Следует избегать длительного применения препарата.

Взаимодействие препарата Смектика мед с другими лекарственными средствами

Если Вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какое-либо лекарственное средство, поставьте об этом в известность врача.

При одновременном применении Смектика мед может уменьшать скорость и степень абсорбции других лекарственных средств. Не рекомендуется принимать препарат одновременно с другими лекарственными средствами.

Интервал между приемом Смектики мед и других лекарственных средств должен составлять более 2 часов (если это возможно).

Дети и подростки

У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального регидратационного раствора во избежание обезвоживания.

Следует избегать применения препарата детей в возрасте до 2 лет, стандартом лечения острой диареи является применение раствора для пероральной регидратации.

Беременность и грудное вскармливание

Применение не рекомендуется.

Если вы думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

Информация о вспомогательных веществах

Препарат Смектика мед содержит сахарозу. Применение лекарственного средства не рекомендуется пациентам с нарушением всасывания глюкозы и галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы и у пациентов с непереносимостью фруктозы.

Препарат Смектика мед содержит источник фенилаланина аспартам. Может оказаться вредным для людей с фенилкетонурией.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СМЕКТИКА МЕД

Рекомендуемая доза:

Лечение острой диареи:

- дети от 2-х лет и старше: 4 пакета в день в течение 3 дней, затем 2 пакета в день;
- взрослые: в среднем 3 пакета в день. В начале лечения суточная доза может быть удвоена;

Другие показания:

- взрослые: в среднем 3 пакета в день.

Пациенты пожилого возраста

Не требуется коррекции режима дозирования.

Пациенты с нарушением функции почек или печени:

Не требуется коррекции режима дозирования.

Способ применения

Перед употреблением содержимое пакета растворить в воде до получения суспензии.

Предпочтительнее применять лекарственное средство:

- после приема пищи при эзофагитах;
- в промежутках между приемами пищи при других показаниях.

Для детей старше 2-х лет:

Содержимое пакета растворить в 50 мл воды и распределить на несколько приемов в течение дня или тщательно размешать с каким-нибудь полужидким продуктом: бульоном, компотом, пюре, детским питанием.

Для взрослых:

Содержимое пакета растворить в половине стакана (100 мл) воды.

Пропуск приема препарата

При пропуске приема примите препарат, как только об этом вспомните. Следующую за этим дозу нельзя принимать слишком рано, до ее приема необходимо подождать около 4 часов. Не принимайте двойную дозу для компенсации пропущенной.

Прекращение лечения

Рекомендуемый курс лечения – 3-7 дней. Если у Вас имеются вопросы по применению данного препарата, посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ.

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Сообщалось о случаях побочных реакций при приеме лекарственного средства у детей и взрослых. Побочные эффекты, как правило, были незначительными, кратковременными и, в основном, связаны с пищеварительной системой.

Со стороны пищеварительной системы: частые – запор, как правило, проходящий после коррекции дозы лекарственного средства, но в некоторых случаях требовалось прекращение лечения; нечастые – метеоризм, рвота.

Сообщалось о случаях гиперчувствительности к лекарственному средству (крапивница, сыпь, зуд, ангионевротический отек) и обострение запоров.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СМЕКТИКА МЕД

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте. Препарат хранить в сухом месте при температуре ниже 25°C.

Срок годности - 2 года. Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на картонной пачке. Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте лекарственные средства в канализацию или домашний мусор. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ.

Препарат Смектика мед содержит

Действующим веществом является смектит диоктаэдрический (3 г).

Прочими вспомогательными веществами являются: аспартам, ароматизатор «Апельсин» (мальтодекстрин, модифицированный крахмал (Е-1450), бутилгидроксанизол, ароматическая композиция), сахар (экстра)..

Внешний вид препарата Смектика мед и содержимое упаковки

Порошок от серовато-белого до коричневатого-желтого цвета.

Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения: суспензия серого с коричневатым оттенком цвета с запахом апельсина.

По 5 г порошка в пакет из комбинированного материала (бумага, полиэтилен, алюминиевая фольга, полиэтилен), запаянный с четырех сторон.

По десять пакетов вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Иностранное производственное унитарное предприятие «Мед-интерпласт», Республика Беларусь

Адрес: 222603, Республика Беларусь, Минская область, г. Несвиж, ул. Ленинская, 115, ком. 204.

За любой информацией о препарате следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения:

ООО «Санаре Фарм», Республика Армения

Адрес: Республика Армения, Арташат

Тел.: (+374) 91403299

Листок-вкладыш пересмотрен

-

Порядок розничной реализации лекарственного препарата

Без рецепта врача.