

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Руфиксало таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг или 20 мг
ривароксабан

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Руфиксало, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Руфиксало
3. Применение препарата Руфиксало
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Руфиксало
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Руфиксало, и для чего его применяют

Препарат Руфиксало содержит действующее вещество ривароксабан.

Препарат Руфиксало применяется у взрослых для:

- профилактики образования тромбов в головном мозге (инсульт) и других кровеносных сосудов в организме, а также при состоянии, называемом неклапанной фибрилляцией предсердий (нарушение ритма сердца);
- лечения тромбов в венах ног (тромбоз глубоких вен) и кровеносных сосудах легких (тромбоэмболия легочной артерии), а также предотвращения повторного образования тромбов в кровеносных сосудах ног и/или легких.

Препарат Руфиксало применяется у детей и подростков в возрасте до 18 лет и с массой тела 30 кг и более для:

- лечения тромбов и предотвращения повторного свертывания крови в венах или кровеносных сосудах легких после начальной терапии продолжительностью не менее 5 дней инъекционными препаратами, предназначенными для лечения тромбов.

Препарат Руфиксало относится к антитромботическим лекарственным средствам. Он действует, блокируя фактор свертывания крови (фактор Ха) и, таким образом, снижает склонность крови к формированию тромбов.

2. О чем следует знать перед применением препарата Руфиксало

Не применяйте препарат Руфиксало, если:

- у Вас повышенная чувствительность к ривароксабану или любым вспомогательным веществам препарата (перечисленные в разделе 6);
- у Вас обильное кровотечение;
- у Вас заболевание или состояние, связанное с повышенным риском большого кровотечения, (например, язва желудка, травмы головного мозга или внутримозговое кровоизлияние, недавнее хирургическое вмешательство на головном мозге или глазах);
- Вы принимаете препараты для предотвращения образования тромбов (например, варфарин, дабигатран, аписабан или гепарин), за исключением особых случаев перехода на другую антикоагулянтную терапию или когда гепарин вводится в дозах, необходимых для обеспечения проходимости центрального венозного или артериального катетера;
- у Вас заболевание печени, которое приводит к повышенному риску кровотечения;
- Вы беременны или кормите грудью.

Если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам, **не принимайте препарат Руфиксало и обратитесь к своему лечащему врачу.**

Предупреждения и меры предосторожности

Перед применением препарата Руфиксало проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или фармацевтом.

Будьте особенно осторожны с препаратом Руфиксало:

- если существует повышенный риск кровотечения, которое может возникнуть при таких состояниях, как:
 - тяжелое заболевание почек, так как функция почек может влиять на количество препарата, действующего на организм,
 - использование других препаратов для предотвращения образования тромбов (например, варфарин, дабигатран, аписабан или гепарин), при переходе на другую антикоагулянтную терапию или при применении гепарина в дозах,

- необходимых для обеспечения проходимости центрального венозного или артериального катетера (см. раздел «Другие препараты и препарат Руфиксало»),
- нарушения свертываемости крови,
 - повышенное артериальное давление, неконтролируемое медикаментозной терапией,
 - заболевания желудка или кишечника, которые могут привести к кровотечению, например воспаление кишечника или желудка или воспаление пищевода, например из-за гастроэзофагеального рефлюкса (заболевание, при котором желудочная кислота попадает в пищевод) или опухоли желудка или кишечника или мочеполовой системы,
 - проблема с кровеносными сосудами в задней части глаза (ретинопатия),
 - заболевание легких, при котором бронхи расширены и заполнены гноем (бронхоэктазия), или предыдущее кровотечение из легких,
- если у Вас установлен искусственный клапан сердца;
- если Вы знаете, что у Вас заболевание, называемое антифосфолипидным синдромом (нарушение иммунной системы, вызывающее повышенный риск образования тромбов), сообщите своему врачу, который примет решение о необходимости изменения лечения;
- если Ваш врач определит, что Ваше артериальное давление нестабильно, или планируется другое лечение или хирургическая операция по удалению тромба из легких.

Если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам, сообщите об этом лечащему врачу, прежде чем начать прием препарата Руфиксало.
Ваш врач примет решение, следует ли Вам принимать этот препарат и требуется ли Вам более тщательное наблюдение.

Если Вы должны подвергнуться хирургическому вмешательству

- Очень важно принимать препарат Руфиксало до и после хирургического вмешательства, точно в то время, которое Вам назначил врач.
- Если хирургическое вмешательство включает катетер или инъекцию в позвоночник (например, эпидуральная или спинальная анестезия или уменьшение боли):
 - очень важно принимать препарат Руфиксало до и после инъекции или удаления катетера точно в то время, которое Вам назначил врач;
 - немедленно сообщите своему врачу, если после окончания анестезии Вы почувствуете онемение или слабость в ногах или проблемы с кишечником или мочевым пузырем, поскольку необходима неотложная помощь.

Дети и подростки

Руфиксало таблетки, покрытые пленочной оболочкой, **не рекомендуются к применению детям с массой тела менее 30 кг.** Нет достаточно данных о применении у детей и подростков по показаниям для взрослых.

Другие препараты и препарат Руфиксало

Сообщите лечащему врачу или фармацевту о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты, в том числе отпускаемые без рецепта.

Сообщите своему врачу, **если Вы принимаете:**

- некоторые противогрибковые препараты (например, флуконазол, итраконазол, вориконазол, позаконазол), и они не наносятся на кожу;
- таблетки кетоконазола (используются для лечения синдрома Кушинга, заболевание при котором организм производит избыточное количество кортизола);
- некоторые антибактериальные препараты (например, кларитромицин, эритромицин);
- некоторые противовирусные препараты для лечения ВИЧ/СПИДа (например, ритонавир);
- другие лекарственные препараты для снижения свертывания крови (например, эноксапарин, клопидогрел или антагонисты витамина К, такие как варфарин и аценокумарол);
- противовоспалительные и обезболивающие препараты (например, напроксен или ацетилсалициловая кислота);
- дронедазон, антиаритмический препарат;
- некоторые препараты для лечения депрессии (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина [SSRI] или серотонина-норэпинефрина [SNRI]).

Если что-либо из вышперечисленного относится к Вам, сообщите своему врачу, прежде чем принимать препарат Руфиксало, потому что эффект препарата Руфиксало может быть усилен. Ваш врач примет решение, следует ли Вам принимать препарат Руфиксало и требуется ли Вам более тщательное наблюдение. Если Ваш врач считает, что у Вас повышенный риск развития язв желудка или кишечника, он может назначить профилактическое лечение язвы.

Сообщите своему врачу, **если Вы принимаете:**

- некоторые препараты для лечения эпилепсии (фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал);
- зверобой (*Hypericum perforatum*), растительный лекарственный препарат, используемый при депрессии;
- рифампицин, антибиотик.

Если что-либо из вышперечисленного относится к Вам, сообщите своему врачу, прежде чем принимать препарат Руфиксало, потому что эффект препарата Руфиксало может быть уменьшен. Ваш врач примет решение, следует ли Вам принимать препарат Руфиксало и требуется ли Вам более тщательное наблюдение.

Беременность и грудное вскармливание

Не принимайте препарат Руфиксало, если Вы беременны или кормите грудью.

Если есть вероятность беременности, используйте эффективную контрацепцию во время лечения препаратом Руфиксало. Если Вы забеременели во время приема этого препарата, немедленно сообщите об этом своему врачу, который примет решение, как Вам следует лечиться.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Руфиксало может вызвать головокружение (частый побочный эффект) или обморок (нечастый побочный эффект) - см. раздел 4 «Возможные нежелательные реакции»). Если это происходит, не управляйте автомобилем или механизмами, не катайтесь на велосипеде.

Препарат Руфиксало содержит лактозу и натрий

Если Ваш врач сказал, что у Вас есть непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с ним, прежде чем принимать этот лекарственный препарат. Препарат содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на таблетку, т.е. практически не содержит натрия.

3. Применение препарата Руфиксало

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Препарат Руфиксало следует принимать вместе с едой.

Таблетки следует проглатывать, запивая водой.

Если Вам трудно проглотить таблетку целиком, посоветуйтесь со своим врачом о других способах приема препарата Руфиксало. Таблетку можно измельчить и смешать с водой или яблочным пюре непосредственно перед приемом. Затем следует сразу принять пищу.

При необходимости Ваш врач может также дать Вам измельченную таблетку Руфиксало через желудочный зонд.

Рекомендуемая дозировка

- **Взрослые**

- Для предотвращения образования тромбов в головном мозге (инсульт) и других кровеносных сосудов, рекомендуемая доза - 1 таблетка Руфиксало 20 мг один раз в день. Если у Вас проблемы с почками, дозу можно уменьшить до 1 таблетки Руфиксало 15 мг один раз в день.

Если Вы лечитесь от закупорки кровеносных сосудов в сердце (процедура, называемая чрескожным коронарным вмешательством – ЧКВ, с установкой стента), существуют ограниченные данные о снижении дозы до одной

таблетки Руфиксало 15 мг один раз в день (или до одной таблетки Руфиксало 10 мг один раз в день при проблемах с почками) в дополнение к антиагрегантному препарату, как например, клопидогрел.

- Для лечения тромбов в венах ног и тромбов в кровеносных сосудах легких и для предотвращения повторного образования тромбов, рекомендуемая доза - 1 таблетка Руфиксало 15 мг два раза в день в течение первых 3 недель, затем рекомендуемая доза - 1 таблетка Руфиксало 20 мг один раз в день. По крайней мере, через 6 месяцев лечения сгустка крови Ваш врач может решить продолжить лечение одной таблеткой 10 мг один раз в день или одной таблеткой 20 мг один раз в день.

Если у Вас проблемы с почками и Вы принимаете одну таблетку Руфиксало 20 мг один раз в день, Ваш врач может решить снизить дозу через 3 недели до одной таблетки Руфиксало 15 мг один раз в день, если риск кровотечения превышает риск образования еще одного сгустка.

- **Дети и подростки**

Доза препарата Руфиксало зависит от массы тела и рассчитывается врачом.

- Рекомендуемая доза для детей и подростков с массой тела от 30 кг до менее 50 кг - 1 таблетка Руфиксало 15 мг один раз в день.

- Рекомендуемая доза для детей и подростков с массой тела 50 кг или более - 1 таблетка Руфиксало 20 мг один раз в день.

Принимайте каждую дозу препарата Руфиксало, запивая жидкостью (например, водой или соком) вместе с едой. Принимайте таблетки примерно в одно и то же время каждый день. Вы можете установить будильник, чтобы напоминать Вам.

Для родителей или опекунов: наблюдайте за ребенком, чтобы убедиться, что он принял полную дозу.

Поскольку доза препарата Руфиксало зависит от массы тела, важно регулярно посещать врача, при изменении массы тела может потребоваться корректировка дозы.

Никогда не корректируйте дозу препарата Руфиксало самостоятельно. При необходимости врач скорректирует дозу.

Не разламывайте таблетку, чтобы получить часть дозы таблетки. Если требуется более низкая доза, используйте другую форму ривароксабана, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь.

Детям и подросткам, которые не могут проглотить таблетки целиком, нельзя применять таблетки Руфиксало.

Если пероральная суспензия ривароксабана недоступна, Вы можете измельчить таблетку Руфиксало и смешать ее с водой или яблочным пюре непосредственно перед приемом. Затем следует сразу принять пищу. При необходимости Ваш врач может также дать Вам измельченную таблетку Руфиксало через желудочный зонд.

Если Вы выплюнули дозу или Вас вырвало

- менее чем через 30 минут после приема препарата Руфиксало примите новую дозу.
- более чем через 30 минут после приема препарата Руфиксало **не принимайте** новую дозу. В этом случае примите следующую дозу препарата Руфиксало в обычное время.

Обратитесь к врачу, если после приема препарата Руфиксало Вы часто выплевываете дозу или Вас рвет.

Когда начинать лечение препаратом Руфиксало

Принимайте препарат каждый день, пока врач не скажет Вам прекратить.

Старайтесь принимать таблетку в одно и то же время каждый день, чтобы было легче запомнить и не пропустить прием.

Ваш врач примет решение, сколько должно длиться лечение.

Для предотвращения образования тромбов в головном мозге (инсульт) и других кровеносных сосудах тела:

- Если необходимо нормализовать ритм сердца с помощью процедуры, называемой кардиоверсией, принимайте препарат Руфиксало в назначенное врачом время.

Если Вы забыли принять препарат Руфиксало

Взрослые, дети и подростки:

- Если Вы принимаете по одной таблетке 20 мг или по одной таблетке 15 мг **один раз** в день и пропустили прием, примите ее, как только вспомните. Не принимайте более одной таблетки в день, чтобы восполнить пропущенную дозу. Примите следующую таблетку на следующий день, затем продолжайте принимать по одной таблетке один раз в день.

Взрослые:

- Если Вы принимаете по одной таблетке 15 мг **два раза** в сутки и пропустили дозу, примите ее, как только вспомните. Не принимайте более двух таблеток по 15 мг в день. Если Вы забыли принять дозу, Вы можете принять две таблетки по 15 мг одновременно, чтобы получить в общей сложности 30 мг за один день. На следующий день следует продолжить прием по одной таблетке 15 мг два раза в день.

Если Вы приняли препарата Руфиксало больше, чем следовало

Если Вы приняли слишком много таблеток препарата Руфиксало, немедленно обратитесь к врачу.

При приеме большой дозы препарата Руфиксало увеличивается риск кровотечений.

Если Вы прекратили прием препарата Руфиксало

Не прекращайте прием препарата Руфиксало, не посоветовавшись предварительно с врачом, поскольку препарат Руфиксало предотвращает развитие серьезного состояния.

Если у Вас есть дополнительные вопросы по применению этого препарата, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или фармацевтом.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Руфиксало может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Как и другие аналогичные препараты, снижающие свертываемость крови, препарат Руфиксало может вызвать кровотечение, которое может быть опасным для жизни. Обильное кровотечение может привести к резкому падению артериального давления (шоку). В некоторых случаях кровотечение может быть неочевидным.

Немедленно обратитесь к лечащему врачу, если почувствуете любую из приведенных ниже нежелательных реакций:

Признаки кровотечения:

- внутримозговое или внутричерепное кровоизлияние (симптомы могут включать головную боль, слабость на одной стороне тела, рвоту, судороги, снижение уровня сознания и ригидность шеи. Серьезное заболевание. Требуется срочная медицинская помощь!)
 - длительное или обильное кровотечение;
 - крайняя слабость, усталость, бледность, головокружение, головная боль, кровоподтеки, появляющиеся без причин, одышка, боль в груди или стенокардия.
- Ваш врач может решить следить за Вашим состоянием или изменить лечение.

Признаки тяжелых кожных реакций:

- интенсивная кожная сыпь, волдыри или поражения слизистой оболочки, например во рту или в глазах (синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз).
 - реакция на препарат, вызывающая сыпь, лихорадку, воспаление внутренних органов, аномалии крови и системные заболевания (DRESS-синдром).
- Эти побочные эффекты встречаются очень редко (у 1 человека из 10 000).

Признаки тяжелых аллергических реакций:

- отек лица, губ, рта, языка или горла; затруднение глотания; крапивница и затруднение дыхания; внезапное падение артериального давления.
- Тяжелые аллергические реакции встречаются очень редко (анафилактические реакции, включая анафилактический шок, могут возникать не более чем у 1

человека из 10 000) или нечасто (ангионевротический отек и аллергический отек - могут возникать не более чем у 1 человека из 100).

Полный список возможных побочных эффектов, наблюдаемых у взрослых, детей и подростков:

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- снижение количества красных кровяных клеток, что может привести к бледности кожи и вызвать слабость или одышку;
- желудочное или кишечное кровотечение, кровотечение из мочеполового тракта (включая кровь в моче и более обильное менструальное кровотечение), носовое кровотечение, кровоточивость десен;
- кровоизлияние в глаз (включая кровоизлияние в конъюнктиву);
- излияние крови в ткани или полости организма (гематома, синяки);
- кровохаркание;
- кожные и подкожные кровоизлияния;
- послеоперационное кровотечение;
- кровотечение или выделение жидкости из раны;
- отек конечностей;
- боль в конечностях;
- нарушение функции почек (может быть обнаружено с помощью анализов, проведенных врачом);
- лихорадка;
- боль в животе, нарушение пищеварения, тошнота или рвота, запор, диарея;
- пониженное артериальное давление (симптомы могут включать головокружение или обморок при стоянии);
- снижение общей силы и энергии (слабость, усталость), головная боль, головокружение;
- сыпь, зуд;
- анализы крови могут показать повышение уровня некоторых печеночных ферментов.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- внутримозговое или внутричерепное кровоизлияние (см. выше, признаки кровотечения);
- кровоизлияние в полость сустава, вызывающее боль и отек;
- тромбоцитопения (низкое количество тромбоцитов, клеток, способствующих свертыванию крови);
- аллергические реакции, в том числе кожные аллергические реакции;
- нарушение функции печени (может быть обнаружено с помощью анализов, проведенных врачом);
- анализы крови могут показать повышение билирубина, некоторых ферментов поджелудочной железы и печени или количества тромбоцитов;
- обморок;
- ухудшение общего самочувствия;

- учащенное сердцебиение;
- сухость во рту;
- крапивница.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- кровоизлияние в мышцы;
- холестаз (уменьшение оттока желчи), гепатит, в т.ч. гепатоцеллюлярное повреждение (воспаление печени, включая поражение печени);
- пожелтение кожи и белков глаз (желтуха);
- локализованный отек;
- скопление крови (гематома) в паху, в качестве осложнения кардиологической операции, при которой катетер вводится в артерию ноги (псевдоаневризма).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000)

- накопление эозинофилов, типа белых гранулоцитарных клеток крови, которые вызывают воспаление легких (эозинофильная пневмония).

Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- почечная недостаточность вследствие обильного кровотечения;
- повышенное давление в мышцах ног или рук после кровотечения, приводящее к боли, отеку, изменению чувствительности, онемению или параличу (компармент-синдром вследствие кровотечения).

Побочные эффекты у детей и подростков

Побочные эффекты, наблюдаемые у детей и подростков, получавших препарат Руфиксало, были в целом аналогичны по типу побочным эффектам, наблюдаемым у взрослых, и были в основном от легкой до умеренной степени тяжести.

Побочные эффекты, которые чаще наблюдались у детей и подростков:

Очень часто (могут возникать более чем у 1 человека из 10):

- головная боль;
- лихорадка;
- носовое кровотечения;
- рвота.

Часто (могут возникать у 1 человека из 10):

- учащенное сердцебиение;
- анализы крови могут показать повышение билирубина (желчного пигмента);
- тромбоцитопения (низкое количество тромбоцитов, клеток, способствующих свертыванию крови);
- обильное менструальное кровотечение.

Нечасто (могут возникать у 1 человека из 100):

- анализы крови могут показать повышение подкатегории билирубина (прямой билирубин, желчный пигмент).

5. Хранение препарата Руфиксало

Храните препарат в недоступном для детей месте!

Препарат не требует специальных условий хранения.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на картонной пачке и на каждом блистере после «Годен до:». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Не выливайте препарат в канализацию или водопровод. Уточните у фармацевта, как следует уничтожать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Что содержит препарат Руфиксало

Действующее вещество: ривароксабан.

Каждая таблетка содержит ривароксабана 15 мг или 20 мг.

Вспомогательные вещества:

Таблеточное ядро: натрия лаурилсульфат; лактоза; полоксамер 188; целлюлоза микрокристаллическая; натрия кроскармеллоза, магния стеарат; кремния диоксид коллоидный безводный.

См. раздел 2 «Препарат Руфиксало содержит лактозу и натрий»

Пленочная оболочка: гипромеллоза; титана диоксид (E171); макрогол 3350; краситель железа оксид красный (E172).

Описание лекарственного препарата Руфиксало и содержимое упаковки

Руфиксало таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг:

Круглые двояковыпуклые таблетки красного цвета с гравировкой «15» на одной стороне и гладкие с другой стороны.

По 14 таблеток в Ал/ПВХ/ПЭ/ПВДХ блистер.

По 28 таблеток (2 блистера по 14 таблеток) или 42 таблетки (3 блистера по 14 таблеток) вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Руфиксало таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг:

Круглые двояковыпуклые таблетки коричнево-красного цвета с гравировкой «20» на одной стороне и гладкие с другой стороны.

По 14 таблеток в Ал/ПВХ/ПЭ/ПВДХ блистер.

Руфиксало таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг или 20 мг

Листок-вкладыш: Информация для потребителя



По 28 таблеток (2 блистера по 14 таблеток) вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска препарата

Отпускают по рецепту.

Номер и дата регистрационного удостоверения

Производитель и держатель регистрационного удостоверения

АЛКАЛОИД АД Скопье

Бульвар Александар Македонски 12

1 000 Скопье, Республика Северная Македония

тел.: + 389 2 31 04 000

факс: + 389 2 31 04 021

Памятка для пациента

Руфиксало таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг

Руфиксало таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг

- Всегда носите с собой эту часть листка-вкладыша.
- Покажите эту часть листка-вкладыша каждому врачу или стоматологу перед началом лечения

Я получаю антикоагулянтную терапию Руфиксало (ривароксабан)

ФИО:

Адрес:

Дата рождения:

Вес:

Другие препараты/сопутствующие заболевания:

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, пожалуйста, сообщите:

ФИО врача:

Номер телефона врача:

Штамп врача:

Пожалуйста, также сообщите:

ФИО:

Номер телефона:

Отношения/родство:

Руководство для поставщиков медицинских услуг:

- Измерение МНО нецелесообразно для определения антикоагулянтной активности препарата Руфиксало, и поэтому не должно использоваться для этой цели.

Что нужно знать о препарате Руфиксало?

- Препарат Руфиксало снижает свертываемость крови, предотвращая образование тромбов.
- Препарат Руфиксало необходимо принимать в соответствии с назначением врача. Чтобы обеспечить оптимальное лечение, **никогда не пропускайте прием препарата.**
- Не прекращайте прием препарата Руфиксало без консультации с врачом. Прекращение приема препарата может способствовать повышению риска образования тромбов.
- До начала приема препарата Руфиксало сообщите врачу обо всех других лекарственных препаратах, которые Вы принимаете в настоящее время, принимали недавно или собираетесь начать принимать. Обязательно

сообщайте врачу о приеме препарата Руфиксало перед любой хирургической операцией или инвазивными процедурами.

Когда мне следует обратиться за советом к своему врачу?

При приеме разжижителя крови, такого как Руфиксало, важно знать о его возможных побочных эффектах.

Кровотечение - самый частый побочный эффект. Не начинайте принимать препарат Руфиксало, если Вы знаете, что у Вас есть риск кровотечения, без предварительной консультации с врачом. Немедленно сообщите своему врачу, если у Вас есть какие-либо признаки или симптомы кровотечения, такие как:

- боль;
- отечность или дискомфорт;
- головная боль, головокружение или слабость;
- кровоподтеки, появляющиеся без причин, носовые кровотечения, кровотечения из десен, кровотечения при порезах, которые не останавливаются в течение более длительного времени, чем обычно;
- более обильные, чем обычно, менструальные выделения, или вагинальные кровотечения;
- розовая или коричневая моча, стул красного или черного цвета;
- кровохарканье или рвота с кровью или рвота, похожая на «кофейную гущу».

Как принимать препарат Руфиксало?

- Для обеспечения оптимальной эффективности, препарат Руфиксало таблетки, покрытые пленочной оболочкой 15 мг следует принимать вместе с едой.
- Для обеспечения оптимальной эффективности, препарат Руфиксало таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг следует принимать вместе с едой.