

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата (Листок-вкладыш)

Торговое наименование
ГЕРПЕВИР®

Международное непатентованное название
Aciclovir

Лекарственная форма, дозировка
Мазь, по 5 г и 15 г

Фармакотерапевтическая группа
Противовирусные средства. Ацикловир. Код АТС D06B B03.

Показания к применению

Инфекции губ и лица, вызванные вирусом простого герпеса (*Herpes labialis*).

Перечень сведений, необходимых до начала применения

Противопоказания

Гиперчувствительность к ацикловиру, валацикловиру, пропиленгликолю или к другим компонентам мази.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами

Взаимодействия не обнаружено.

Специальные предупреждения

Мазь следует применять только для лечения герпеса на губах и лице.

Не рекомендуется наносить мазь на слизистые оболочки ротовой полости, глаз и применять ее для лечения генитального герпеса.

Следует избегать случайного попадания мази в глаза.

Лица, которые страдают от особенно тяжелых и повторяющихся проявлений *Herpes labialis*, нуждаются в консультации врача. Пациентов с герпесом нужно предостеречь от контактной передачи вируса другим людям, особенно при наличии открытых поражений (например, мыть руки до и после использования мази). Не рекомендуется применять пациентам с иммунодефицитом. Такие пациенты нуждаются в консультации врача относительно лечения любой инфекции.

Лекарственное средство содержит пропиленгликоль, который может вызывать раздражение кожи.

Применение у детей

Данных относительно безопасности применения препарата детям в возрасте до 12 лет недостаточно, поэтому рекомендуется применять препарат детям в возрасте от 12 лет.

Во время беременности или лактации

Беременным и женщинам, которые кормят грудью, препарат рекомендуется применять только в тех случаях, когда польза, по мнению врача, превышает риск.

Особенности влияния препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Данные отсутствуют.

Рекомендации по применению

Препарат предназначен только для наружного применения.

Детям в возрасте от 12 лет и взрослым мазь Герпевир® нужно наносить 5 раз в день приблизительно с 4-часовыми интервалами, за исключением ночного времени. Важно начать лечение как можно быстрее в начале инфекции, лучше – во время

продромального периода или на стадии эритемы. Можно начать лечение и на поздних стадиях – папулы или пузыри.

Лечение должно продолжаться не менее 4 дней. Если заживления не произошло, можно продолжать лечение до 10 дней. Если симптомы заболевания не исчезают после 10 дней лечения, больному необходимо обратиться к врачу. Следует вымыть руки до и после применения мази, и избегать излишнего трения или касания полотенцем пораженных участков, чтобы предотвратить обострение или передачу инфекции.

Меры, которые необходимо принять в случае передозировки

При случайном пероральном или местном применении всего тюбика мази неблагоприятное действие маловероятно из-за минимального системного влияния. В случае подозрения на передозировку необходимо обратиться за медицинской помощью.

Рекомендации по обращению за консультацией к медицинскому работнику для разъяснения способа применения лекарственного препарата

Для разъяснения способа применения лекарственного препарата рекомендуется обратиться к медицинскому работнику.

Описание нежелательных реакций, которые проявляются при стандартном применении ЛП и меры, которые следует принять в этом случае

У некоторых пациентов при применении мази может появиться временная быстропроходящая острыя или жгучая боль. Приблизительно у 5 % пациентов возможно незначительное высушивание и шелушение кожи. Также у небольшой части пациентов возможны эритема (покраснение) и зуд. Очень редко сообщалось о случаях контактного дерматита после местного применения препаратов ацикловира, и чаще всего это связано с компонентами мазевой основы, а не с ацикловиром. Имеются единичные сообщения о реакциях немедленной гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, вследствие местного применения ацикловира.

Сообщение о нежелательных побочных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации лекарственного препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза – риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальную систему сообщения о нежелательных реакциях и неэффективности лекарственных препаратов.

Дополнительные сведения

Состав лекарственного препарата

1 г мази содержит:

действующее вещество: ацикловира в пересчете на 100 % вещество 25 мг.

вспомогательные вещества: пропиленгликоль, полоксамер 338, полиэтиленоксид 400, эмульгатор № 1.

Описание внешнего вида, запаха, вкуса

Однородная мазь белого цвета со слабым специфическим запахом.

Несовместимость.

Неприменимо.

Форма выпуска и упаковка

По 5 г или 15 г в тубе, 1 туба в пачке.

Срок хранения

5 лет

Не применять по истечении срока годности!

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке, при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ПАО «Киевмедпрепарат», Украина, 01032, г. Киев, ул. Саксаганского, 139.

тел/факс: +38-044-490-75-22

E-mail: office@arterium.ua

Дата последнего пересмотра

01.06.2023