

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
CAFFETIN LADY® / КАФФЕТИН ЛЕДИ
Таблетки покрытые пленочной оболочкой

Прочитайте внимательно эту инструкцию, прежде чем начать применение препарата!

Лекарственное средство отпускают без рецепта. Однако, следует соблюдать осторожность при применении Каффетин леди для достижения наиболее удовлетворительных результатов.

- *Храните эту инструкцию. Вам может понадобиться перечитать ее снова.*
- *Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с фармацевтом.*
- *Если Ваши симптомы обостряются или не улучшаются после 3 дней применения препарата, проконсультируйтесь с врачом.*
- *Если некоторые побочные действия станут серьезными или заметите побочное действие, которое не указано в этой инструкции, пожалуйста, проинформируйте Вашего врача или фармацевта.*

Инструкция по применению содержит:

1. Что представляет собой Каффетин леди и для чего применяется
2. Что необходимо знать до применения Каффетин леди
3. Как применять Каффетин леди
4. Возможные побочные действия
5. Хранение и срок годности Каффетин леди
6. Дополнительные информации

APPROVED BY SCDMTE JSC

EXPERT/DATA_ dsh/08.02.17

APPLICANT/DATA_ J. Kono-09.02.17

1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КАФФЕТИН ЛЕДИ И ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЕТСЯ

Каффетин леди содержит ибупрофен лизинат, который является очень эффективным болеутоляющим средством с быстрым действием. Каффетин леди применяют для ослабления менструальной боли.

2. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ДО ПРИМЕНЕНИЯ КАФФЕТИН ЛЕДИ

Не применяйте Каффетин леди если у Вас:

- были аллергические реакции на препарат или на другие компоненты препарата, на аспирин или другие нестероидные противовоспалительные препараты;
- были или есть язвенная болезнь или желудочно-кишечное кровотечение;
- выраженные нарушения функции печени, почек или заболевание сердца.

Каффетин леди не следует применять детям в возрасте до 12 лет.

Будьте особенно осторожны до применения Каффетин леди если у Вас:

- бронхиальная астма или аллергические заболевания;
- желудочно-кишечные расстройства;
- печеночная или почечная недостаточность.

Применение лекарств, таких как ибупрофен может незначительно увеличить риск сердечного приступа (инфаркта миокарда) или инсульта, скорее всего, при высоких дозах и длительном лечении. Не превышайте рекомендованную дозу или продолжительность лечения.

Если у Вас проблемы с сердцем, перенесенный инсульт или Вам кажется, что у Вас риск возникновения данных состояний (например, если у Вас высокое артериальное давление, сахарный диабет или высокий уровень холестерина или Вы курильщик), проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом в связи с лечением данным препаратом.

EXPERT/DATA_ *С.В. / 02.02.17*

Применение с другими лекарственными средствами

Посоветуйтесь, пожалуйста, с врачом или фармацевтом о всех лекарственных средствах, которые принимаете в настоящее время или принимали недавно, в том числе и те, которые отпускают без рецепта.

Особенно важно, если Вы одновременно принимаете следующие препараты: аспирин (более 75 мг / сут), другие нестероидные противовоспалительные препараты, оральные кортикостероиды, тромболитические препараты, пероральные антикоагулянты, метотрексат, литий, фенитоин, диуретики или антигипертензивные препараты.

Применение Каффетин леди одновременно с пищей или напитками

Пациентам с желудочно-кишечными расстройствами рекомендуется принимать таблетки с пищей.

При применении препарата Каффетин леди не рекомендуется применять алкоголь.

Беременность и кормление грудью

Посоветуйтесь с Вашим врачом или фармацевтом до начала применения какого-либо лекарственного средства.

Препарат предназначен для ослабления менструальной боли.

Вождение автотранспорта и управление механизмами

Каффетин леди не влияет на вождение автотранспорта и управление механизмами.

Важная информация о некоторых компонентах препарата Каффетин леди

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой содержат красители Е 110 и Е 124, которые могут вызвать аллергические реакции.

Препарат содержит соевый лецитин. Не используйте этот препарат при аллергии на арахис или сою.

Препарат содержит глюкозу. Если врач сказал вам, что у вас есть непереносимость некоторых сахаров, свяжитесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

3. КАК ПРИМЕНЯТЬ КАФФЕТИН ЛЕДИ

Взрослые и дети старше 12 лет

Однократная доза: по 1 - 2 таблетки.

Интервал между двумя приемами: 4 - 6 ч.

Максимальная суточная доза (в течение 24 ч) не должна превышать 6 таблеток, что соответствует 1200 мг ибупрофена.

Каффетин леди не предназначен для детей младше 12 лет.

Пациентам с желудочно-кишечными расстройствами рекомендуется принимать таблетки с пищей.

Если боль не устраняется после 3-х дней, нельзя продолжать лечение препаратом без консультации с врачом.

Таблетки Каффетин леди с линией разлома на одной стороне. Линия разлома служит для разламывания таблетки, если вам трудно проглотить целую таблетку.

Если Вы взяли больше Каффетин леди, чем необходимо:

Если Вы приняли повышенную дозу Каффетин леди, чем необходимо, срочно обратитесь к врачу или фармацевту.

Если Вы забыли взять Каффетин леди

Препарат принимают по мере необходимости, в зависимости от облегчения симптомов.

Не принимайте сразу двойную дозу, выше максимальной разовой дозы (2 таблетки).

Если у Вас возникли дополнительные вопросы относительно применения данного препарата, обратитесь к врачу или фармацевту.

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Как и все лекарственные средства Каффетин леди может вызвать побочные действия, которые не встречаются у всех пациентов.

При возникновении любого из следующих симптомов, важно сообщить об этом врачу, так как могут возникнуть более серьезные проблемы если симптомы игнорируются. Побочные эффекты перечислены по частоте:

Очень часто	у 1 из 10 пациентов
часто	менее 1 из 10, но более 1 из 100 пациентов
нечасто	менее 1 из 100, но более 1 из 1000 пациентов
редко	менее 1 из 1000, но более 1 из 10.000 пациентов

CAFFETIN LADY® / КАФФЕТИН ЛЕДИ, таблетки покрытые пленочной оболочкой

Инструкция по медицинскому применению препарата

очень редко	менее 1 из 10.000, но более 1 из 100.000 пациентов
-------------	--

нечасто: тошнота, боль в животе, диспепсия, головная боль, головокружение, кожная сыпь с зудом или без зуда.

APPROVED BY S...

редко: понос, запор, рвота, метеоризм.

EXPERT/DATA_ *Ch/03.02.17*

очень редко:

APPLICANT/... *J.P. Kaath 09.02.17*

- темный стул, похожий на деготь, язва желудка;
- обострение астмы, необъяснимое свистящее дыхание или одышка;
- отек лица, языка и горла;
- серьезные изменения кожи, как например волдыри, точечные кровотечения или струпы;
- нарушение функции печени и почек,
- изменения картины крови приводящие к усталости, хроническим инфекциям горла и синякам.

Применение лекарств, таких как ибупрофен может незначительно увеличить риск сердечного приступа (инфаркта миокарда) или инсульта.

Если некоторые побочные действия станут серьезными или заметите побочное действие, которое не указано в этой инструкции, пожалуйста, проинформируйте Вашего врача или фармацевта.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА КАФФЕТИН ЛЕДИ

Хранить в недоступном для детей месте!

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не использовать препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Дата истечения срока годности относится к последнему дню данного месяца.

Лекарственные средства нельзя выбрасывать в сточные воды и мусор.

Проконсультируйтесь с фармацевтом как утилизировать лекарственные средства, которые Вам не нужны. Данные меры помогут в защите окружающей среды.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Что содержит Каффетин леди

Активное вещество: ибупрофен.

Одна таблетка содержит ибупрофена 200 мг (в форме ибупрофена лизината);

вспомогательные вещества:

таблеточное ядро: целлюлоза силицифицированная микрокристаллическая (целлюлоза микрокристаллическая и кремния диоксид коллоидный безводный), коповидон, натрия кроскармеллоза, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, тальк.

CAFFETIN LADY® / КАФФЕТИН ЛЕДИ, таблетки покрытые пленочной оболочкой

Инструкция по медицинскому применению препарата

оболочка: опадрай II розовый (гидроксипропилметилцеллюлоза; титана диоксид (E 171); полидекстроза; тальк; мальтодекстрин; триглицериды средней цепи; краситель понсо 4R (E 124); краситель желтый закат FCF (E 110); краситель индигокармин (E 132));

опадрай fx серебристый (натрия карбоксиметилцеллюлоза; мальтодекстрин; глюкоза, моногидрат; пигмент перламутровый на основе титанированной слюды (E 555/E 171); лецитин (соя)).

Описание лекарственного препарата Каффетин леди и содержание упаковки

Продолговатые, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, пастельно-розового цвета с блестящим эффектом, с линией разлома на одной стороне.

По 10 таблеток в блистере перфорированном из фольги алюминиевой и пленки ПВХ; 1 блистер в пачке картонной вместе с инструкцией по применению препарата.

APPROVED BY SCDMTE JSC

Условия отпуска

Без рецепта.

EXPERT/DATA *dh* / 08.09.17

APPLICANT/DIT *J. Kucur* / 09.02.17

Производитель и держатель удостоверения на введение в обращение препарата

АЛКАЛОИД АД Скопье,
Бульвар Александар Македонски 12,
1000 Скопье, Республика Македония
тел.: + 389 2 31 04 000
факс: + 389 2 31 04 021
www.alkaloid.com.mk