

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

1. Название лекарственного средства

АПИЛАК ГРИНДЕКС таблетки подъязычные 10 мг.

2. Количественный и качественный состав

1 таблетка содержит

активное вещество: 10 мг пчелиного маточного молочка лиофилизированного,

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат.

Полный список вспомогательных веществ см. ниже в разделе 6.1.

3. Лекарственная форма

Таблетки подъязычные 10 мг.

Описание: таблетки на поверхности и в изломе белого или белого с желтоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрические с фаской. Допускаются мелкие желтые вкрапления.

4. Терапевтические показатели

4.1. Показания

- При расстройствах питания, в период выздоровления и при нарушении выделения молока в послеродовом периоде.
- В качестве вспомогательного средства при невротических расстройствах и пониженном давлении.

4.2. Способы применения и дозы

Таблетку апилака следует положить под язык до полного растворения, т. к. при приеме внутрь желудочный сок разлагает пчелиное маточное молочко.

Взрослым: по 1 таблетке 3 раза в сутки.

Длительность курса лечения составляет 10-15 дней.

4.3. Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата, к продуктам пчеловодства.
- Болезнь Аддисона (недостаточность коры надпочечников, для которой характерна пигментация кожи).
- Наследственная непереносимость галактозы, дефицит *Lapp*-лактазы или мальабсорбция глюкозы-галактозы.
- Детский возраст до 18 лет.

4.4. Предупреждения

Таблетки апилака могут вызывать аллергические реакции.

В связи с тем, что таблетки апилака содержат лактозу, их следует применять с осторожностью пациентам с сахарным диабетом.

4.5. Взаимодействия

Не отмечались.

4.6. Применение во время беременности и кормлении грудью

Применение возможно после консультации с врачом.

4.7. Способность влиять на реакции при действиях, требующих внимания

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и обслуживать механизмы.

4.8. Побочные действия

Возможны аллергические реакции, при появлении которых необходимо прекратить прием препарата. При повышенной чувствительности могут появиться сухость во рту, учащение пульса и нарушения сна, исчезающие при уменьшении дозы или отмене препарата.

При появлении побочных действий проконсультируйтесь с врачом.

4.9. Мероприятия, предпринимаемые при передозировке

Только небольшие количества пчелиного маточного молочка оказывают лечебное действие. При избыточном употреблении процессы обмена веществ тормозятся, например, употребление 2,5 г в день вызывает вялость.

При подозрении на передозировку обратитесь к врачу, упаковку препарата возьмите с собой.

5. Фармакологические свойства

5.1. Фармакодинамика

Биостимулирующее средство природного происхождения. Код АТХ: А13А.

Апилак или т. н. пчелиное маточное молочко представляет собой секрет, вырабатываемый аллотрофическими железами молодых рабочих пчел, обладающий общетонизирующим, антиспастическим, повышающим сопротивляемость организма и устойчивость к стрессам и стимулирующим обмен веществ действием.

Апилак является смесью биологически активных веществ, в состав которой входят:

- многие важные витамины (С, В₁, В₂, В₅, В₆, В₈, В₁₂, Н, фолиевая кислота, инозитол);
- минеральные элементы (К, Na, Ca, Mg, Fe, P) и микроэлементы (Zn, Mn, Cu, Co, S, Si, Ni, Cr, As, Bi);
- 23 различные аминокислоты, в том числе и незаменимые (например, гистидин, валин, метионин, триптофан);
- другие биологически активные вещества (например, фермент холинэстераза, медиатор ацетилхолин и др.)

5.2. Фармакокинетика

Действие препарата является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным.

5.3. Данные по предклинической безопасности

Доклинические исследования показали, что в опытах на животных (мыши и крысы) апилак обладает низкой токсичностью, проявляя токсическое действие в дозах 500 – 1000 мг/кг, т. е. более чем в 1000 раз превышающих разовую терапевтическую дозу для человека.

6. Фармацевтические свойства

6.1. Вспомогательные вещества

Лактозы моногидрат, крахмал картофельный, тальк, кальция стеарат.

6.2. Несовместимость

Не отмечалась.

6.3. Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

6.4. Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

6.5. Параметры упаковки

По 25 таблеток в блистере из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 1 или 2 блистера вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

6.6. Особые инструкции по применению и предупреждения

См. раздел «Предупреждения».

7. Производитель и владелец регистрационного удостоверения

АО «Гриндекс». Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия

Телефон: +371 67083205

Факс: +371 67083505

8. Дата последнего пересмотра документации

Август 2021 г.