

**ЛИСТОК- ВКЛАДЫШ**  
(Информация для потребителей)

**Дапсон**  
**100мг таблетки**

Дапсон

**Следует прочитать внимательно этот листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данный лекарственный препарат, так как он содержит важную информацию для Вас.**

- Следует сохранить этот листок-вкладыш. Возможно, его придется прочитать еще раз.
- Если у Вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы, следует обратиться к лечащему врачу или фармацевту.
- Данный лекарственный препарат выписан для Вас. Не следует давать его другим лицам. Он может навредить им, даже если у них схожие симптомы.
- Если у Вас изменилась тяжесть побочных эффектов или появились побочные эффекты, не перечисленные в этом листке-вкладыше, следует сообщить об этом лечащему врачу или фармацевту.

**Содержание листка-вкладыша:**

1. Что такое Дапсон таблетки и для чего они применяются
2. Что необходимо знать перед применением
3. Как принимать
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить
6. Дополнительная информация

**1. Что такое Дапсон таблетки и для чего они применяются**

Дапсон принадлежит к группе противомикробных препаратов. Механизм действия обусловлен ингибированием синтеза фолиевой кислоты у некоторых микроорганизмов, что приводит к остановке их роста.

***Дапсон используется для:***

- лечения проказы;
- лечения заболеваний кожи;
- профилактики малярии в сочетании с пириметамином;
- профилактики пневмонии у пациентов с иммунодефицитом, особенно у больных СПИДом.

**2. Что необходимо знать перед применением**

***Не принимать Дапсон и проинформировать вашего лечащего врача:***

- Если у Вас аллергия (гиперчувствительность) на дапсон или любой другой компонент препарата, перечисленный в подразделе «*Что содержит Дапсон*» (см. раздел б), или на аналогичные препараты, таких как сульфаниламиды или сульфоны. Аллергические реакции могут проявляться в виде кожной сыпи, зуда, затруднения дыхания или припухлости лица, губ, горла или языка.
- Если у Вас тяжелая анемия.
- Если у Вас порфирия (генетическое или наследственное заболевание, связанное с нарушением обмена красного кровяного пигмента, гемоглобина).
- Если у Вас дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФД), это может привести к развитию анемии после употребления определенных продуктов, такие как конские бобы (примахиновая анемия).

**Соблюдайте особую осторожность при приеме Дапсона и проконсультируйтесь со своим врачом, если Вы:**

- Страдаете от других заболеваний крови;
- Страдаете от болезней сердца или легких.

#### **Применение других лекарственных средств**

**Пожалуйста сообщите своему врачу или фармацевту, если Вы принимаете или недавно принимали любые другие лекарства, в том числе лекарства, которые отпускаются без рецепта. Особенно:**

- Пробенецид (для лечения подагры).
- Рифампицин или триметоприм (антибиотики для лечения инфекций).

*Посоветуйтесь со своим доктором или фармацевтом, прежде чем принимать какие-либо лекарства.*

#### **Беременность и кормление грудью**

Если Вы беременны или планируете забеременеть, ваш врач должен назначить Вам препараты фолиевой кислоты.

Дапсон выделяется с грудным молоком. Отмечены случаи, когда применение препарата Дапсон у матери при грудном вскармливании, вызвало развитие анемии у ребенка.

*Если Вы обеспокоены чем-либо, посоветуйтесь со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать какие-либо лекарства.*

### **3. Как принимать**

**Всегда принимайте препарат точно так, как ваш врач сказал Вам. Если Вы не уверены, как следует принимать препарат, посоветуйтесь с врачом или фармацевтом.**

Таблетки необходимо принимать **с небольшим количеством воды.**

#### **Дозы:**

- *Взрослые и дети старше 12 лет*

Для лечения мультибациллярной лепры:

100 мг/сут как минимум в течение двух лет.

Для лечения пауцибациллярной лепры:

100 мг/сут как минимум в течение 6 месяцев.

Для профилактики малярии:

100 мг дапсона в неделю в комбинации с пириметамином по 12.5 мг.

Для лечения герпетического дерматита:

Начальная доза 50 мг/сут с постепенным увеличением дозы до 300 мг/сут, затем ее снижают до поддерживающей дозы, 25-50 мг ежедневно.

Пневмоцистная пневмония:

В комбинации с триметопримом, 50-100 мг/сут или 100 мг 2 раза в неделю или 200 мг один раз в неделю.

- *Пожилых возраст*

Если у Вас патология печени, врач может назначить Вам более низкую дозу.

- *Дети от 6 до 12 лет*

Для лечения мультибациллярной лепры:

50 мг/сут как минимум в течение двух лет.

Для лечения пауцибациллярной лепры:

50 мг/сут как минимум в течение 6 месяцев.

Препарат следует принимать столько времени, сколько назначил врач, не рекомендуется останавливать применение препарата без совета врача, так как это может быть опасным для пациента.

***Если Вы приняли больше таблеток, чем Вам было рекомендовано:***

Если Вы (или кто-то другой) приняли много таблеток одновременно или думаете, что ребенок проглотил несколько таблеток, необходимо немедленно обратиться в ближайшее отделение скорой медицинской помощи или сообщить об этом своему врачу.

***Если Вы забыли принять Дапсон:***

Не принимайте двойную дозу для компенсации пропущенной. Если Вы забыли принять препарат, следует принять дозу, как только Вы вспомните, а затем принять следующую дозу в нужное время.

#### **4. Возможные побочные эффекты**

Как и все лекарства, Дапсон может вызвать побочные эффекты, особенно, когда Вы начали принимать препарат впервые, однако они возникают не у каждого пациента.

Пожалуйста, обратитесь к своему врачу или фармацевту, если Вы заметили любой из следующих побочных эффектов или любые эффекты, не перечисленные ниже.

**При следующих случаях, немедленно обратитесь к своему врачу:**

- **Синдром дапсона:** "синдром дапсона" может возникнуть через 3-6 недель лечения. Симптомы включают: кожную сыпь, лихорадку и изменения в клетках крови. Если лечение не будет остановлено или дозы не будут снижены, могут возникнуть тяжелые кожные реакции, воспаление печени, повреждение почек и психические нарушения, при таких случаях очень важно сразу же обратиться за медицинской помощью. Были зарегистрированы некоторые случаи смертельного исхода.
- **Нежелательные эффекты возникающие при лечении лепры:** если Вы лечитесь от проказы и ваше состояние не улучшается или у Вас наблюдаются поражения глаз или нервной системы, проконсультируйтесь со своим врачом.

***Обратитесь к своему врачу или фармацевту, если Вы заметили любой из следующих побочных эффектов или любые эффекты, не перечисленные ниже:***

- **Нарушения со стороны кроветворения:** анемия, вызванная разрушением эритроцитов, изменения типа и количества других клеток крови (во рту или на коже могут развиваться язвы).
- **Нарушения со стороны кожи:** кожная сыпь, которая может быть в виде рельефных высыпаний, обесцвеченность, повышенная чувствительность кожи или зуд, чувствительность к солнечному или искусственному свету саларий (такие симптомы, как покалывание, жжение или покраснение кожи). Редко поражения кожи могут сопровождаться лихорадкой, общим недомоганием, нарушением функции почек или легких.
- **Нарушения со стороны нервной системы:** головная боль, бессонница, нервные поражения, которые могут вызвать покалывание в руках или ногах и ощущение слабости.
- **Нарушения со стороны пищеварительной системы:** потеря аппетита, тошнота и рвота, воспаление печени.
- **Другие нарушения:** тахикардия, психическое расстройство, изменения лабораторных показателей функции печени, желтуха.

Если Вы заметили какие-либо побочные эффекты, сообщите об этом своему лечащему врачу или фармацевту, в том числе и о побочных эффектах, не перечисленных в этом листке-вкладыше.

Также Вы можете сообщить о побочных эффектах непосредственно в компанию ООО «Арпимед», перейдя на сайт [www.arpimed.com](http://www.arpimed.com) и заполнить соответствующую форму «Сообщить о побочном действии или неэффективности лекарства» и в Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий им. академика Э. Габриеляна, переходя на сайт:

[www.pharm.am](http://www.pharm.am) в раздел «Сообщить о побочном эффекте лекарства» и заполнить форму «Карта сообщений о побочном действии лекарства».

Телефон горячей линии: +37410237665; +37498773368.

## **5. Как хранить**

- Не принимать Дапсон по истечении срока годности, указанного на упаковке препарата. При указании срока годности имеется в виду последний день указанного месяца.
- Хранить в недоступном для детей, защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25°C.
- Срок годности - 3 года.

Не следует спускать лекарства в сточные воды или в канализацию. Спросите у фармацевта, как распорядиться с препаратом, который Вы больше не будете применять. Эти меры направлены на защиту окружающей среды.

## **6. Содержимое упаковки и дополнительная информация**

### **Что содержит Дапсон?**

- ✓ Активное вещество: дапсон – 100.0 мг;
- ✓ Другие компоненты: микрокристаллическая целлюлоза, крахмал кукурузный, магния стеарат, аэросил 200.

### **Как выглядят таблетки Дапсон и содержимое упаковки:**

Круглые, двояковыпуклые таблетки белого или почти белого цвета с маленькими вкраплениями более темного цвета, с риской на одной стороне.

### **Описание упаковки:**

5 блистеров (1 блистер, содержащий 10 таблеток) вместе с листком-вкладышем помещены в картонную упаковку.

### **Каковы условия отпуска Дапсона из аптек:**

Отпускается по рецепту.

### **Производитель**

#### **ООО "АРПИМЕД"**

Республика Армения, Котайки марз, г.Абовян, 2-ой мкр, дом 19  
Тел.: 374 (222) 21703, 21740 Факс: 374 (222) 21924

### **Владелец регистрационного удостоверения**

#### **ООО "АРПИМЕД"**

Республика Армения, Котайки марз, г.Абовян, 2-ой мкр, дом 19  
Тел.: 374 (222) 21703, 21740 Факс: 374 (222) 21924

### **Дата последнего пересмотра текста**