

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ**

Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед, таблетки жевательные со вкусом апельсина 500 мг/200 МЕ кальций/холекальциферол (витамин D<sub>3</sub>)

**Внимательно прочтите листок-вкладыш перед началом применения данного лекарственного препарата, поскольку он содержит важную для вас информацию.**

Всегда применяйте данный лекарственный препарат в соответствии с указаниями, описанными в этом листке, или в соответствии с указаниями своего лечащего врача или работника аптеки.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.

- Если вам нужна дополнительная информация или консультация, обратитесь к работнику аптеки.

- Если вы заметили какие-либо нежелательные реакции, сообщите лечащему врачу или работнику аптеки. Это также касается возможных нежелательных реакций, не перечисленных в настоящем листке-вкладыше. См. раздел 4.

**В настоящем листке-вкладыше приводится следующая информация:**

1. Что из себя представляет препарат Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед и для чего его применяют

- применяют
- 2. О чем следует знать перед применением препарата Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед

- 3. Применение препарата Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед

- 4. Возможные нежелательные реакции

- 5. Хранение препарата Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед

- 6. Содержимое упаковки и прочие сведения

- 1. Что из себя представляет препарат Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед и для чего его применяют**

Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед - это жевательные таблетки, содержащие кальций и витамин D<sub>3</sub>, которые являются важными веществами для формирования костей. Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед используется для профилактики и лечения дефицита витамина D и кальция, а также в качестве дополнения к специфической терапии остеопороза.

- 2. О чем следует знать перед применением препарата Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед**

**Не принимайте препарат Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед**

- если у вас аллергия на кальций, витамин D или какие-либо другие компоненты этого препарата (см. раздел 6)

- если у вас есть серьезные проблемы с почками

- если у вас избыточное содержание кальция в крови или моче

**В настоящем листке-вкладыше приводится следующая информация:**

1. Что из себя представляет препарат Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед и для чего его

1

- если у вас есть камни в почках
- если у вас высокое содержание витамина D в крови

**Особые указания и меры предосторожности**

Проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, прежде чем принимать Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед

- если вы находитесь на длительном лечении, особенно если вы также принимаете диуретики (для лечения повышенного артериального давления или отеков) или сердечные гликозиды (для лечения расстройств сердечной деятельности)

- если у вас есть признаки нарушения функции почек или высокая склонность к образованию камней в почках

- если у вас саркоидоз (нарушение иммунной системы, которое может повысить уровень витамина D в организме)

- если у вас остеопороз и в то же время вы не можете передвигаться

- если вы принимаете другие препараты, содержащие витамин D. Дополнительные дозы кальция и витамина D следует принимать под строгим наблюдением врача.

**Другие препараты и препарат Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, если вы принимаете, недавно

принимали или планируете принимать какие-либо другие лекарственные средства.

Кальция карбонат может влиять на всасывание антибиотиков группы тетрациклина, если принимать их одновременно. По этой причине антибиотики группы тетрациклина следует принимать как минимум за 2 часа до или через 4-6 часов после приема Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед.

Лекарственные средства, содержащие бисфосфонаты (средства для лечения остеопороза), следует принимать как минимум за час до приема Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед.

Кальций может снижать эффект левотироксина. По этой причине левотироксин следует принимать как минимум за четыре часа до или через четыре часа после приема Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед.

Эффект хинолоновых антибиотиков может быть снижен, если принимать их одновременно с кальцием. Принимайте хинолоновые антибиотики за два часа до или через шесть часов после приема Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед.

Соли кальция могут снизить всасывание железа, цинка и стронция ранелата.

2

При длительном применении (более 2 недель) сахара может оказывать негативное влияние на зубную эмаль.

**Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед практически не содержит натрия**

Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед содержит менее 1 ммоля (23 мг) натрия в каждой таблетке, то есть практически «не содержит натрия».

**3. Применение препарата Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед**

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. Проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, если у вас возникли дополнительные вопросы.

**4. Возможные нежелательные реакции**

Как и все лекарства, Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед может вызывать нежелательные реакции, хотя они возникают не у всех.

**Дозирование:**

Рекомендуемая доза для взрослых

- одна таблетка 1-3 раза в сутки.

**Применение у детей**

Рекомендуемая доза для детей

- одна таблетка 1-2 раза в сутки.

Таблетки можно разжевывать или

рассасывать.

**Если вы приняли препарат Кальций-Д<sub>3</sub>**

**Никомед больше, чем следовало**

Если вы приняли Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед больше, чем следовало, немедленно проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

**Если вы забыли принять препарат Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед**

Не принимайте двойную дозу, чтобы восполнить пропущенную дозу.

**Если у Вас возникли дополнительные вопросы по использованию данного лекарственного препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.**

**4. Возможные нежелательные реакции**

Реакции гиперчувствительности проявлялись с неизвестной частотой (невозможно оценить на основе имеющихся данных). Если вы испытываете следующие симптомы, вам следует немедленно обратиться к врачу: отек лица, языка, губ (ангионевротический отек) или отек горла (отек горлани).

**Нечастые нежелательные реакции (могут возникать менее чем у 1 человека из 100)**

Избыточное количество кальция в крови

(гиперкальциемия) или в моче (гиперкальциурия) может возникнуть при применении высоких доз

**Редкие нежелательные реакции (могут возникать менее чем у 1 человека из 1 000)**

Запор, диспепсия, метеоризм, тошнота, боли в желудке, диарея

**Очень редкие нежелательные реакции (могут возникать менее чем у 1 человека из 10 000)**

Зуд, сыпь и крапивница. Синдром пищевой гиперкальциемии (также называемый синдромом Бернетта и обычно наблюдаемый только при применении чрезмерного количества кальция), симптомы - частые позывы к мочеиспусканию, головная боль, потеря аппетита, тошнота или рвота, необычная усталость или слабость, а также повышенный уровень кальция в крови и нарушение функции почек.

**5. Хранение препарата Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед**

Храните данный препарат в недоступном для детей месте.

Не используйте Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед после истечения срока годности, указанного на этикетке. Дата истечения срока годности относится к последнему дню указанного месяца.

Храните при температуре не выше 30°C. Держите контейнер плотно закрытым в защищенном от влаги месте.

Не выбрасывайте какие-либо лекарственные препараты в канализацию или совместно

с бытовыми отходами. Уточните у работника аптеки, как избавиться от лекарственных препаратов, которые вы больше не используете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

**6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

**Препарат Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед содержит**

Активные компоненты, на одну таблетку:

Следовательно, препараты железа, цинка или стронция ранелата следует принимать как минимум за два часа до или через два часа после приема Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед.

Другие лекарственные средства, которые могут влиять на действие Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед или на эффект которых может влиять Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед: тиазидные диуретики (мочегонные средства) и сердечные гликозиды (средства для лечения сердечной недостаточности).

Орлистат (используемый для лечения ожирения) может нарушать всасывание жирорастворимых витаминов, например, витамина D<sub>3</sub>.

Если вы принимаете какие-либо из вышеперечисленных лекарственных средств, обратитесь к лечащему врачу за дополнительными рекомендациями.

**Препарат Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед с пищей или напитками**

Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед можно принимать независимо от приема пищи или напитков.

**Беременность, грудное вскармливание и fertильность**

Если вы беременны или кормите грудью, либо думаете, что беременны или планируете беременность, проконсультируйтесь с лечащим

врачом или работником аптеки перед применением данного лекарственного препарата.

Если вы беременны, вы можете использовать Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед в случае дефицита кальция и витамина D. В период беременности суточная доза не должна превышать 2500 мг кальция и 4000 МЕ витамина D, так как передозировка может нанести вред будущему ребенку.

Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед можно использовать в период кормления грудью. Кальций и витамин D<sub>3</sub> проникают в грудное молоко. Это следует учитывать при добавлении дополнительного витамина D в рацион вашего ребенка.

**Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Влияние препарата Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед на способность управлять транспортными средствами и механизмами не выявлено.

**Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед содержит изомалт и сахарозу**

Кальций-Д<sub>3</sub> Никомед содержит изомалт и сахарозу (0,385 мг). Если врач сказал вам, что у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу, прежде чем принимать этот лекарственный препарат.

3



**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта врача.

**Держатель регистрационного удостоверения:**

АО «Нижфарм», Российская Федерация 603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, 7 тел.: (831) 278-80-88 факс: (831) 430-72-28 e-mail: med@stada.ru

**Производитель:**

Такеда АС  
Драмменсвейен 852  
NO-1383 Аскер, Норвегия

**Претензии потребителей направлять по адресу:**

АО «Нижфарм