

ТРОКСЕВАЗИН 2%

Гель для наружного применения
троксерутин

СОСТАВ:

Действующее вещество в 1 г геля:

троксерутин 20 мг.

Вспомогательные вещества: карбомер, триэтаноламин, динатриевая соль ЭДТА, бензалкония хлорид, вода очищенная.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Гель для наружного применения

ДЕЙСТВИЕ

Код АТС: C05CA04. Ангиопротекторы, препараты, снижающие проницаемость капилляров, биофлавоноиды.

Основным компонентом препарата Троксевазин гель является троксерутин. Он тонизирует стенки сосудов и уменьшает их повышенную проницаемость. Оказывает противовоспалительное действие на околососудистые ткани. Таким образом устраняет отечность, улучшает питание сосудов при различных болезненных изменениях, обусловленных венозной недостаточностью.

ПОКАЗАНИЯ

Используется для облегчения отеков и связанных с хронической венозной недостаточностью симптомов (усталость, тяжесть, отечность, боли и судороги, онемение и мурашки в ногах, при боли после склеротерапии или при продолжительных путешествиях), а также для облегчения боли и отеков травматического происхождения, таких как вывихи и контузии мышц.

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДО НАЧАЛА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Сверхчувствительность (аллергия) к действующему или к какому-либо вспомогательному веществу, входящему в состав препарата.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Троксевазин гель нельзя наносить на слизистые оболочки, открытые раны и экзематозные участки кожи.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ДРУГИЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Данные относительно лекарственных взаимодействий не установлены до момента.

Троксевазин содержит бензалкония хлорид

Бензалкония хлорид – раздражающее вещество и может вызвать кожные реакции.

Применение геля Троксевазин и прием пищи, напитков и алкоголя

Нет данных о необходимости соблюдения особого режима питания или ограничивать применение определенных пищевых продуктов и напитков во время лечения этим препаратом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ГРУПП ПАЦИЕНТОВ

Применение во время беременности и кормления грудью

Нет данных о нежелательном воздействии на плод и новорожденного при использовании препарата.

Влияние на способность управления транспортными средствами и работы с техникой

Препарат не оказывает влияния на способность управления транспортными средствами и работы с техникой.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Всегда применяйте Троксевазин гель с точностью как это описано в данном листке-вкладыше. Если Вы в чем-либо не уверены, спросите у Вашего врача или фармацевта.

Применяют наружно два раза в день. Гель втирают легкими, массирующими движениями до полной резорбции препарата. При необходимости гель можно наносить под бинты или эластичные чулки.

В более тяжелых случаях рекомендуется комбинированная терапия с капсулами Троксевазина.

Если Вы пропустили применение Троксевазина, примите его, когда наступит время следующего регулярного приема, не увеличивая таким образом дозы.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Нет сведений о случаях передозировки. При случайном проглатывании большого количества необходимо провести общие меры выведения (рвотные средства) и симптоматическое лечение.

Если у Вас возникли какие-либо дополнительные вопросы, связанные с применением этого лекарства, спросите Вашего врача или фармацевта.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

Как любой лекарственный препарат Троксевазин может вызвать побочные реакции, хотя они проявляются не у всех. При применении Троксевазина геля очень редко наблюдаются реакции раздражения кожи – покраснение, зуд, кожные сыпи. Обычно они быстро проходят после прерывания лечения.

Если какая-либо побочная реакция

станет серьезной, или у Вас отмечаются побочные реакции, не описанные в данном листке-вкладыше, пожалуйста, обратитесь к Вашему врачу или фармацевту.

УПАКОВКА

По 40 г в мембранных алюминиевых или мембранных ламинатных тубах. Одна туба в картонной коробке с листком-вкладышем.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25° С.

Не замораживать!

Хранить в недоступном для детей месте!

СРОК ГОДНОСТИ

5 (пять) лет.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Балканфарма - Троян АД, Болгария

5600 Троян, ул. "Крайречна" № 1

Тел.: (+ 359) 0670 68 104

Факс: (+ 359) 0670 62 610

Дата последнего пересмотра листка-вкладыша – декабрь 2012 г.