

Листок-вкладыш – информация для пациента

Оксолин, 0,25 %, мазь назальная

Действующее вещество: диоксотетрагидрокситетрагидронафталин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Оксолин, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Оксолин
3. Применение препарата Оксолин
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Оксолин
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Оксолин, и для чего его применяют

Противовирусное средство для назального применения. Обладает противовирусной активностью в отношении вируса гриппа, блокируя места связывания вируса с поверхностью клеточной мембраны, препятствует репродукции вируса в клетках. К действию диоксотетрагидрокситетрагидронафталина чувствительны также вирусы Herpes simplex, опоясывающего герпеса, аденовирусы, вирусы инфекционных бородавок и контагиозного моллюска.

Показания к применению

Профилактика гриппа, лечение вирусных ринитов.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Оксолин

Противопоказания

Не применяйте препарат Оксолин:

- если у вас аллергия (повышенная чувствительность) на оксолин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6);

Особые указания и меры предосторожности:

Перед применением препарата Оксолин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Дети

С осторожностью применяют у детей возрасте до 2-х лет.

Другие препараты и препарат Оксолин

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Случаев взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не выявлено.

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения данного препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Возможно применение препарата при беременности и в период лактации с осторожностью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на управление транспортными средствами, работу с механизмами и выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. Применение препарата Оксолин

Всегда применяйте препарат Оксолин в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

Для профилактики гриппа - ежедневно 2-3 раза в день смазывают слизистую оболочку носа в период подъема и максимального развития эпидемической вспышки гриппа (на протяжении 25 дней) или при контакте с больным гриппом.

Лечение вирусного ринита: слизистую оболочку носа смазывают 2-3 раза в день в течение 3-4 дней.

Путь и способ введения

Назально.

Если Вы применили препарата больше, чем следовало

Случаи передозировки препарата Оксолин мазь назальная неизвестны.

При наличии вопросов по применению данного препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Следующие нежелательные реакции могут проявляться по-разному у каждого конкретного пациента и не исключают необходимость консультации с врачом.

Неизвестно (частота не может быть оценена по доступным данным):

- Жжение слизистой оболочки полости носа, ринорея.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000): возможно синее окрашивание слизистой оболочки.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях

напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата

Республика Армения

«Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий им. академика Э. Габриеляна» АОЗТ

0051, Ереван, пр. Комитаса 49/5

Телефон: (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05

e-mail: vigilance@pharm.am

www.pharm.am

5. Хранение препарата Оксолин

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после слов «Годен до». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 15°C.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Оксолин содержит:

Действующим веществом является диоксотетрагидрокситетрагидронафталин.

1 г мази содержит диоксотетрагидрокситетрагидронафталин (оксонафтилин, оксолин) – 2,5 мг.

Прочими ингредиентами являются: лимонной кислоты моногидрат, вазелин.

Внешний вид препарата и содержимое упаковки

Мазь от белого до светло-желтого цвета. При хранении допускается появление розового оттенка.

По 10 или 30 г в тубы алюминиевые или полиэтиленовые ламинатные.

Каждую тубу вместе с листком-вкладышем в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

АО «Нижфарм», Россия

ул. Салганская, д. 7, г. Нижний Новгород, 603950

Все претензии потребителей направлять представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:

АО «Нижфарм», Россия

ул. Салганская, д. 7, г. Нижний Новгород, 603950

Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28

E-mail: med@stada.ru

Листок-вкладыш пересмотрен