



ՀՀ, Երևան 0035, Միկոյան փ. 13
РА, Ереван 0035, ул. Микояна 13
13 str. Mikoyan, Yerevan 0035, RA
Հեռ./Тел./Tel.: (+37410) 67 39 03
E-mail: farm-esco@mail.ru

“ԷՍԿՈ-ՓԱՐՄ” ՍՊԸ • “ЭСКО-ФАРМ” ООО • "ESCO-PHARM" LLC

ЭСКАДЕНТ ЗУБНЫЕ КАПЛИ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВА

Название лекарства

Эскадент зубные капли

Состав

100 мл препарата содержит: масло мяты перечной - 3,1 г, камфора - 6,4 г, настойка валерианы – до 100 мл.

Международное непатентованное название

Мяты перечной листьев масло (*Menthae piperitae foliorum oleum*);

Камфора (*Camphor*);

Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка (*Valerianae officinalis rhizomatum cum radicibus tinctura*)

Лекарственная форма

Капли

Основные синонимы

Зубные капли (*Guttae dentalis*)

Фармакотерапевтическая группа

Средства для местного применения при заболеваниях полости рта.

Код АТХ: A01AD11

Фармакологическое действие

Эскадент зубные капли оказывает комплексное антисептическое, противовоспалительное, дезинфицирующее, умеренное **обезболивающее** и успокаивающее действие, обусловленное фармакологическими свойствами веществ, входящими в его состав.

Масло мяты перечной оказывает антисептическое и бактерицидное действие, ментол и другие компоненты эфирного масла оказывают **местное обезболивающее действие**; *камфора* при местном действии проявляет легкое противовоспалительное и противомикробное действие; *настойка валерианы* оказывает успокаивающее влияние на рецепторы слизистых оболочек десен, а также обладает слабым **спазмолитическим** действием.

Фармакокинетика

Ментол, который является компонентом масла мяты перечной, абсорбируется и в процессе биотрансформации образует глюкурониды, в виде которых затем выводится почками.

При наружном применении камфора быстро всасывается, гидроксилируется в печени, образуя метаболиты гидроксикамфоры, которые конъюгируют с глюкуроновой кислотой и выделяются с мочой. Камфора проходит через плацентарный барьер и выделяется с грудным молоком. Выводится почками (70%), а также через легкие (20%) и с желчью (10%).

После приема внутрь настойки валерианы максимальная концентрация валериановой кислоты (одного из активных компонентов) достигается через 1-2 ч и составляет 0,9-2,3

мг/мл. Период полуэлиминации – $1,1 \pm 0,6$ ч. При многократном применении настойки валерианы фармакокинетика входящих в ее состав компонентов не изменяется. Кумуляции валериановой кислоты при повторных применениях не отмечается. Настойка валерианы не влияет на активность основных изоформ цитохромов CYP 2D6 и 3A4, метаболизирующих лекарственные средства.

Показания к применению

Эскадент зубные капли применяют местно при болезнях зубов и десен: гингивиты, парадонтит, периодонтит; в качестве легкого местного обезболивающего при зубной боли в случае кариеса и кариеса, осложненного пульпитом; при послеоперативной стадии лечения зубов и десен.

Способы применения и режим дозирования

Для устранения зубной боли ватный тампон, смоченный 2-3 каплями препарата, закладывают в полость зуба на 5-10 минут не более 3-4 раз в день.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к веществам, которые входят в состав препарата; эпилепсия; склонность к судорожным припадкам. Не рекомендуется применять препарат у детей, беременных женщин и кормящих матерей.

Побочное действие

Масло мяты перечной (в основном его компонент - ментоловое масло) может приводить к реакциям гиперчувствительности, включая контактные дерматиты. Заглатывание ментола может приводить к абдоминальным болям, тошноте, рвоте, головокружению, атаксии, сонливости, коме. Имеются сообщения о брадикардии, сердцебиении, головной боли, эритематозной сыпи и мышечном треморе.

При наружном применении *камфоры* возможны кожные аллергические реакции, раздражение кожи. При случайном заглатывании *камфоры* могут развиваться тошнота, рвота, боли в животе, головная боль, дрожь, ощущение тепла, лихорадка, судороги, провокация приступа эпилепсии, угнетение центральной нервной системы, анурия и кома. Описаны случаи смерти от удушья, особенно у детей младшего возраста

При применении *настойки валерианы* в отдельных случаях возможны реакции повышенной чувствительности; при применении в высоких дозах - вялость, подавленность, слабость, снижение работоспособности.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применять препарат в период беременности и грудного вскармливания.

Передозировка

При передозировке могут наблюдаться атаксия, эйфория, нистагм и диплопия. Для лечения осложнений, связанных с передозировкой препарата, необходимо очистить желудок, применять активированный уголь и слабительные. Судороги и эпилептический статус могут

купироваться медленным внутривенным вливанием диазепама, или, если необходимо, короткодействующих барбитуратов, например, тиопентала натрия.

Особые указания

У пациентов с желчнокаменной болезнью и почечных больных следует применять препарат с осторожностью. Беречь от попадания в глаза. Беречь от попадания в ноздри детей, особенно младшего возраста, поскольку даже от малых количеств возможны апноэ и мгновенный коллапс.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Входящая в состав препарата *валериана* потенцирует действие снотворных, седативных средств, спазмолитиков. Препараты, содержащие *масло мяты перечной*, не рекомендуется принимать после приема пищи и антацидов. Клинически значимое взаимодействие самого препарата с другими лекарствами не описано.

Срок годности - 2 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С, недоступном для детей месте.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке!

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению как средство безрецептурного отпуска.

Упаковка

По 10 мл во флаконах-капельницах, помещенных в пачку из картона вместе с инструкцией по применению.

Производитель

ООО “Эско-Фарм”

Республика Армения, Ереван 0079, ул. Микояна 13

Тел.: (+37410) 673903