ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

ЭСКУЗАН®, КАПЛИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

Действующие вещества: Конского каштана обыкновенного семян экстракт + Тиамин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Эскузан® и для чего его принимают.
2. О чем следует знать перед применением препарата Эскузан®.
3. Применение препарата Эскузан®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Эскузан®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Эскузан® и для чего его принимают

Препарат Эскузан® содержит конского каштана обыкновенного семян экстракт сухой, тиамина гидрохлорид и представляет собой лекарственное средство растительного происхождения, повышающее способность капилляров сохранять целостность, способствующее улучшению микроциркуляции крови. Лекарственный препарат применяется для облегчения боли и симптомов «усталости» ног (ощущение тяжести и распирания в ногах, судорог), снятия отечности ног.

Показания к применению

Препарат Эскузан® применяется у взрослых (в возрасте 18 лет и старше) для лечения следующих заболеваний:

- симптомы и проявления венозно-лимфатической недостаточности (боль и «усталость» ног, ощущение тяжести и распирания в ногах, судороги нижних конечностей, отечность ног);
- варикозное расширение вен нижних конечностей.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Эскузан®

Противопоказания

Не применяйте препарат Эскузан®:

- если у Вас аллергия на компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас заболевания печени;
- во время беременности и кормления грудью;
- в возрасте до 18 лет.

Если Вы считаете, что любое из перечисленного относится к Вам, сообщите об этом Вашему лечащему врачу.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Эскузан® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Сообщите Вашему врачу, если у Вас есть или когда-либо были следующие проблемы, перед тем как Вы начнете лечение, поскольку они могут усугубиться в процессе лечения препаратом Эскузан®:

- алкоголизм;
- черепно-мозговая травма;
- заболевания головного мозга.

При длительном хранении препаратов (жидких лекарственных форм) на основе лекарственного растительного сырья возможно помутнение и выпадение осадка, что не влияет на качество препарата.

Дети и подростки:

Не давайте препарат детям и подросткам от 0 до 18 лет, поскольку безопасность и эффективность применения лекарственного препарата Эскузан® у детей и подростков в возрасте до 18 лет не установлены.

Другие препараты и препарат Эскузан®

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Обязательно сообщите врачу если вы принимаете любой из нижеперечисленных препаратов:

- фторурацил (препарат для лечения злокачественных новообразований);
- винбластин (противоопухолевое средство, алкалоид);
- блеомицин (противоопухолевый антибиотик);
- цисплатин (противоопухолевое средство, алкилирующее соединение);
- пеницилламин (комплексообразующее соединение, антагонист пиридоксина);
- изониазид (противотуберкулезное средство);
- сульфитосодержащие инфузионнные растворы.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Применение лекарственного препарата Эскузан® противопоказано во время беременности, в период грудного вскармливания и у женщин способных забеременеть, не использующих контрацепцию.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Эскузан® оказывает несущественное влияние на способность управлять транспортными средствами и на работу с механизмами в связи с незначительным содержанием этанола.

Препарат Эскузан® содержит лактозу

Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

Препарат Эскузан® содержит этанол

Препарат содержит 31 об. % этанола (алкоголя), то есть до 0,128 г этанола на дозу, что равно 4 мл пива или 2 мл вина на дозу.

3. Прием препарата Эскузан®

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Рекомендуемая доза:

12-15 капель три раза в день.

Способ применения:

При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат принимать внутрь перед едой в течение дня, перед употреблением развести в небольшом количестве воды (примерно 1/3 стакана).

Перед применением необходимо взбалтывать препарат во флаконе.

Продолжительность применения

Длительность лечения определяется лечащим врачом, но должна составлять не менее 4 недель. Возможно длительное применение лекарственного препарата.

Если Вы приняли препарат Эскузан® больше, чем следовало

При передозировке возможно появление ощущения тяжести в эпигастральной области. В этом случае следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Если Вы забыли принять препарат Эскузан®

Пропустите прием этой дозы препарата. Примите следующую дозу в надлежащее время. Не принимайте двойную дозу препарата для восполнения пропущенной.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Наиболее серьезные нежелательные реакции, о которых сообщалось при применении препарата Эскузан®.

Неизвестно – исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно.

При индивидуальной непереносимости компонентов препарата возможны кожный зуд, покраснения, высыпания на коже и т.д. (*аллергическая реакция).*

Прекратите прием препарата Эскузан® и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения любой из вышеуказанных серьезных нежелательных реакций.

Другие нежелательные реакции, о которых сообщалось при применении препарата Эскузан®.

Неизвестно – исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно.

- головная боль;
- головокружение;
- раздражения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (тошнота, диспепсия).

Сообщения о нежелательных реакциях:

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке - вкладыше.

В также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Армения

Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий им. академика Э. Габриеляна АОЗТ в республике Армения

Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса 49/4

Тел.: (+374 60) 83-00-73, (+374 10) 23-08-96, (+374 10) 23-16-82

Эл. почта: admin@pharm.am

5. Хранение препарата Эскузан®

Храните препарат в недоступном для детей месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на флаконе и картонной пачке, после слов «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Храните препарат при температуре до 25 °С. Не замораживать.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволяют защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Эскузан® содержит:

Действующими веществами являются конского каштана обыкновенного семян экстракт + тиамин.

100 г препарата Эскузан содержат: 5,4 г Конского каштана обыкновенного семян (Aesculi hippocastani semina) экстракта сухого (5-7):1, что соответствует 0,95 – 1,05 г суммы тритерпеновых гликозидов в пересчете на эсцин, 0,5 г тиамина гидрохлорида.

Экстрагент: Этанол (Спирт этиловый) 60% об/об

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, кремния диоксид коллоидный, этанол 96%, вода очищенная.

Внешний вид препарата Эскузан® и содержимое упаковки

Капли для приема внутрь

Препарат представляет собой прозрачную или слегка мутную жидкость от желтого до красновато-коричневого цвета, с характерным запахом. В процессе хранения возможно образование осадка.

20 мл препарата во флакон темного стекла, снабженный пластмассовой пробкой-капельницей и навинчиваемой пластмассовой крышкой. По одному флакону в картонную пачку вместе с листком-вкладышем.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

ООО «Аристо Фарма»

115114, г. Москва вн.тер.муниципальный округ Замоскворечье,

ул.Летниковская д.16., этаж 5, помещ. I, ком.29, 29А, 29Б

Производитель

Германия

Фарма Вернигероде ГмбХ

Дорнбергсвег 35, 38855 Вернигероде

Листок-вкладыш пересмотрен

20/09/2023