

## **ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ**

### **Скоприл плюс, таблетки 20 мг/12,5 мг (лизиноприл/гидрохлоротиазид)**

**Перед началом приема данного препарата внимательно прочитайте полностью листок-вкладыш, так как в нем содержится важная для Вас информация.**

- Сохраните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его снова.
- Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, проконсультируйтесь с Вашим врачом, фармацевтом или медсестрой.
- Этот препарат предназначен лично Вам и не следует передавать его другим лицам. Это может нанести вред их здоровью, даже если симптомы их заболевания схожи с теми, которые наблюдаются у Вас.
- Если Вы заметили какие-либо побочные эффекты, проконсультируйтесь с Вашим врачом или фармацевтом. Это включает в себя любые возможные побочные эффекты не перечисленные в этом листке-вкладыше. См. раздел 4.

#### **Листок-вкладыш содержит:**

1. Что представляет собой Скоприл плюс и для чего применяется
2. Что необходимо знать до применения препарата Скоприл плюс
3. Как принимать Скоприл плюс
4. Возможные побочные действия
5. Как хранить Скоприл плюс
6. Содержимое упаковки и прочая информация

### **1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СКОПРИЛ ПЛЮС И ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЕТСЯ**

Название препарата - Скоприл плюс. Каждая таблетка Скоприл плюс содержит лизиноприл и гидрохлоротиазид.

Лизиноприл принадлежит к группе препаратов, известных как ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (ингибиторы АПФ). Он расширяет кровеносные сосуды и помогает сердцу качать кровь по всему телу.

Гидрохлоротиазид относится к группе препаратов, известных как диуретики (мочегонные препараты). Он увеличивает количество выделенной мочи, и, следовательно, уменьшает количество жидкости в кровеносных сосудах.

Скоприл плюс используется для лечения высокого кровяного давления. Если высокое кровяное давление остается неконтролируемым, это может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта. Скоприл плюс снижает повышенное кровяное давление, что приводит к снижению этого риска.

## **2. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ДО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА СКОПРИЛ ПЛЮС**

### **Не принимайте Скоприл плюс, если:**

- у Вас аллергия на лизиноприл или гидрохлортиазид или любые другие компоненты препарата Скоприл плюс (перечисленные в разделе 6).
- у Вас аллергия на ингибиторы АПФ или сульфаниламиды. Если Вы не уверены, относится ли это к Вам, обратитесь к врачу.
- у Вас когда-либо был внезапный отек рук, ног, лодыжек, лица, губ, языка или горла, особенно если это произошло после лечения ингибитором АПФ. Также может возникать затруднение глотания или дыхания.
- Вы принимали или в настоящее время принимаете сакубитрил/валсартан, лекарственное средство, используемое для лечения длительной (хронической) сердечной недостаточности у взрослых, поскольку увеличивается риск развития ангионевротического отека (быстрорастущая опухоль под кожей в области гортани).
- у Вас наследственный ангионевротический отек (заболевание, которое делает Вас более склонным к описанному выше отеку). Если Вы не уверены, относится ли это к Вам, обратитесь к врачу.
- у Вас серьезные проблемы с почками.
- у Вас прекратилось выделение воды (мочи).
- у Вас серьезные проблемы с печенью.
- Вы беременны более 3 месяцев. (Также лучше избегать Скоприл плюс на ранних сроках беременности – см. разделы «Беременность и кормление грудью»).
- у Вас диабет или нарушение функции почек и Вы принимаете препарат для снижения артериального давления, содержащее алискирен.

**Если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам, или если Вы не уверены, обратитесь за советом к Вашему врачу.**

### **Предостережения и меры предосторожности**

#### **Вы должны сообщить Вашему врачу, если:**

- у Вас был рак кожи или появилось непредвиденное поражение кожи во время лечения. Применение гидрохлортиазида, особенно длительный прием высоких доз, может повышать риск развития некоторых видов рака кожи и губ (немеланомный рак кожи). Если Вы принимаете Скоприл плюс, необходимо защищать кожу от воздействия солнечных и ультрафиолетовых лучей.
- у Вас сужение (стеноз) аорты (артерия выходящая из сердца), клапанов сердца (митральные клапаны) или почечной артерии.
- у Вас увеличение толщины сердечной мышцы (так называемая гипертрофическая кардиомиопатия).
- у Вас проблемы с сосудами (коллагеновое заболевание сосудов).
- у Вас низкое артериальное давление. Вы можете испытывать ошеломление или головокружение, особенно в положении стоя.
- у Вас проблемы с почками, или Вы проходите диализ почек, или у Вас была трансплантация почки.
- у Вас проблемы с печенью.
- у Вас диабет.

- Вы принимаете какие-либо из следующих лекарственных средств, используемых для лечения высокого артериального давления:

- блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) (так называемые сартаны - например, валсартан, телмисартан, ирбесартан), в частности, если у Вас есть проблемы с почками, связанные с диабетом.
- алискирен.

Ваш врач может регулярно проверять функцию почек, уровень артериального давления, содержание электролитов (например, калия) в крови, уровень креатинина в крови. См. также информацию в разделе «Не принимайте Скоприл плюс».

- у Вас есть или недавно была диарея или рвота.

- Ваш врач сказал Вам контролировать количество соли в Вашем питании.

- у Вас высокий уровень холестерина, и если Вы подвергаетесь лечению под названием «ЛПНП-аферез».

- у Вас когда-либо было заболевание, называемое системной красной волчанкой (СКВ).

- Вы принадлежите к негроидной расе, такие препараты, как Скоприл плюс, могут быть менее эффективными. У Вас также может быть более распространенный ангионевротический отек (тяжелая аллергическая реакция с отеком рук, ног, лодыжек, лица, губ, языка или горла).

- Вы принимаете один из следующих препаратов, может увеличиться риск развития ангионевротического отека (быстрорастущая опухоль под кожей в области гортани):

- темсиролимус, сиролимус, эверолимус и другие препараты, относящиеся к классу ингибиторов mTOR (используются для предотвращения отторжения трансплантата и при лечении рака).
- рацекадотрил, лекарственное средство для лечения диареи.
- вилдаглиптин, лекарственное средство, используемое для лечения диабета.

- заметите ухудшение зрения или боль в глазах. Это могут быть симптомы скопления жидкости в слое глаза, где расположены кровеносные сосуды (хориоидальный выпот), или повышение внутриглазного давления, которые могут наблюдаться в течение от нескольких часов до нескольких недель после приема препарата Скоприл плюс. Если не лечить, это может привести к необратимой потере зрения. Если у Вас ранее была аллергия на пенициллин или сульфаниламиды, у Вас более высокий риск развития этого состояния.

- у Вас были проблемы с дыханием или проблемы с легкими в прошлом (включая воспаление или жидкость в легких) после приема гидрохлоротиазида. Если у Вас развилась сильная одышка или затрудненное дыхание после применения препарата Скоприл плюс, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Вы должны проинформировать своего лечащего врача, если думаете, что беременны (или можете забеременеть). Скоприл плюс не рекомендуется на ранних сроках беременности и противопоказан, если срок беременности более 3 месяцев, так как ребенку может быть нанесен серьезный вред, если препарат применяется на этих сроках (см. разделы «Беременность и кормление грудью»).

Если Вы не уверены, относится ли что-то из вышеперечисленного к Вам, проконсультируйтесь с Вашим врачом или фармацевтом перед началом приема препарата Скоприл плюс.

### **Лечение аллергии на укусы насекомых**

Сообщите Вашему врачу, если Вы проходите ли собираетесь пройти курс лечения, чтобы уменьшить последствия аллергии, такие как укусы насекомых

(десенсибилизация). Если Вы принимаете Скоприл плюс во время лечения, это может вызвать тяжелую аллергическую реакцию.

### **Операции**

Если Вы собираетесь подвергнуться операции (включая стоматологическую операцию), сообщите Вашему врачу или стоматологу, что Вы принимаете Скоприл плюс. Это потому, что Ваше артериальное давление может снизиться (гипотония), если Вам назначают определенные местные или общие анестетики, в то время как Вы принимаете Скоприл плюс.

### **Дети и подростки**

Скоприл плюс не предназначен для применения у детей.

### **Прием других лекарственных средств**

Сообщите лечащему врачу или фармацевту о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты, в том числе лекарственные препараты, отпускаемые без рецепта и препараты растительного происхождения, поскольку Скоприл плюс может влиять на действие некоторых других препаратов и некоторые препараты могут повлиять на действие препарата Скоприл плюс. Ваш врач может изменить дозу и/или предпринять другие меры предосторожности.

В частности, сообщите своему врачу или фармацевту, если Вы принимаете какие-либо из следующих препаратов:

- Другие лекарственные средства для снижения артериального давления (антигипертензивные средства).
- Блокатор рецепторов ангиотензина II (БРА) или алискирен (см. также информацию в разделах «Не принимайте Скоприл плюс» и «Предостережения и меры предосторожности»).
- Препараты, связанные с низким содержанием калия в крови (гипокалиемия), такие как другие диуретики («мочегонные препараты», в том числе сохраняющие калий, слабительные, кортикостероиды (например, преднизолон), АКТГ (гормон А), амфотерицин (противогрибковый препарат) и производные салициловой кислоты.
- Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как аспирин, ибупрофен или индометацин, используемые для лечения мышечной боли или артрита.
- Препараты для лечения депрессии (трициклические и тетрациклические антидепрессанты).
- Препараты для лечения психических расстройств, такие как литий.
- Аспирин (ацетилсалициловая кислота), если Вы принимаете более 3 граммов в день.
- Добавки калия (в том числе заменители соли), калийсберегающие диуретики и другие препараты, повышающие уровень калия в крови (например, триметоприм и ко-тримоксазол, используемые для лечения бактериальных инфекций; циклоспорин, иммунодепрессант, используемый для предотвращения отторжения трансплантата органов; и гепарин, препарат для разжижения крови, препятствующий образованию тромбов).
- Соли кальция или добавки с витамином D.
- Препараты для лечения диабета (инсулин и пероральные противодиабетические средства, такие как производные сульфонилмочевины). При приеме тиазидных диуретиков может потребоваться изменение дозы противодиабетического препарата.
- Препараты для лечения астмы.
- Препараты для лечения заложенности носа или придаточных пазух носа или другие средства от простуды (включая те, которые можно купить в аптеке).

- Препараты, подавляющие иммунную систему (иммунодепрессанты, такие как циклоспорин).
- Аллопуринол (препарат для лечения подагры).
- Препараты, применяемые при нарушениях сердечного ритма (например, прокаинамид).
- Кардиологические препараты (например, дигоксин) или другие препараты для контроля сердечного ритма.
- Препараты, содержащие золото (инъекции) (например, натрия ауротиомалат), обычно используемые для лечения ревматоидного артрита.
- Амфотерицин В (инъекции) (для лечения грибковых инфекций).
- Карбенексолон (для лечения язв или воспалений в пищеводе или во рту и вокруг него).
- Кортикостероиды (стероидные препараты).
- Кортикотропин (гормон).
- Препараты для лечения запоров (стимулирующие слабительные средства).
- Колестирамин и колестипол (для снижения уровня холестерина, для предотвращения диареи или уменьшения зуда).
- Миорелаксанты, такие как тубокурарин.
- Триметоприм (антибиотик).
- Соталол (бета-адреноблокатор).
- Ловастатин (для снижения уровня холестерина).
- Сульфат декстрана (используется в лечении под названием «аферез ЛПНП» для снижения уровня холестерина).

Следующие препараты могут увеличить риск ангионевротического отека (признаки ангионевротического отека включают отек лица, губ, языка и/или горла с затруднением глотания или дыхания):

- Препараты для расщепления тромбов (тканевый активатор плазминогена), обычно назначаемые в больнице.
- Препараты, которые чаще всего применяются для предотвращения отторжения пересаженных органов (темсиrolimus, сиролимус, эверолимус и другие лекарственные препараты, принадлежащие к классу mTOR ингибиторов). См. раздел 2 «Предупреждения и меры предосторожности».
- Рацекадотрил используется для лечения диареи.
- Вилдаглиптин, препарат, используемый для лечения диабета.
- Другие препараты, которые, как известно, влияют на сердце, называемые Torsades de pointes.

Низкое артериальное давление может усугубляться алкоголем, барбитуратами или анестетиками. Вы можете испытывать головокружение при вставании.

### **Применение препарата Скоприл плюс с пищей и напитками**

Вы можете пить алкоголь во время приема этого препарата, однако, одновременный прием лекарственных средств для снижения кровяного давления и алкоголя может вызвать головокружение или ошеломление. Если Вы обеспокоены тем, сколько алкоголя можно употреблять во время приема препарата Скоприл плюс, обсудите это с Вашим врачом.

### **Беременность и кормление грудью**

#### **Беременность**

Вы должны сообщить Вашему врачу, если Вы думаете, что Вы беременны (или можете быть беременной). Ваш врач посоветует Вам прекратить прием препарата Скоприл плюс, прежде, чем Вы забеременеете или как только Вы узнаете, что Вы беременны и предложит Вам принимать другое лекарственное средство вместо препарата Скоприл плюс. Скоприл плюс не рекомендуется на ранних сроках беременности и нельзя применять, если Вы беременны более 3 месяцев, так как прием препарата на этой стадии может причинить серьезный вред ребенку.

#### **Кормление грудью**

Сообщите Вашему врачу, если Вы кормите ребенка грудью или собираетесь кормить грудью. Скоприл плюс не рекомендуется назначать кормящим матерям, и врач может выбрать для Вас другое лечение, если Вы хотите кормить грудью, особенно если у Вас новорожденный ребенок или преждевременно рожденный ребенок.

#### **Вождение автотранспорта и управление механизмами**

- Препарат может вызывать головокружение или усталость, что может повлиять на Вашу способность водить автотранспорт или управлять механизмами, особенно в начале лечения или при изменении дозы, или при одновременном применении с алкоголем. В этом случае не садитесь за руль и не используйте какие-либо инструменты или механизмы.
- Воздержитесь от совершения этих действий, пока Вы не узнаете, как этот препарат влияет на Вас.

### **3. КАК ПРИНИМАТЬ СКОПРИЛ ПЛЮС**

Принимайте Скоприл плюс согласно предписаниям Вашего врача. Если Вы в чем-то не уверены, посоветуйтесь с Вашим фармацевтом.

Ваш лечащий врач может назначить Вам анализы крови после начала приема препарата Скоприл плюс. Затем он может откорректировать Вашу дозу, чтобы Вы приняли нужное количество препарата.

#### **Применение препарата**

- Проглатывайте таблетку запивая стаканом воды.
- Постарайтесь принимать таблетки в одно и то же время каждый день. Не имеет значения, принимаете ли Вы Скоприл плюс до или после еды.
- Продолжайте прием препарата Скоприл плюс до тех пор, пока Ваш врач не разрешит прекратить его прием, лечение длительное. Важно принимать Скоприл плюс каждый день.

#### **Прием первой дозы**

- Будьте особенно внимательны после приема первой дозы препарата Скоприл плюс или при увеличении дозы. Это может привести к резкому падению артериального давления, чем последующих дозах.
- Прием первой дозы может вызвать у Вас головокружение. Если это наблюдается, следует прилечь. Если Вас это беспокоит, пожалуйста, как можно скорее обратитесь к врачу.

#### **Взрослые**

- Рекомендованная доза составляет одну таблетку один раз в день. Ваш врач назначит Вам таблетку, которая подходит Вам.

• При необходимости Ваш врач может увеличить дозу до двух таблеток один раз в день.

#### **Применение у детей**

• Не рекомендуется применять Скоприл плюс у детей.

#### **Если Вы приняли больше препарата Скоприл плюс, чем необходимо**

Если Вы приняли Скоприл плюс больше, чем предписано Вашим врачом, немедленно обратитесь к врачу или в ближайшую больницу. Возьмите с собой упаковку, чтобы показать врачу, какой препарат Вы приняли.

#### **Если Вы забыли принять Скоприл плюс**

- Если Вы забыли принять дозу, примите ее, как только вспомните. Однако, если уже почти пришло время для следующей дозы, не принимайте пропущенную дозу.
- Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

#### **Если Вы прекратили прием препарата Скоприл плюс**

Не прекращайте прием таблеток, не проконсультировавшись с врачом, даже если Вы чувствуете себя хорошо.

**Если у Вас возникли дополнительные вопросы относительно применения данного препарата, обратитесь к Вашему врачу или фармацевту.**

## **4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызвать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Скоприл плюс содержит два препарата: лизиноприл и гидрохлоротиазид. Следующие нежелательные реакции были зарегистрированы с этими отдельными препаратами.

Ваш лечащий врач может назначить Вам анализы крови, чтобы проверить, не повлиял ли Скоприл плюс на Вашу кровь.

#### **Возможные нежелательные реакции лизиноприла**

Тяжелые аллергические реакции (редко, могут возникать не более чем у 1 человека из 1000)

При проявлении тяжелой аллергической реакции, **прекратите прием препарата Скоприл плюс и немедленно обратитесь к врачу**. Признаки могут включать внезапное начало:

- Отек лица, губ, языка или горла, которые могут вызвать затруднение глотания.
- Сильный или внезапный отек рук, ног или лодыжек.
- Затрудненное дыхание.
- Сильный зуд кожи (с пузырями).

**Тяжелые проблемы с печенью** (очень редко, могут возникать не более чем у 1 человека из 10,000)

Признаки могут включать:

- Пожелтение кожи или глаз, темная моча или потеря аппетита.

Если это произойдет, **немедленно обратитесь к врачу**.

Другие возможные нежелательные реакции:

**Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10)**

- Головная боль.
- головокружение и ошеломяение, особенно при быстром вставании.
- Обморок.
- Диарея.
- Рвота.
- Кашель.
- Проблемы с почками (подтверждено проведенным анализом крови).

**Не очень часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100)**

- Изменения настроения, включая чувство депрессии.
- Ощущение покалывания, такое как «мурашки по коже».
- Головокружение (вертиго).
- Изменение вкусовых ощущений.
- Проблемы со сном.
- Чрезмерное снижение артериального давления может наблюдаться у людей со следующими заболеваниями: ишемическая болезнь сердца; сужение аорты (стеноз аорты) или почечной артерии или сужение клапанов сердца; увеличение толщины сердечной мышцы. Если это произойдет, Вы можете почувствовать головокружение или ошеломяение, особенно при быстром вставании.
- Сердечный приступ или инсульт.
- Необычное сердцебиение.
- Изменение цвета пальцев рук или ног.
- Насморк.
- Тошнота.
- Боль в животе и расстройство пищеварения.
- Изменения в анализах крови, которые показывают, насколько хорошо работает печень.
- Сыпь.
- Зуд.
- Невозможность достичь эрекции (импотенция).
- Слабость.
- Усталость.
- Повышение уровня некоторых веществ в крови (мочевины, креатинина или калия).

**Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000)**

- Изменения в некоторых клетках или других частях Вашей крови. Признаки могут включать чувство усталости и бледность кожи.
- Спутанность сознания.
- Нарушение обоняния.
- Сухость во рту.
- Кожная сыпь с темно-красными, приподнятыми, зудящими волдырями (крапивница).
- Выпадение волос (алопеция).
- Псориаз (проблема с кожей).
- Инфекция крови.
- Почечная недостаточность.
- Увеличение груди у мужчин.
- Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (SIADH).

- Низкий уровень натрия в крови, который может вызывать слабость, утомляемость, головную боль, тошноту, рвоту и судороги.

**Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10,000 человек)**

- Проблемы с костным мозгом или уменьшение количества кровяных клеток и/или тромбоцитов в крови. Вы можете заметить усталость, инфекцию (которая может быть серьезной), лихорадку, одышку или более легкое появление синяков или кровотечений.
- Увеличение желез (лимфатических узлов).
- Повышенный иммунный ответ (аутоиммунное заболевание).
- Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия). Признаки могут включать чувство голода или слабости, потливость и учащенное сердцебиение.
- Внезапное ощущение свистящего дыхания или одышки (бронхоспазм).
- Воспаление легких (которое может вызвать у Вас одышку).
- Острый респираторный дистресс (признаки включают сильную одышку, лихорадку, слабость и спутанность сознания).
- Синусит (ощущение боли и заложенности за щеками и глазами).
- Эозинофильная пневмония. Знаки включают в себя сочетание следующих признаков:
  - синусит
  - ощущение, что у Вас грипп
  - ощущение все большей и большей одышки
  - боль в области желудка или кишечника
  - кожная сыпь
  - ощущение «мурашек по коже» или онемения рук или ног.
- Воспаление поджелудочной железы. Это вызывает умеренную или сильную боль в желудке.
- Отек слизистой оболочки кишечника. Это может вызвать внезапную боль в животе, диарею или вызвать рвоту.
- Потливость.
- Тяжелое кожное заболевание или сыпь. Симптомы включают покраснение, образование волдырей и шелушение кожи, которые могут развиваться быстро и могут включать волдыри во рту и носу.
- Выделение меньшего количества воды (мочи), чем обычно, или отсутствие выделения воды.

**Неизвестно (частота не может быть оценена по имеющимся данным)**

- Видеть, чувствовать или слышать вещи, которых в действительности нет (галлюцинации).
- Покраснение кожи.

**Возможные нежелательные реакции гидрохлортиазида (частота неизвестна)**

- Рак кожи и губ (немеланомный рак кожи).
- Воспаление слюнной железы.
- Снижение количества клеток крови и/или тромбоцитов в крови. Вы можете заметить усталость, инфекцию (которая может быть серьезной), лихорадку, одышку или более легкое появление синяков или кровотечений.
- Потеря аппетита.
- Увеличение количества сахара (глюкозы) в крови (гипергликемия).
- Сахар в моче.
- Увеличение количества мочевой кислоты в крови.

- Измененный уровень веществ в крови (например, низкий уровень натрия и калия). Вы можете заметить мышечную слабость, жажду, «мурашки по коже», судороги или тошноту.
- Повышенный или высокий уровень жиров в крови (включая холестерин).
- Чувство беспокойства.
- Депрессия.
- Проблемы со сном.
- Ощущение покалывания, такое как «мурашки по коже».
- Чувство легкого головокружения.
- Изменения в Вашем зрении, которые могут сделать вещи желтыми.
- Проблемы со зрением на короткое время.
- Сильная боль в глазах с покраснением и внезапным помутнением зрения. Если у Вас внезапно появился болезненный красный глаз, немедленно сообщите об этом своему врачу; Вам может потребоваться лечение, чтобы избежать постоянной потери зрения.
- Головокружение (вертиго).
- Слабость (особенно при вставании).
- Повреждение кровеносных сосудов, вызывающее появление красных или багровых пятен на коже.
- Затрудненное дыхание. Вы можете чувствовать одышку, если Ваши легкие воспалены или в них есть жидкость.
- Раздражение желудка.
- Диарея.
- Запор.

- Воспаление поджелудочной железы. Это вызывает умеренную или сильную боль в желудке.
- Пожелтение кожи или белков глаз (желтуха).
- Проблемы с кожей, в том числе сыпь, вызванная чувствительностью к солнечному свету, сыпь, сильная сыпь, которая быстро развивается с образованием волдырей или шелушением кожи и, возможно, образованием волдырей во рту, активацией или ухудшением существующей волчанки или появлением необычных кожных реакций.
- Аллергические реакции.
- Мышечные судороги и мышечная слабость.
- Проблемы с почками, которые могут быть серьезными (подтверждено проведенным анализом крови).
- Лихорадка.
- Слабость.
- Снижение зрения или боль в глазах из-за высокого давления (возможные признаки скопления жидкости в сосудистой оболочке глаза (хориоидальный выпот) или острая закрытоугольная глаукома).

Не беспокойтесь об этом списке возможных нежелательных реакций. Вы можете не получить ни одной из них.

Если какой-либо из побочных эффектов становится серьезным, или если Вы заметили какие-либо побочные эффекты, не перечисленные в данном листке-вкладыше, пожалуйста, сообщите об этом Вашему врачу или фармацевту.

Если Вы обратите внимание на то, что Вы испытали, когда это началось и как долго это длилось, то может помочь Вам.

## **5. КАК ХРАНИТЬ СКОПРИЛ ПЛЮС**

Лекарственное средство не требует каких-либо специальных условий хранения.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Дата истечения срока годности относится к последнему дню данного месяца.

Не используйте препарат, если Вы заметили, что упаковка повреждена.

Лекарственные средства нельзя выбрасывать в сточные воды и мусор.

Проконсультируйтесь с Вашим фармацевтом как устранили лекарственные средства, которые Вам не нужны. Данные меры помогут в защите окружающей среды.

## **6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

### **Что содержит Скоприл плюс**

- Действующие вещества: лизиноприл и гидрохлоротиазид.

Каждая таблетка содержит лизиноприла 20 мг (в виде лизиноприла дигидрата 21,78 мг) и гидрохлоротиазида 12,5 мг.

- Вспомогательные вещества: маннит, кальция гидрофосфат безводный, крахмал кукурузный, крахмал прежелатинизированный, повидон, магния стеарат и железа оксид коричневый 75 E 172 (содержит железа оксид черный и железа оксид красный).

### **Описание препарата Скоприл плюс и содержимое упаковки**

Скоприл плюс, таблетки 20 мг/12,5 мг: круглые, двояковыпуклые таблетки кремовато-фиолетового цвета с риской на одной стороне. Риски не предназначена для разлома таблетки.

По 10 таблеток в блистер из алюминиевой фольги и пленки ПВХ.

По 20 таблеток (2 блистера) или 30 таблеток (3 блистера) помещают в пачку картонную вместе с инструкцией по применению.

#### **Условия отпуска**

Отпускают по рецепту.

#### **Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

АЛКАЛОИД АД Скопье

Бульвар Александар Македонски 12,

1000 Скопье, Республика Северная Македония

Тел. + 389 2 31 04 000

Факс: + 389 2 31 04 021