

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Спирт медицинский 96% концентрат для приготовления раствора для наружного применения Этанол

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения!

- Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.
- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.
- Препарат назначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

- 1. Что из себя представляет препарат Спирт медицинский 96% и для чего его применяют**
- 2. О чем следует знать перед применением препарата Спирт медицинский 96%**
- 3. Применение препарата Спирт медицинский 96%**
- 4. Возможные нежелательные реакции**
- 5. Хранение препарата Спирт медицинский 96%**
- 6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

1. Что из себя представляет препарат Спирт медицинский 96% и для чего его применяют

Спирт медицинский 96% содержит активное вещество этанол, который проявляет противомикробную активность, при местном применении оказывает антисептическое действие (денатурирует белки микроорганизмов).

- Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов.
- Антисептическая активность повышается с увеличением концентрации этанола.
- Для обеззараживания кожи используют 70% раствор, проникающий в более глубокие слои эпидермиса лучше, чем 95%, обладающий дубящим действием на кожу и слизистые оболочки.
- При системном применении обладает способностью вызывать анальгезию и общую анестезию. Наиболее чувствительны к этанолу клетки центральной нервной системы, особенно клетки коры головного мозга, воздействуя на которые, этанол вызывает характерное алкогольное возбуждение в коре, угнетение спинного и продолговатого мозга с подавлением деятельности дыхательного центра.
- Является растворителем для ряда лекарственных средств, а также экстрагентом для ряда веществ, содержащихся в лекарственном растительном сырье.

При наружном применении всасывается с поверхности кожи и слизистых оболочек в системный кровоток. В метаболизме препарата участвует изофермент CYP2E1, индуктором которого он является.

Рекомендации по применению

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Спирт медицинский 96% применяется:

- в качестве антисептического, дезинфицирующего средства.
- для обработки рук хирурга (способы Фюрбрингера, Альфреда).
- для обработки операционного поля (в т. ч. у лиц с повышенной чувствительностью к другим антисептикам, у детей и при операциях на областях с тонкой кожей у взрослых – шея, лицо).
- для лечения начальных стадий заболеваний: фурункулов, панарициев, мастит.

2. О чем следует знать перед применением препарата Спирт медицинский 96%

2.1. Противопоказания

- Не применять Спирт медицинский 96%, если у Вас повышенная чувствительность к этанолу.
- С осторожностью: беременность, период лактации, детский возраст.

2.2. Особые указания и меры предосторожности при использовании

Этанол при наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки, что нужно учитывать при использовании у детей, беременных женщин и в период кормления грудью.

Не применять вблизи открытого огня.

2.3. Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном применении с препаратами для наружного применения, которые содержат органические соединения, может вызвать денатурацию белковых компонентов.

2.4. Применение при беременности и в период кормления грудью

При беременности и в период кормления грудью применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

2.5. Влияние на способность управлять движущимися механизмами и машинами

Лекарственный препарат, применяемый как раствор для наружного применения, не влияет на способность управлять автомобилем и другими потенциально опасными механизмами.

При длительном применении в больших дозах возможно всасывание в системный кровоток, что может вызвать снижение психомоторных реакций, что следует учитывать при управлении транспортными средствами и занятиями потенциально опасными видами деятельности.

2.6. Передозировка

При превышении рекомендуемых доз возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. Лечение симптоматическое.

3. Применение препарата Спирт медицинский 96%

3.1. Способ применения и дозы

96% раствор должен быть разведен до необходимых концентраций и использован по показаниям.

4. Возможные нежелательные реакции

4.1. Описание нежелательных реакций

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

В месте наложения компресса могут возникать нежелательные реакции: аллергические реакции, ожоги кожи, гиперемия и болезненность кожи.

При наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки и может оказывать резорбтивное общетоксическое действие (угнетение центральной нервной системы).

4.2. Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий им. академика Э. Габриеляна, перейдя на сайт www.pharm.am в раздел “Сообщить о побочном эффекте лекарства” и заполнить форму “Карта сообщений о побочном действии лекарства”.

Республика Армения

ООО «Натали Фарм»,

Республика Армения, Ереван,

Шенгавит, пр. Аршакуняц 127/12

Тел.: +37477840086

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата Спирт медицинский 96%

5.1. Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

5.2. Дата истечения срока годности

Срок годности – 1 год.

Не принимать Спирт медицинский 96% по истечении срока годности, указанного на упаковке препарата. При указании срока годности имеется в виду последний день указанного месяца.

Срок хранения после вскрытия – 6 месяцев.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

6.1. Что содержит Спирт медицинский 96%

Действующее вещество: Этанол 96%

6.2. Как выглядит Спирт медицинский 96% и содержимое упаковки

Прозрачная бесцветная подвижная жидкость с характерным запахом спирта.

6.3. Описание упаковки

По 100мл, 250мл, 500мл и 1000мл ПЭТ бутылки.

6.4. Условия отпуска

Без рецепта.

6.5. Владелец Регистрационного Удостоверения

ООО «НАТАЛИ ФАРМ»

Адрес: РА, г. Ереван, ул. Абовяна, 42-2

Производитель

ООО «Натали Фарм»,

Республика Армения, Ереван,

Шенгавит, пр. Аршакуняц 127/12

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий, следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:

ООО «Натали Фарм»,

Республика Армения, Ереван,

Шенгавит, пр. Аршакуняц 127/12

6.6. Дата последнего пересмотра текста