

Листок-вкладыш – информация для пациента

Цевикап, 100 мг/мл, капли для приема внутрь

Действующее вещество: аскорбиновая кислота

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Цевикап, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Цевикап.
3. Прием препарата Цевикап.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Цевикап.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Цевикап, и для чего его применяют

Препарат Цевикап – это капли для приема внутрь, содержащие действующее вещество аскорбиновую кислоту (витамин С). Такая лекарственная форма особенно рекомендуется к применению у грудных детей и детей, поскольку позволяет ввести соответствующее количество витамина С.

Витамин С является водорастворимым витамином. Легко подвергается распаду под воздействием многих внешних факторов, например, света, высокой температуры и кислорода, содержащегося в воздухе. Витамин С участвует в процессе синтеза многих тканей организма (в т.ч. хрящей, костей, зубов), а также влияет на процессы заживления ран и сращения костей и регулирует иммунологические реакции.

Показания к применению

Препарат Цевикап применяют с профилактической целью и в лечении дефицита витамина С, в тех случаях, когда применение соответствующей диеты является недостаточным.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Цевикап

Противопоказания

Не принимайте препарат Цевикап:

- если у Вас аллергия на аскорбиновую кислоту или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас диагностировано оксалатные камни в почках (оксалатная мочекаменная

болезнь);

- если у Вас диагностировано повышение уровня железа в организме в результате, например, избыточного накопления железа (гемохроматоз), сидеробластической анемии, серповидноклеточной анемии, количественного нарушения синтеза гемоглобина (талассемия) и отравления продуктами, содержащими железо.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Цевикап проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Сообщите Вашему врачу или медицинской сестре о том, что Вы принимаете препарат Цевикап, если Вам назначены лабораторные исследования. Прием витамина С в высоких дозах может искажать результаты некоторых анализов, например, определения уровня глюкозы или креатинина в крови и моче.

Другие препараты и препарат Цевикап

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Проконсультируйтесь с врачом в случае применения препарата Цевикап одновременно с:

- продуктами, содержащими железо. Витамин С значительно повышает всасывание ионов железа в желудочно-кишечном тракте, особенно у пациентов со сниженным содержанием железа в организме;
- дефероксамином (препарат, применяемый при отравлении железом). У пациентов с повышенным содержанием железа в организме, принимающих дефероксамин в сочетании с витамином С, в начальной фазе лечения может наступить повышенная токсичность железа;
- ацетилсалициловой кислотой. Высокие дозы ацетилсалициловой кислоты снижают всасывание витамина С;
- витамином В₁₂ (цианокобаламин). Одновременное применение может стать причиной снижения эффективности цианокобаламина;
- витамином Е. Витамин С усиливает антиоксидантные свойства витамина Е;
- парацетамолом. Аскорбиновая кислота удлиняет период полувыведения парацетамола;
- трициклическими антидепрессантами, производными фенотиазина (препараты, применяемые в лечении психических расстройств) и аминогликозидными антибиотиками (например, стрептомицин). Аскорбиновая кислота в дозах свыше 1 г в день может уменьшать эффективность действия указанных препаратов;
- антацидами (препаратами, снижающими кислотность желудка) на основе алюминия. Совместное применение с антацидами может повысить количество алюминия, выводимого с мочой. Это в особенности важно учитывать у пациентов с недостаточностью функции почек. Одновременное применение антацидов и аскорбиновой кислоты не рекомендовано.

Препарат Цевикап с пищей и напитками

Препарат Цевикап можно применять с пищей и напитками. При применении детьми рекомендуется растворить соответствующую дозу препарата Цевикап в воде, чае или соке или добавить препарат в пищу.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Рекомендуемая суточная доза витамина С для беременных (учитывая принятое с пищей количество витамина С) составляет 80 мг (что отвечает 16 каплям препарата Цевикап).

Грудное вскармливание

Рекомендуемая суточная доза витамина С для женщин, кормящих грудным молоком (включая принятое с пищей количество витамина С) составляет 100 мг (что отвечает 20 каплям препарата Цевикап). Витамин С выделяется с грудным молоком кормящих матерей. Применение очень высоких доз женщинами в период грудного вскармливания увеличивает риск передозировки витамином С у ребенка.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Цевикап не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и работы с механизмами.

3. Прием препарата Цевикап

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза (если врач не назначит иначе):

- грудным детям и детям до 2 лет: по 5-8 капель в сутки, добавляют к напиткам или пище;
- детям от 2 до 11 лет: по 10 капель в сутки;
- подросткам от 12 до 17 лет: по 15-20 капель в сутки.

Применение у детей

Детям в возрасте до 3 лет препарат следует давать только после консультации с врачом.

Путь и (или) способ введения

Препарат применяют внутрь, однократно или в несколько приемов, лучше всего во время приема пищи.

При применении детьми рекомендуется растворить соответствующую дозу препарата Цевикап в воде, чае или соке или добавить препарат в пищу. Лекарственный препарат не следует давать непосредственно из флакона в ротовую полость ребенка.

Если Вы приняли препарата Цевикап больше, чем следовало

Применение большей дозы, чем рекомендуемая доза препарата Цевикап практически не связано с риском появления нежелательных реакций.

Высокие дозы витамина С быстро выводятся с мочой в неизмененном виде.

Если Вы забыли принять препарат Цевикап

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. Примите следующую дозу препарата в обычное время.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Препарат, применяемый в рекомендуемых дозах, обычно хорошо переносится организмом. Нежелательные реакции касаются случаев применения высоких доз витамина С (свыше 1 г (200 капель) в сутки).

Прием высоких доз витамина С у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (редкое генетическое заболевание) может привести к разрушению эритроцитов (красные кровяные тельца).

В случае применения внутрь суточных доз витамина С по 1 г или больше, могут наступить расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, например, диарея. Аскорбиновая кислота в высоких дозах может быть причиной избыточного выведения оксалатной кислоты с мочой, кристаллизации уратов и цитратов, что повышает риск образования камней в мочевыводящих путях.

Длительное применение аскорбиновой кислоты в высоких дозах может стать причиной развития толерантности, что после прекращения приема может привести к дефициту витамина С в организме.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства – члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Армения

«Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий» ГНКО

Адрес: 0051, Ереван, пр. Комитаса 49/5

Телефон «горячей линии»: (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05

Электронная почта: vigilance@pharm.am

Сайт: <http://www.pharm.am>

Кыргызская Республика

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ КР

Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-линия, 25

Телефон: +996 (312) 21-92-88

Телефон «Горячей линии»: 008 800 26 26

Тел. факс: +996 (312) 21-05-08

Электронная почта: dlsmi@pharm.kg

Сайт: <http://www.pharm.kg/>

5. Хранение препарата Цевикап

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть

его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света, при температуре не выше 25 °С.

Вскрытый флакон необходимо использовать в течение 6 месяцев.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Цевикап содержит

Действующим веществом является аскорбиновая кислота.

Каждый миллилитр содержит 100 мг аскорбиновой кислоты. Каждая капля содержит 5 мг аскорбиновой кислоты.

Прочими ингредиентами являются: глицерин безводный, вода очищенная.

Внешний вид препарата Цевикап и содержимое упаковки

Капли для приема внутрь.

Прозрачная, светло-желтая или желтая жидкость с кисло-сладким вкусом.

По 10 мл или 30 мл во флаконах темного стекла с капельницей внутри и закручивающейся крышкой с гарантийным кольцом.

1 флакон с листком-вкладышем в картонной коробке.

Держатель регистрационного удостоверения

Польша

Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО

ул. Пельплиньска 19, 83-200 Старогард Гданьски

Телефон: +48 58 5631600

Факс: +48 58 5622353

Адрес электронной почты: phv@polpharma.com

Производитель

Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО

Отдел Медана в Серадзе

ул. Владислава Локетка 10, 98-200 Серадз, Польша

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Республика Армения

Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО

ул. Пельплиньска 19, 83-200 Старогард Гданьски, Польша

Номер телефона: +995 593 212607

Адрес электронной почты: maka.ketishvili@medpol.ge

Кыргызская Республика
Представительство АО «Химфарм» в Кыргызской Республике
г. Бишкек, ул. Орозбекова 52-54, 3 этаж
Номер телефона: +996312975635
Адрес электронной почты: pvh-kg@santo.kz

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза
<http://ees.eaeunion.org/>.