

Листок вкладыш
Информация для пациентов

Билобил® капсулы 40 мг
Сухой экстракт Гинкго очищенный и стандартизированный

Торговое название
Билобил® (Bilobil®)

Общая характеристика

Описание

Капсулы фиолетово-коричневого цвета. В капсулах содержится порошок от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с видимыми частицами более темного цвета и возможными маленькими комочками.

Состав

Каждая капсула содержит 40 мг экстракта (сухого, очищенного и количественно стандартизированного) из *Ginkgo biloba* L., листьев (листья Гинкго) (35 – 67 : 1), стандартизированного до содержания:

- 8,8 – 10,8 мг флавоноидов, в виде флавоновых гликозидов;
- 1,12 – 1,36 мг гинкголидов А, В, С;
- 1,04 – 1,28 мг билобалида.

Растворитель для экстракции: ацетон 60 % (м/м).

Вспомогательный (технологический) компонент: глюкоза, жидкая, высушенная распылением.

Вспомогательные вещества: лактоза моногидрат, кукурузный крахмал, тальк, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат.

Оболочка капсулы: титана диоксид (E171), индигодин (индигокармин) (E132), азорубин (кармуазин) (E122), железа оксид красный (E172), железа оксид черный (E172), желатин.

Форма выпуска

Капсулы

Код классификации лекарственного средства

Психоаналептики. Препараты для лечения деменции. Код АТХ N06DX02.

Фармакологические свойства

Стандартизированный сухой экстракт листьев гинкго, содержащийся в капсулах Билобил, относится к группе растительных лекарственных средств, применяющихся для лечения деменции.

Деменция является хроническим прогрессирующим заболеванием головного мозга с наиболее выраженным симптомом потери памяти.

Билобил капсулы улучшают кровообращение и метаболизм головного мозга и предотвращают снижение умственной работоспособности при легкой или умеренной деменции всех типов.

При нарушении кровоснабжения конечностей капсулы Билобил уменьшают чувство холода, покалывание, онемение, боль при ходьбе.

Показания для применения

Билобил капсулы являются растительным лекарственным средством и рекомендованы для симптоматического лечения:

- при нарушениях мозгового кровообращения и функции головного мозга (синдром деменции при первичной дегенеративной деменции, сосудистой деменции или смешанной форме), проявляющихся снижением памяти и умственной работоспособности, головокружением, звоном в ушах, апатией, головной болью, нарушением сна, общим недомоганием;
- при начальной стадии нарушения кровообращения конечностей, проявляющейся чувством холода, покалыванием, онемением, болью при ходьбе.

Способ применения и дозировка

Нарушения мозгового кровообращения и функции головного мозга (синдром деменции при первичной дегенеративной деменции, сосудистой деменции или смешанной форме): по 3 капсулы 1-2 раза в день.

Начальная стадия нарушения кровообращения конечностей: по 1 капсуле 3 раза в день. Капсулы следует проглатывать целиком, запивая водой, независимо от приема пищи. Первые признаки улучшения обычно появляются через один месяц после начала лечения. Для достижения долгосрочного эффекта, особенно это рекомендовано пожилым пациентам, курс лечения проводить не менее 3-х месяцев. Если через 3 месяца нет улучшения или симптомы ухудшаются, поговорите со своим врачом, чтобы определить, следует ли продолжать лечение.

Если Вы забыли вовремя принять Билобил® - как можно скорее примите пропущенную капсулу. Если же наступило время следующего приема Билобил®, не принимайте двойную дозу препарата, а продолжите прием по обычной схеме.

Детская популяция

Этот препарат не предназначен для применения детьми и подростками младше 18 лет.

Побочное действие

Как и все препараты, и этот препарат в отдельных случаях может вызывать побочные реакции.

Очень часто ($\geq 1/10$):

- головная боль.

Часто ($\geq 1/100$ до $< 1/10$):

- головокружение;
- диарея, боли в животе, тошнота, рвота.

Частота не известна (не может быть оценена на основе имеющихся данных):

- кожные аллергические реакции (отек, покраснение, зуд, сыпь);
- реакции гиперчувствительности, включая анафилактический шок;
- кровотечения различной локализации (глазные, носовые, церебральные, желудочно-кишечные).

При проявлении тяжелых побочных эффектов, или эффектов, не упомянутых в листке-вкладыше, пожалуйста, сообщите о них Вашему врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к экстракту гинкго или другим компонентам лекарственного средства.

PI_Text037100_2	– Updated:	Page 2 of 4
-----------------	------------	-------------

Беременность.

Передозировка

О случаях передозировки препарата Билобил не сообщалось. Не было получено отчетов об отравлении стандартизированным сухим экстрактом листьев гинкго.

Меры предосторожности

Перед началом приема капсул Билобил необходимо удостовериться, что симптомы, представленные в разделе «Показания для применения», не являются признаками другого основного заболевания, требующего специфического лечения. Если во время приема лекарственного средства происходит ухудшение состояния, необходимо проконсультироваться с врачом или провизором.

Перед хирургическим вмешательством необходимо сообщить врачу о том, что Вы принимаете капсулы Билобил®. В целях предосторожности прием лекарственного средства должен быть прекращен за 3 – 4 дня до оперативного вмешательства. Пациентам с повышенным риском кровотечения (геморрагические диатезы), а также пациентам, принимающим препараты для предотвращения свертывания крови, перед приемом лекарственного средства следует проконсультироваться с врачом.

Пациенты, принимающие препараты для снижения уровня глюкозы в крови, а также гипотензивные лекарственные средства, перед началом лечения препаратом Билобил® должны проконсультироваться с врачом.

У пациентов с эпилепсией прием препарата Билобил® может спровоцировать развитие судорожного приступа. Перед применением следует проконсультироваться с врачом. Одновременное применение препаратов Билобил® и эфавиренза не рекомендуется.

Применение у детей

Билобил® интенс не рекомендуется принимать детям и подросткам младше 18 лет из-за ограниченных данных по безопасности применения у этой категории пациентов.

Особая информация о некоторых ингредиентах препарата

В связи с содержанием лактозы и глюкозы лекарственное средство не рекомендовано пациентам с врожденной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы.

Лекарственное средство содержит азо-краситель (азорубин (кармуазин), E122), который может вызвать аллергические реакции.

Применение Билобил с пищей и напитками

Вы можете принимать Билобил капсулы независимо от приема пищи. В настоящее время не было сообщений о каком-либо влиянии пищи или напитков на действие гинкго.

Не рекомендуется принимать капсулы вместе с алкогольными напитками.

Беременность и лактация

Перед приемом каких-либо препаратов необходимо проконсультироваться с врачом.

Исследования на животных не выявили какого-либо прямого или непрямого вредного воздействия в отношении репродуктивной токсичности.

Возможно повышение риска кровотечения. Данные о безопасности применения лекарственного препарата во время беременности недостаточны, поэтому данное лекарственное средство противопоказано при беременности.

PI_Text037100_2	– Updated:	Page 3 of 4
-----------------	------------	-------------

Лекарственное средство не следует принимать во время кормления грудью в связи с отсутствием достаточных данных о безопасности препарата в период лактации.

Влияние на способность управлять автомобилем или другими механизмами

Сообщения о влиянии препарата на способность управлять автомобилем или иными механизмами отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Перед началом применения препарата необходимо сообщить врачу о том, что Вы принимаете или недавно принимали какие-либо лекарственные средства.

В случае одновременного применения Билобил® с препаратами для предотвращения свертывания крови (например, кумариновые антикоагулянты, клопидогрель, ацетилсалициловая кислота, другие нестероидные противовоспалительные препараты), возможно влияние на их действие.

При совместном приеме препарата Билобил® с варфарином (препаратом, предназначенным для предотвращения свертывания крови) врачам рекомендуется проводить адекватный мониторинг во время лечения, особенно при изменении дозы варфарина или дозы Билобил®, а также в начале и при прекращении пациентом приема препарата Билобил®.

При совместном приеме препарата Билобил® с дабигатраном (препаратом, предназначенным для предотвращения свертывания крови) возможно усиление действия последнего. Перед применением следует проконсультироваться с врачом.

Билобил® может также усиливать действие нифедипина (препарата, предназначенного для лечения некоторых нарушений сердца и повышенного артериального давления), что может привести к развитию головокружения и повышению тяжести приступов жара (приливов). В случае возникновения указанных эффектов следует обратиться к врачу.

Одновременное применение препарата Билобил® с эфавирензом (препаратом, предназначенным для лечения ВИЧ-инфекции) не рекомендуется, т.к. возможно ослабление эффекта последнего.

Условия и срок хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C. Хранить в оригинальной упаковке с целью защиты от влаги.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 3 года.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Упаковка

20 капсул (2 блистера по 10 капсул) в картонной коробке вместе с листком-вкладышем.
60 капсул (6 блистеров по 10 капсул) в картонной коробке вместе с листком-вкладышем.

Производитель

КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения.