

Листок-вкладыш - информация для пациента

РЕКРЕОЛ®

мазь для наружного применения 50 мг/г

Декспантенол

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- *Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.*
- *Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.*
- *Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.*
- *Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.*
- *Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 7 дней вам следует обратиться к врачу.*

В данном листке-вкладыше содержится следующая информация

1. Что из себя представляет препарат Рекреол и для чего его применяют
2. О чем Вам следует знать перед применением препарата Рекреол
3. Применение препарата Рекреол
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Рекреол
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Рекреол и для чего его применяют

Мазь Рекреол содержит активное вещество – декспантенол, которое принадлежит к группе лекарств для лечения ран и язв. В клетках кожи декспантенол быстро превращается в пантотеновую кислоту. Пантотеновая кислота участвует как в формировании кожи, так и в ее восстановлении.

Мазь Рекреол применяют:

- для заживления и эпителизации кожи при поверхностных повреждениях (небольших ожогах и царапинах), воспалении кожи (возникающего при воздействии лучевой терапии, фототерапии или ультрафиолетового излучения), хронических язвах кожи и пролежнях, анальных трещинах, после пересадки кожи,
- при лечении и профилактике ссадин и растрескиваний кожи,
- для ухода за сухой кожей,
- для профилактического ухода за молочными железами у женщин, кормящих грудью, и лечения трещин сосков,
- для ухода за грудными детьми: в виде защитного слоя от влаги, для лечения стертой, покрасневшей кожи и опрелостей в случае применения пеленок (подгузника),
- как дополнительное средство пациентам во время и после применения кортикостероидов.

2. О чем следует знать перед применением препарата Рекреол

Не применяйте мазь Рекреол в следующих случаях:

- если у Вас аллергия на декспантенол или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Применение мази Рекреол следует прекратить в случае возникновения признаков аллергической реакции.

Проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки, если

- у вас имеется другое заболевание,
- у вас аллергия,
- вы принимаете какие-либо другие лекарственные препараты (в том числе препараты, отпускаемые без рецепта).

Следует избегать случайного попадания мази в глаза. В случае попадания мази в глаза немедленно промойте глаза большим количеством воды.

Для ухода за незащищенными поверхностями кожи (например, лица и рук) и волосным покровом рекомендуется вы можете использовать крем Рекреол, который легко и быстро впитывается.

Некоторые вспомогательные вещества мази Рекреол могут повредить изделия, содержащие латекс, такие как презервативы и/или диафрагма. Следовательно, может снизиться их эффективность в качестве противозачаточных средств или защиты от заболеваний, передающихся половым путем, таких как ВИЧ-инфекция. Если вам нужна дополнительная информация, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Другие лекарственные препараты и препарат Рекреол

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, если вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Нет доказательств того, что мазь Рекреол взаимодействует с другими препаратами.

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Мазь Рекреол можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания. При использовании мази Рекреол в период кормления грудью для лечения трещин на коже сосков перед кормлением грудью следует тщательно промыть кожу.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Мазь Рекреол не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Мазь Рекреол содержит цетиловый спирт, стеариловый спирт и ланолин

Цетиловый спирт, стеариловый спирт и ланолин могут вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

3. Применение препарата Рекреол

Всегда применяйте препарат в полном соответствии листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Для наружного применения.

При заживлении и эпителизации, профилактическом уходе за кожей, при сухой коже: наносите мазь Рекреол один или несколько раз в день, по необходимости.

Профилактический уход за молочными железами у женщин, кормящих грудью: наносите мазь Рекреол на соски после каждого кормления грудью.

Уход за младенцами: подмыв ребенка, высушить кожу и наносить мазь Рекреол после каждой смены пеленок (подгузника).

Как дополнительное средство пациентам во время и после применения кортикостероидов: мазь следует наносить один или несколько раз в день, по необходимости.

Если Вам кажется, что действие мази Рекреол слишком сильное или слишком слабое, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Очень редко (встречаются не более чем у 1 из 10 000 человек):

- аллергические реакции,
- аллергические реакции на коже, например, контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, покраснение кожи, высыпания, крапивница, раздражение и язвы кожи.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата Рекреол

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на картонной пачке после «Годен до». Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Рекреол содержит

- Действующим веществом является декспантенол.
1 г мази содержит 50 мг декспантенола.
- Вспомогательными веществами являются: стеариловый спирт; цетиловый спирт; воск пчелиный белый; протегин XN (жидкий парафин, петролатум, озокерит, глицерил олеат, спирт ланолиновый); масло миндальное; парафин мягкий белый; парафин жидкий; ланолин (овечий жир); вода очищенная до 1 г.

Внешний вид препарата Рекреол и содержимое упаковки

Гомогенная желтоватая мазь со специфическим запахом.

По 30 г или 50 г препарата в тубе алюминиевой с внутренней поверхностью, покрытой лаком, с защитной алюминиевой мембраной на горловине и конусообразным приспособлением для прокола мембраны в навинчивающемся бушоне из пластмассы.

1 туба в пачке картонной вместе с инструкцией по применению.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

АО «Гриндекс». Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия

Телефон: +371 67083205

Факс: +371 67083505

Электронная почта: grindeks@grindeks.lv

Листок-вкладыш пересмотрен 08/2021