

Листок-вкладыш – информация для пациента

АнГриМакс Нео, 325 мг+10 мг+20 мг, капсулы

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержится важные для Вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат АнГриМакс Нео, и для чего его принимают.
2. О чем следует знать перед приемом препарата АнГриМакс Нео.
3. Прием препарата АнГриМакс Нео.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата АнГриМакс Нео.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ АНГРИМАКС НЕО, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИНИМАЮТ

АнГриМакс Нео – это препарат для кратковременного лечения простудных заболеваний, ринитов, ринофарингитов и гриппоподобных состояний у взрослых и детей от 12 лет и старше, сопровождающихся:

- прозрачными выделениями из носа и слезотечением;
- чиханием;
- головной болью и/или лихорадкой.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА АНГРИМАКС НЕО

Не принимайте препарат АнГриМакс Нео, если:

- у Вас аллергия на парацетамол, фенилэфрина гидрохлорид, фенирамина maleat или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- Вы одновременно принимаете препараты из групп трициклических антидепрессантов, ингибиторов моноаминоксидазы (МАО), и/или бета-адреноблокаторов;
- у Вас портальная гипертензия (аномально повышенное давление в крупной вене, несущей кровь от кишечника в печень);
- у Вас алкоголизм;
- у Вас сахарный диабет;
- Вы беременны или кормите грудью;
- Ваш возраст младше 12 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Проконсультируйтесь с врачом, если симптомы:

- не улучшаются в течение 5 дней;
- сопровождаются лихорадкой, которая держится более 3 дней;
- включают боль в горле, которая не проходит более 3 дней, сопровождаются лихорадкой, головной болью, высыпаниями, тошнотой или рвотой.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат, если у Вас:

- повышенное кровяное давление;
- заболевания сердца и сосудов;
- тяжелые заболевания печени или почек;
- заболевания крови;
- врожденных заболеваний печени, сопровождающихся желтухой (синдромы Жильбера, Дубина-Джонсона и Ротера);
- нарушение функции щитовидной железы;
- повышение внутриглазного давления (глаукома);
- опухоль надпочечников (феохромоцитома);
- увеличение предстательной железы;
- бронхиальная астма;
- эпилепсия;
- диабет;
- заболевания органов дыхания (бронхит, бронхоэктазии).

Следует соблюдать осторожность, если у Вас нарушения функции почек и/или печени, в связи с тем, что в данном препарате содержится парацетамол и фенирамин, повышающие риск парацетамолсвязанных повреждений печени.

Если Вам были диагностированы печеночная или почечная недостаточность, необходимо обратиться к врачу, прежде чем принимать этот препарат.

Во избежание риска передозировки следует избегать одновременного применения других лекарственных препаратов, содержащих парацетамол. Для взрослых с массой тела более 50 кг общая доза парацетамола не должна превышать 4 г в день.

Следует избегать одновременного приема с препаратами, которые оказывают седативный эффект (транквилизаторы, снотворные).

Препарат АнГриМакс Нео не следует применять с другими антигистаминными (противоаллергическими) препаратами.

При приеме фенирамина поздно вечером, могут усилиться симптомы гастроэзофагального рефлюкса (заброс содержимого желудка в пищевод).

Пожилые люди и дети чаще испытывают неврологические эффекты (увеличение энергии, беспокойство, нервозность).

Фенилэфрин может способствовать ложному положительному результату допинг-контроля спортсменов.

Если симптомы сохраняются, необходимо обратиться к врачу.

Вспомогательные вещества

АнГриМакс Нео содержит глицерин, который может вызвать головную боль, расстройство желудка или диарею (понос).

АнГриМакс Нео содержит 0,056 мг натрия лаурилсульфата в каждой капсуле.

Дети

Препарат не рекомендован для применения у детей младше 12 лет.

Другие препараты и препарат АнГриМакс Нео

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты, в том числе препараты, отпускаемые без рецепта врача.

Прежде, чем принимать препарат проконсультируйтесь с врачом, если Вы принимаете:

- препараты, разжижающие кровь (например, варфарин);
- препараты, которые ускоряют опорожнение желудка (например, метоклопрамид);
- препараты, замедляющие желудочное опорожнение (например, пропантелин, антидепрессанты, наркотические обезболивающие);
- некоторые антибиотики (например, хлорамфеникол);
- противосудорожные препараты;
- препараты для лечения подагры (например, пробенецид);
- некоторые препараты для снижения холестерина (например, колестирамин);
- препараты для лечения туберкулеза (например, рифампицин, изониазид);
- нестероидные противовоспалительные препараты;
- болеутоляющие препараты (например, опиаты, барбитураты);
- противозипелитические препараты (например, фенобарбитал, фенитоин, карбамезипин);
- препараты для лечения неврологических и психотических расстройств: тревожных состояний (анксиолитики), депрессии (ингибиторы МАО);
- снотворные препараты;
- препараты для снижения кровяного давления;
- сердечные гликозиды;
- оральные контрацептивы;
- препараты для остановки маточных кровотечений (алкалоиды спорыньи).

Препарат АнГриМакс Нео с алкоголем

При применении препарата не рекомендуется употреблять алкогольные напитки, поскольку этиловый спирт при одновременном приеме парацетамола может вызывать нарушение функции печени.

Фенирамин может усиливать действие алкоголя.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Беременность

Препарат противопоказан в период беременности.

Грудное вскармливание

Препарат противопоказан для приема во время кормления грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Во время лечения не рекомендуется управлять транспортными средствами и работать с механизмами, требующими повышенной концентрации внимания. Прием препарата может вызвать сонливость, головокружение, помутнение зрения и психомоторное нарушение у некоторых пациентов, что может серьезно повлиять на способность управлять автомобилем и пользоваться техникой. При одновременном приеме седативных препаратов, транквилизаторов или алкоголя может усиливаться сонливость.

3. ПРИЕМ ПРЕПАРАТА АНГРИМАКС НЕО

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Детям старше 12 лет и взрослым – по 1 капсуле 2–3 раза в день при сохранении лихорадочного синдрома. Повторную дозу можно принимать через каждые 4 часа (но не более 3 капсул в течение 24 часов).

АнГриМакс Нео можно принимать в любое время суток, но наилучший эффект приносит прием препарата перед сном, на ночь.

Если температура не снижается после 3-х дней приема препарата АнГриМакс Нео и/или не происходит облегчения симптомов болезни, необходимо обратиться к врачу. Максимальная продолжительность приема в качестве обезболивающего средства – 5 дней.

Дети

Лекарственный препарат не рекомендован для приема детям до 12 лет.

Способ применения

Внутрь, после еды, запивая водой.

Если вы приняли препарата АнГриМакс Нео больше, чем следовало

Немедленно обратитесь к врачу, если вы приняли больше этого препарата, чем следовало, даже если вы чувствуете себя хорошо.

Это связано с тем, что большое количество парацетамола и других компонентов препарата может вызвать как острые, так и отложенные серьезные нарушения функции печени и других органов.

Если Вы забыли принять препарат АнГриМакс НЕО

Примите капсулу как можно скорее. Если подошло время очередного приема следующей дозы лекарственного препарата, не принимайте пропущенную дозу. Нельзя удваивать дозировку препарата для компенсации пропущенной. Далее препарат принимайте согласно рекомендованному режиму дозирования.

Если Вы прекратили прием препарата АнГриМакс НЕО

Если Вы прекратили прием препарата, то возможно симптомы заболевания появятся снова. Проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

При наличии вопросов по приему препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат АнГриМакс Нео может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Препарат АнГриМакс Нео обычно хорошо переносится пациентами.

Прекратите прием препарата и немедленно обратитесь к врачу, если у Вас появится любая из приведенных ниже нежелательных реакций.

- Аллергические реакции, проявляющиеся кожной сыпью, иногда зудом, отеком лица и/или горла, одышкой.
- Отечность лица, губ, языка и/или горла, которые могут привести к затруднению глотания.
- Сильный зуд кожи (с появлением волдырей).
- Затрудненное дыхание при наличии или отсутствии отека лица, губ, языка и/или горла.

Нежелательные реакции, связанные с парацетамолом

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000): снижение количества тромбоцитов в крови, аллергические реакции (в том числе очень тяжелые), нарушение дыхания (бронхоспазм у пациентов, чувствительных к аспирину и другим нестероидным противовоспалительным препаратам), нарушение функции печени.

Нежелательные реакции, связанные с фенирамином

Очень часто (могут возникать у более чем 1 человека из 10): торможение, сонливость, нарушение внимания, нарушение координации, головокружение, головная боль.

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10): размытое зрение, нарушения зрения, повышение внутриглазного давления, тошнота, сухость во рту, рвота, боли в животе, диарея (понос), диспепсия (нарушение пищеварения), усталость.

Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно): аллергические реакции (в том числе тяжелые), отсутствие аппетита, возбуждение*, раздражительность*, ночные кошмары*, учащение сердцебиения, нарушение ритма сердца, снижение кровяного давления, повышение густоты секрета бронхов, поражение кожи, слабость мышц, подергивание мышц, задержка мочи.

*Чаще у детей и пожилых людей.

Нежелательные реакции, связанные с фенилэфрином

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10): нервозность, раздражительность, беспокойство и возбудимость, головная боль, головокружение, бессонница, повышение кровяного давления, тошнота, рвота.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000): расширение зрачка (мидриаз), повышение внутриглазного давления, учащение сердцебиения, сыпь, крапивница, аллергический дерматит, нарушения мочеиспускания, задержка мочи (наиболее вероятно у пациентов с гипертрофией предстательной железы).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

Также Вы можете сообщить о побочных эффектах непосредственно в Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий им. Академика Э. Габриеляна, переходя на сайт www.pharm.am в раздел «Сообщить о побочном эффекте лекарства» и заполнить форму «Карта сообщений о побочном действии лекарства».

Телефон горячей линии: +37410200505; +37496220505.

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности лекарственного средства.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА АНГРИМАКС НЕО

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Храните в защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25 °C.

Не принимайте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат АнГриМакс Нео содержит

Действующие вещества: парацетамол – 325 мг, фенилэфрина гидрохлорид – 10 мг, фенирамина малеат – 20 мг.

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный, крахмал картофельный, магния стеарат.

Оболочка капсулы содержит: желатин, глицерин, вода очищенная, титана диоксид (E171), красный очаровательный (E129), хинолиновый желтый (E104), бриллиантовый голубой (E133).

Внешний вид препарата и содержимое его упаковки

Капсулы твердые желатиновые цилиндрической формы с полусферическими концами с корпусом белого цвета и крышечкой красно-коричневого цвета.

По 10 или 14 капсул в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 2 контурные ячейковые упаковки № 14 или по 2 или 3 контурные ячейковые упаковки № 10 вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

УП «Минскинтеркапс», Республика Беларусь,

220075, г. Минск, ул. Инженерная, д. 26

Телефон/факс: +375 17 276–01–59

Электронная почта: info@mic.by

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий, следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Листок-вкладыш пересмотрен

Дата последнего пересмотра: 15 мая 2023