

Листок-вкладыш – информация для потребителя
АЦИКЛОВИР,
50 мг/г, мазь для наружного применения
Действующее вещество: ацикловир (aciclovir)

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат АЦИКЛОВИР, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата АЦИКЛОВИР.
3. Применение препарата АЦИКЛОВИР.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата АЦИКЛОВИР.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что собой представляет препарат АЦИКЛОВИР,
и для чего его применяют**

Мазь АЦИКЛОВИР относится к противовирусным препаратам. Применяется для лечения герпеса и половых инфекций, вызванных вирусом простого герпеса. Препарат уничтожает или останавливает рост вирусов, вызывающих герпес или генитальный герпес.

**2. О чем следует знать перед применением
препарата АЦИКЛОВИР**

Не принимайте препарат АЦИКЛОВИР:

- если у вас аллергия (гиперчувствительность) на ацикловир, валацикловир или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата АЦИКЛОВИР проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки если:

- у вас заболевание, при котором у вас ослаблена иммунная система, и ваш организм в меньшей степени способен бороться с инфекциями (например, если у вас ВИЧ или СПИД или если вы перенесли трансплантацию костного мозга).

Если вы не уверены, проконсультируйтесь со своим врачом или работником аптеки, прежде чем применять мазь АЦИКЛОВИР.

Мазь АЦИКЛОВИР не предназначена для применения в полости рта, глаз или во

влагалище. АЦИКЛОВИР может вызвать раздражение кожи.

Другие препараты и препарат АЦИКЛОВИР

Сообщите лечащему врачу, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие препараты. Это относится к любым растительным препаратам или препаратам, которые вы купили без предписания.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Нет сообщений о влиянии ацикловира на способность управлять автомобилем или работать с механизмами.

3. Применение препарата АЦИКЛОВИР

Всегда применяйте этот препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений, посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Применение мази АЦИКЛОВИР

- Мазь АЦИКЛОВИР не предназначена для применения в полости рта, глаз или во влагалище.
- Вы не должны смешивать мазь АЦИКЛОВИР ни с чем даже с водой.
- Всегда мойте руки перед и после применения мази АЦИКЛОВИР.

Рекомендуемая доза

Взрослые и дети

- Наносите тонкий слой мази на пораженный участок пять раз в день.
- Вы должны делать интервалы между каждым применением мази АЦИКЛОВИР четыре часа. Рекомендуемое время: 7:00, 11:00, 15:00, 19:00 и 23:00.
- Если проявления герпеса не зажили через 4 дня или генитальный герпес не зажил через 5 дней, вы можете использовать мазь еще 5 дней.
- Если после этого пораженный участок еще не зажил, прекратите применение мази и сообщите об этом своему врачу.

Если вы применили препарата АЦИКЛОВИР больше, чем следовало

Если вы применили мазь АЦИКЛОВИР больше, чем предусмотрено, посоветуйтесь со своим врачом или работником аптеки.

Мазь предназначена для местного применения, если вы случайно проглотите ее, посоветуйтесь со своим врачом или работником аптеки.

Если вы пропустили применение препарата АЦИКЛОВИР

Если вы пропустили применение препарата, нанесите мазь, как только вспомните об этом. Однако, если уже почти пришло время следующего применения, не наносите двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

При наличии дополнительных вопросов по применению данного препарата обратитесь к врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, мазь АЦИКЛОВИР может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Аллергические реакции (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000)

Если у вас развилась аллергическая реакция, прекратите применение мази АЦИКЛОВИР и немедленно обратитесь к врачу.

Симптомы аллергической реакции могут включать:

- сыпь, зуд или крапивница на коже;

- отек лица, губ, языка или других частей тела
- одышка, свистящее дыхание или затрудненное дыхание;
- необъяснимая лихорадка и слабость, особенно при вставании.

Другие нежелательные реакции включают:

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- жжение или покалывание после применения мази, которое потом проходит;
- сухость или шелушение кожи;
- зуд.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- эритема (покраснение);
- сыпь на коже (контактный дерматит).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов (Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий, www.pharm.am).

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата АЦИКЛОВИР

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности – 3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Нет специальных требований к утилизации неиспользованных остатков препарата.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Одна туба мази АЦИКЛОВИР содержит *действующее вещество* – ацикловир – 250 мг.

Вспомогательные вещества: макрогол 400, макрогол 1500.

Внешний вид препарата АЦИКЛОВИР и содержимое упаковки

АЦИКЛОВИР, 50 мг/г, мазь для наружного применения, однородная белого цвета мазь.

По 5 г в тубы алюминиевые.

Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска: без рецепта.

Производитель:

РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь,

Адрес производственной площадки:

220007, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Фабрициуса, 3/11 (ЭПЦ)

Контроль качества и выпуск серии:

220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30, пер. Фабрициуса, 3/11.

Юридический адрес и адрес для принятия претензий:

РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь,

220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30,

т./ф.: (+375 17) 220 37 16,

e-mail: medic@belmedpreparaty.com



Листок-вкладыш пересмотрен