

ЛИСТОК - ВКЛАДЫШ
(Информация для потребителей)

БЕТАЦИД®

Лосьон

Бетаметазон / Салициловая кислота

Следует прочитать внимательно этот листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данный лекарственный препарат, так как он содержит важную информацию для Вас.

- Следует сохранить этот листок-вкладыш. Возможно его придется прочитать еще раз.
- Если у Вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы, следует обратиться к лечащему врачу или фармацевту.
- Данный лекарственный препарат выписан для Вас. Не следует давать его другим лицам. Он может навредить им, даже если у них схожие симптомы.
- Если у Вас появились какие-либо побочные эффекты, обратитесь к вашему врачу или фармацевту. Возможны побочные эффекты, не перечисленные в этом листке-вкладыше (см.раздел 4).

Содержание листка-вкладыша:

1. Что такое Бетацид и для чего он применяется.
2. Что необходимо знать перед применением Бетацида.
3. Как принимать Бетацид.
4. Возможные побочные эффекты.
5. Как хранить Бетацид.
6. Содержимое упаковки и дополнительная информация.

1. Что такое Бетацид и для чего он применяется

Бетаметазон дипропионат и салициловая кислота являются активными веществами препарата Бетацид. Бетаметазон дипропионат относится к группе глюкокортикоидов для местного применения. Бетаметазон дипропионат относится к группе сильных глюкокорти-коидов, которые применяются для уменьшения покраснения и зуда кожных покровов головы, вызванные определенными кожными заболеваниями. Салициловая кислота смягчает поверхностный слой роговых наслоений, вызванные кожными заболеваниями, что способствует проникновению бетаметазона дипропионата в более глубокие слои пораженной кожи и развитию лечебного эффекта.

Бетацид лосьон применяется для лечения кожных заболеваний у детей и взрослых, при которых поверхность кожи покрыта роговым слоем. Бетацид лосьон удаляет весь поверхностный роговой слой, уменьшает покраснение и зуд, вызванные определенными кожными заболеваниями.

2. Что необходимо знать перед применением Бетацида

Не применять Бетацид,

- если у Вас аллергия (гиперчувствительность) к бетаметазону дипропионату, салициловой кислоте или любому другому компоненту препарата (см. раздел 6).
- для лечения любых других кожных заболеваний, так как препарат может ухудшить их течение, особенно при лечении розацеи (дерматологическое заболевание, поражающее кожу лица), угрей, околоротового дерматита (воспаление кожи), генитального зуда, сыпи от подгузников, герпетической сыпи, ветряной оспы или других кожных заболеваний.

Особые указания и меры предосторожности

Если у вас псориаз, то у вашего врача может возникнуть необходимость регулярно пересматривать процесс лечения. Обратитесь к врачу, если течение псориаза ухудшается или у вас под кожей появляются выпуклости, наполненные гноем.

Обратитесь к врачу, если вы или ваш ребенок испытываете помутнение зрения или другие нарушения зрения.

Не рекомендуется наносить препарат под повязки или пластыри.

Побочные эффекты, которые могут возникать при ингаляционных или пероральных кортикостероидах, также могут возникать при нанесении кортикостероидов на кожу, особенно у младенцев и детей.

Если Бетацид применяется чаще, чем рекомендовано или дольше, чем предписано врачом, он может повлиять на эндокринную систему, особенно у младенцев и детей.

У взрослых изменение уровня гормонов может редко приводить к одутловатости или округлению лица, слабости, утомляемости и головокружению в положении стоя или сидя.

Не курите и не приближайтесь к открытому огню – есть риск серьезных ожогов. Ткань (одежда, постельное белье, перевязочные материалы и т. д.), контактировавшая с данным препаратом, легче воспламеняется и представляет собой серьезную опасность возгорания. Стирка одежды и постельного белья может уменьшить накопление продукта, но не сможет удалить его полностью.

Если ваше состояние ухудшится во время применения препарата, проконсультируйтесь с врачом – возможно, у вас аллергическая реакция, инфекция или ваше состояние требует другого лечения.

Если вы испытываете рецидив своего состояния вскоре после прекращения лечения, в течение 2 недель, не возобновляйте использование препарата без консультации с вашим врачом, если только ваш врач не посоветовал вам сделать это ранее. Если ваше состояние улучшилось и при рецидиве покраснение распространяется за пределы области первоначального лечения и вы испытываете жжение, обратитесь к врачу, прежде чем возобновлять лечение.

Дети

Если Бетацид применяется чаще, чем рекомендовано или дольше, чем предписано врачом, он может повлиять на эндокринную систему вашего ребенка. В редких случаях это может привести к:

- Задержке роста и развития
- Отечности или округлению лица
- Нарастанию давления вокруг мозга, которое может вызвать:
 - выпячивание родничка (мягкое место в верхней части черепа) у младенцев
 - постоянную пульсирующую головную боль
 - затуманенное зрение или другие нарушения зрения

Беременность и кормление грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны или при планировании беременности, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или фармацевтом перед тем, как принимать этот препарат.

3. Как применять Бетацид лосьон

Бетацид следует применять в точности так, как прописано врачом. Если у Вас есть какие-то сомнения, то вам следует проконсультироваться с лечащим врачом или фармацевтом.

Рекомендуемая доза

Обычно взрослым и детям несколько капель лосьона нежно и полностью втирают на пораженные участки кожи головы два раза в день.

Важная информация о применении Бетацида

- Вам следует наносить Бетацид только на пораженные участки кожи головы.
- Не используйте большое количество препарата длительное время (например, каждый день в течении недель или месяцев)
- Следует избегать попадания Бетацида в глаза.

Применение у детей

Следует придерживаться рекомендаций, указанных выше. Не рекомендуется применять Бетацид на кожу головы ребенка более 5 дней.

Если Вы применили больше Бетацида, чем Вам было рекомендовано

Если Вы (или кто-то другой) случайно проглотили препарат, это не должно привести к каким-либо проблемам, однако если у Вас есть какие-то сомнения, то вам следует проконсультироваться с врачом. Если Бетацид применять чаще, чем рекомендовано или дольше, чем предписано врачом, то он может негативно воздействовать на гормональную систему организма. У детей он может нарушить рост и развитие. Может также развиваться тошнота и/или рвота и шум в ушах.

Сообщите обязательно врачу или фармацевту, если Вы применяли Бетацид намного чаще, чем было рекомендовано или дольше, чем было предписано врачом или не применяли его так, как было предписано.

Если Вы забыли применить Бетацид

Если Вы забыли применить очередную дозу препарата, применяйте ее как только вспомните, затем продолжайте применение в прежнем режиме.

Если Вы прекращаете применение Бетацида

Если при длительном применении Бетацида наблюдается улучшение состояния кожи, не следует внезапно отменять применение препарата. Это может привести к покраснению кожи головы, чувству жжения и раздражения. Для избежания развития этих побочных эффектов, Вы должны обратиться к своему лечащему врачу, он пропишет Вам режим постепенного снижения частоты применения препарата до полного его прекращения.

Если у Вас есть дополнительные вопросы по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.

4. Возможные побочные эффекты

Как и другие лекарственные средства, Бетацид может вызвать побочные эффекты, хотя они и не появляются у каждого.

Большинство людей считают, что если придерживаться правильного режима применения препарата, это не приведет к каким либо проблемам. Тем не менее, если препарат используется чаще прописанного, то могут развиваться следующие реакции:

- Истончение кожи, чувство жжения, образование волдырей, шелушение, отек, зуд, раздражение, кожная сыпь, сухость кожи и красные пятна. Эти симптомы чаще наблюдаются у младенцев и детей.
- Фолликулит, избыточный рост волос, снижение пигментации кожи и аллергические реакции.
- Дерматиты - воспалительное поражение кожи, возникающее в результате воздействия на нее внешних повреждающих факторов, например употребление моющих средств, при которых наблюдается покраснение и зуд кожи.
- Затуманенное зрение.

Синдром отмены стероидов:

При постоянном применении в течение длительного времени при прекращении лечения может возникнуть синдром отмены с некоторыми или всеми из следующих признаков: покраснение кожи, которое может распространяться за пределы первоначально обработанного участка, ощущение жжения или покалывания, сильный зуд, шелушение кожи, сочащиеся открытые язвы.

Отчетность о побочных эффектах:

Если Вы отметили какие-либо побочные эффекты, сообщите об этом своему лечащему врачу, провизору или фармацевту, в том числе и о побочных эффектах, не перечисленных в этом листке-вкладыше. Так же Вы можете сообщить о побочных эффектах компании ООО «Арпимед», перейдя на сайт www.arpimed.com и заполнить соответствующую форму «Сообщить о побочном действии или неэффективности лекарства» и в Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий им. академика Э.Габриеляна, перейдя на сайт www.pharm.am в раздел «Сообщить о побочном эффекте лекарства» и заполнить форму «Карта сообщений о побочном действии лекарства». Телефон горячей линии научного центра: +37410200505; +37496220505.

5. Хранение препарата Бетацид

- Хранить в недоступном для детей, защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25°C.
- Срок годности – 3 года. Не принимать Бетацид по истечении срока годности, указанного на упаковке препарата. При указании срока годности имеется в виду последний день указанного месяца.
После вскрытия флакона использовать до истечения срока годности.
- Не следует спускать лекарства в сточные воды или в канализацию. Спросите у фармацевта, как распорядиться с препаратом, который Вам больше не понадобится. Эти меры направлены на защиту окружающей среды.

6. Содержимое упаковки и дополнительная информация

Что содержит Бетацид

Каждый миллилитр содержит:

действующие вещества: 0.5 мг бетаметазона (в форме дипропионата), 20 мг салициловой кислоты;

вспомогательные вещества: гидроксид натрия, ЕДТА динатриевая соль, гидроксипропилцеллюлоза, этиловый спирт, вода очищенная.

Как выглядит Бетацид и содержимое упаковки:

Прозрачная жидкость, без цвета и запаха.

Описание упаковки

30 мл лосьона во флаконах янтарного цвета вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

Каковы условия отпуска Бетацида из аптек:

Отпускается по рецепту

Производитель**ООО "АРПИМЕД"**

Республика Армения, Котайкская область, 2204, г. Абовян, 2-ой мкр, дом 19

Тел.: 374 (222) 21703, 21740

Факс: 374 (222) 21924

Держатель регистрационного удостоверения**ООО "АРПИМЕД"**

Республика Армения, Котайкская область, 2204, г. Абовян, 2-ой мкр, дом 19

Тел.: 374 (222) 21703, 21740

Факс: 374 (222) 21924

За любой информацией о препарате следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения:

ООО "АРПИМЕД"

Республика Армения, Котайкская область, 2204, г. Абовян, 2-ой микрорайон, д. 19

Тел.: 374 (222) 21703, 21740

Факс: 374 (222) 21924

Дата последнего пересмотра текста.