

ЛИСТОК- ВКЛАДЫШ
(Информация для потребителей)

Ла-Сон
25 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Гидроксизин

Следует прочитать внимательно этот листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данный лекарственный препарат, так как он содержит важную информацию для Вас.

- Следует сохранить этот листок-вкладыш. Возможно, его придется прочитать еще раз.
- Если у Вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы, следует обратиться к лечащему врачу или фармацевту.
- Данный лекарственный препарат выписан для Вас. Не следует давать его другим лицам. Он может навредить им, даже если у них схожие симптомы.
- Если у Вас изменилась тяжесть побочных эффектов или появились побочные эффекты, не перечисленные в этом листке-вкладыше, следует сообщить об этом лечащему врачу или фармацевту.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что такое Ла-Сон и для чего он применяется
2. Что необходимо знать перед применением
3. Как принимать Ла-Сон
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить Ла-Сон
6. Дополнительная информация

1. Что такое Ла-Сон и для чего он применяется

Ла-Сон принадлежит к группе антигистаминных препаратов (используется для лечения аллергических реакций). У взрослых и детей используется для уменьшения зуда, вызванный крапивницей (уртикария) и дерматитом (экзема).

Ла-Сон также используется для лечения тревожного состояния у взрослых.

2. Что необходимо знать перед применением

Не принимать Ла-Сон:

- Если у Вас аллергия (гиперчувствительность) на гидроксизин гидрохлорид, цетиризин, к другим производным пиперазина, аминофиллину или этилендиамину, или к любому из компонентов Ла-Сона, перечисленных в подразделе «Дополнительная информация» (см. раздел б).
- Если на Вашем ЭКГ (электрокардиограмма) фиксируется проблема с сердечным ритмом, известная как “удлинение интервала QT”.
- Если у Вас есть или Вы имели сердечно-сосудистые заболевания или частота Вашего сердечного ритма очень медленная.
- Если у Вас низкий уровень некоторых микроэлементов в организме (например, уровень калия или магния).
- Если Вы принимаете лекарства для лечения нарушений сердечного ритма или лекарства, которые могут вызвать определенный вид нарушения сердечного ритма.
- Если в семейном анамнезе присутствуют случаи внезапных смертей близких родственников вследствие сердечных патологий.

- Если у Вас бронхиальная астма и в прошлом была выраженная реакция на антигистаминные препараты.
- Если у Вас порфирия (заболевание, связанное с нарушением биосинтеза гемоглобина, которая вызывает боли в животе, запор, изменение цвета мочи, кожные высыпания и нарушения поведения).
- Если Вы беременны, попробуйте забеременеть или кормите грудью.

Ла-Сон содержит лактозу. Если у Вас есть непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь со своим врачом перед применением этого препарата. Если у Вас наследственная непереносимость галактозы, врожденная лактазная недостаточность Lapp-а или глюкозо-галактозная мальабсорбция, Вы не должны принимать этот препарат.

Если какое-либо из вышеуказанных относится к Вам или Вы не уверены, относится ли какой-либо из вышеуказанных пунктов к Вам, поговорите со своего врача или фармацевтом, перед началом приема Ла-Сон.

Предупреждения и меры предосторожности

Ла-Сон может привести к повышению риска развития нарушений сердечного ритма, что может угрожать жизни пациента. Поэтому, сообщите своему врачу если у Вас есть проблемы с сердцем или Вы принимаете любые другие лекарства, в том числе лекарства, которые отпускаются без рецепта.

Немедленно обратитесь к врачу, если, принимая Ла-Сон у Вас возникли проблемы с сердцем, такие как сердцебиение, проблемы с дыханием, потеря сознания.

Лечение препаратом следует прекратить.

До использования Ла-Сона проконсультируйтесь со своим врачом, если Вы:

- Страдаете заболеванием почек или уже находитесь на диализе;
- Страдаете заболеванием печени. Ла-Сон не рекомендуется пациентам с тяжёлыми заболеваниями печени или печеночной недостаточностью;
- Страдаете глаукомой (повышенное внутриглазное давление);
- Страдаете затруднением при мочеиспускании, например, из-за увеличенной простаты;
- Страдаете проблемами пищеварительной системы или желудка;
- Страдайте миастенией (мышечная слабость);
- Страдайте деменцией;
- Страдайте судорожными припадками, включая эпилепсию;
- Страдайте проблемами с дыханием;
- Страдайте затруднением мочеиспускания, вследствие обструктивных процессов в мочевом пузыре;
- Страдайте гипертиреозом (обычно называемый “сверхактивной щитовидной железой”);
- Страдайте повышенным артериальным давлением (гипертония).

Ваш доктор может изменить дозировку препарата, если Вы в пожилом возрасте.

Ла-Сон может повлиять на результаты некоторых тестов, проводимых при аллергии или астме. Обязательно предупредите своего врача или медсестру, если Вы недавно принимали Ла-Сон.

Если какое-либо из вышеуказанных относится к Вам или Вы не уверены, относится ли какой-либо из вышеуказанных пунктов к Вам, поговорите со своим врачом или фармацевтом, перед началом приема Ла-Сон.

Другие лекарственные средства и Ла-Сон

Пожалуйста сообщите своему врачу или фармацевту, если Вы принимаете или недавно принимали любые другие лекарства, в том числе лекарства, которые отпускаются без рецепта. На терапевтический эффект Ла-Сона могут влиять другие препараты, так и Ла-Сон может воздействовать на эффективность других препаратов.

Не принимайте Ла-Сон, если Вы используете препараты для лечения:

- Бактериальных инфекций (например, антибиотики эритромицин, моксифлоксацин, левофлоксацин);
- Грибковых инфекций (например, пентамидин);
- Сердечных проблем или повышенного артериального давления (например, амиодарон, хинидин, дизопирамид, соталол);
- Психозов (например, галоперидол);
- Депрессии (например, циталопрам, эсциталопрам);
- Расстройства желудочно-кишечного тракта (например, прукалоприд);
- Аллергии;
- Малярии (например, мефлохин);
- Онкологических заболеваний (например, торемифен, вандетаниб);
- Наркотической зависимости или сильной боли (например, метадон).

Важно сообщить Вашему врачу, если Вы принимаете какие-либо из следующих препаратов:

- Адреналин или эпинефрин;
- Барбитураты (для нарушения сна и эпилепсии);
- Циметидин (для язвенной болезни и изжоги);
- Антиэметики (Препараты против рвоты и тошноты);
- Бетагистин (используется для лечения синдрома Меньера);
- Анестетики;
- Миорелаксанты;
- Опиоиды (лекарства для облегчения сильной боли), антихолинергические препараты, к ним относятся некоторые препараты, которые используются для синдрома раздраженной толстой кишки, и препараты, которые используются для лечения астмы или недержания мочи;
- Аминофиллин (для проблем с дыханием);
- Соли бензилпенициллина и хлорамфеникола натрия сукцинат (антибиотики);
- Доксорубицина гидрохлорид (препарат для химиотерапии);
- Антидепрессанты, включая ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО) (такие как изокарбоксазид или моклобемид), и трициклические антидепрессанты (таких как амитриптилин), препараты для лечения тревоги;
- Препараты, которые помогают вам заснуть;
- Бензодиазепины;
- Антихолинэстеразные препараты (такие как эдрофоний и неостигмин);
- Антимускариновые лекарственные средства (такие как атропин);
- Противосудорожные средства;
- Другие антигистамины.

Использование с пищей и напитками

Вы не можете использовать алкоголь вместе с препаратом Ла-Сон, так-как седативный эффект алкоголя может быть усилен.

Беременность и кормление грудью

Не принимайте Ла-Сон если Вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если Вы забеременели, принимая при этом Ла-Сон немедленно сообщите своему врачу.

Посоветуйтесь со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать какие-либо лекарства.

Влияние на способность управлять автомобилем и сложной техникой

Ла-Сон может вызвать сонливость и снизить бдительность, обычно в первые нескольких дней после начала приема. Если вы принимаете препарат не садитесь за руль или не работайте с механизмами до тех пор, пока эффект препарата не пройдет.

Важная информация о некоторых компонентах Ла-Сон

Ла-Сон 25 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, содержит лактозу, если Ваш доктор сказал, что у Вас есть непереносимость некоторых сахаров, поговорите со своим врачом перед применением этого препарата.

3. Как принимать Ла-Сон

Всегда принимайте препарат точно так, как ваш врач сказал Вам. Если Вы не уверены, как следует принимать препарат, посоветуйтесь с врачом или фармацевтом.

Придерживайтесь минимальной эффективной дозы Ла-Сона и курс лечения должен быть максимально коротким.

Рекомендуемая доза составляет:

У взрослых и детей весом более 40 кг максимальная суточная доза составляет 100 мг/сут при всех типах показаний.

Для лечения зуда у взрослых

Начальная доза составляет 25 мг на ночь, Ваш доктор может увеличить дозу до 25 мг три или четыре раза в день.

Дети и подростки

Для лечения зуда у детей

Данный препарат в данной лекарственной форме не рекомендуется для детей в возрасте до 6 лет.

У детей весом до 40 кг следует назначать другие лекарственные формы и дозировки, содержащие гидроксизин.

Дети старше 6 лет

От 15 мг до 25 мг в сутки, Ваш доктор может увеличить дозу от 50 мг до 100 мг в день в несколько приемов. Врач может изменить дозу в зависимости от веса ребенка.

Для лечения тревожного состояния у взрослых

Доза составляет от 50 мг до 100 мг в сутки в разделенных дозах.

Для пациентов с заболеваниями печени

Вашему врачу следует уменьшить дозу примерно на одну треть, если у вас есть заболевание печени.

Ла-Сон не рекомендуется пациентом с тяжёлыми заболеваниями печени или печеночной недостаточностью.

Для пациентов с заболеваниями почек

Вашему врачу следует уменьшить дозу примерно вдвое, если у вас есть заболевание печени.

Пожилкой возраст

У пожилых больных максимальная суточная доза составляет 50 мг/сут.

Если Вы приняли больше таблеток, чем Вам было рекомендовано:

Если Вы приняли много таблеток одновременно или думаете, что ребенок проглотил несколько таблеток, необходимо немедленно обратиться в ближайшее отделение скорой медицинской помощи или сообщить об этом своему врачу. В случае передозировки может быть применено симптоматическое лечение. Необходимо делать ЭКГ мониторинг, поскольку могут возникнуть проблемы с сердечным ритмом, такие как удлинение интервала QT или мерцание желудочков.

Симптомы передозировки могут меняться и могут включать:

- Замедление мышления, невнятная речь и чувства беспокойства, произвольные или медленные движения;
- Сухость во рту, проблемы со зрением, быстрое или выраженное сердцебиение, затруднение мочеиспускание и запор;
- Поражение центральной нервной системы, который, может привести к замедлению вашего дыхания и сердечного ритма, развитию сонливости и спутанности сознания, или у вас может возникнуть раздражение центральной нервной системы, чувство волнения, припадки, дрожь и галлюцинации.

Ла-Сон может вызвать выраженный седативный эффект, которое требует терапевтического вмешательства.

Если Вы принимали какие-либо другие препараты или вещества одновременно с препаратом Ла-Сон, сообщите об этом медицинскому персоналу, проводящему лечение передозировки.

Если Вы забыли принять Ла-Сон:

Если Вы забыли вовремя принять дозу, как можно скорее примите пропущенную, если уже почти наступило время для принятия следующей дозы. Не принимайте двойную дозу. Затем продолжайте прием в обычном режиме.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы по использованию препарата, обратитесь к Вашему врачу или фармацевту.

4. Возможные побочные эффекты

Не беспокойтесь. Как и все лекарства, Ла-Сон может вызвать побочные эффекты, однако они возникают не у каждого пациента. У некоторых людей Ла-Сон может вызвать следующие побочные эффекты:

Если Вы заметили любой из следующих побочных эффектов после использования препарата Ла-Сон, прекратите принимать препарат и немедленно обратитесь за медицинской помощью:

- Симптомы тяжелой аллергической реакции, такие как:
 - Отек лица, языка или горла,
 - Трудности при глотании,
 - Крапивница и трудности с дыханием;
- Серьезные реакции, которые могут включать образование пузырей на коже, глазах, рту и половых органах;
- Тремор (дрожь) или судороги (припадки);
- Если у вас возникли проблемы с сердечным ритмом, такие как учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание или потеря сознания.

Другие возможные побочные эффекты включают в себя:

- Сонливость, седативный эффект, кома, невнятная речь, замедление мыслительных процессов и движений, произвольные движения, головокружение, слабость, головная боль, Неспособность сосредоточиться, нарушения сна, горький привкус во рту;
- Спутанность сознания, галлюцинации, дезориентация, необычные изменения настроения;
- Залитые кровью глаза, затуманенное зрение и трудности с фокусировкой;
- Быстрое или выраженное сердцебиение;
- Пониженное артериальное давление, приливы;
- Сухость в носу, рта или горла, свистящее дыхание;
- Проблемы с печенью (симптомы включают желтуху);
- Затруднение или боль при мочеиспускании, кровь в моче;
- Усталость, общее недомогание, лихорадка, озноб, боль в мышцах, чувство стеснения в груди, боль в суставах;
- Порфирия (редкая болезнь, которая влияет на обмен веществ), анорексия;
- Заболевания крови;
- Кожная сыпь, отек, зуд, крапивница, экзема, повышенная потливость, выпадение волос, покалывание, онемение кожи, гнойные раны кожи;

- Длительная эрекция полового члена, импотенция, ранняя менструация;
- Проблемы со слухом, с равновесием или координацией;
- Проблемами пищеварительной системы или желудка, тошнота или рвота, диарея, запор.

Если Вы заметили какие-либо побочные эффекты, сообщите об этом своему лечащему врачу или фармацевту, в том числе и о побочных эффектах, не перечисленных в этом листке-вкладыше.

Отчетность о побочных эффектах:

Если Вы отметили какие-либо побочные эффекты, сообщите об этом своему лечащему врачу, провизору или фармацевту, в том числе и о побочных эффектах, не перечисленных в этом листке-вкладыше. Так же Вы можете сообщить о побочных эффектах компании ООО «Арпимед», перейдя на сайт www.argimed.com и заполнить соответствующую форму «Сообщить о побочном действии или неэффективности лекарства» и в Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий им. академика Э.Габриеляна, перейдя на сайт www.pharm.am в раздел «Сообщить о побочном эффекте лекарства» и заполнить форму «Карта сообщений о побочном действии лекарства». Телефон горячей линии научного центра: +37410200505; +37496220505.

5. Хранение препарата Ла-Сон

- Не принимать Ла-Сон по истечении срока годности, указанного на упаковке препарата. При указании срока годности имеется в виду последний день указанного месяца.
- Хранить в недоступном для детей, защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25°C.
- Срок годности - 3 года.

Не следует спускать лекарства в сточные воды или в канализацию. Спросите у фармацевта, как распорядиться с препаратом. Эти меры направлены на защиту окружающей среды.

6. Дополнительная информация

Ла-Сон содержит:

- ✓ действующее вещество: гидроксизина гидрохлорид – 25.0 мг;
- ✓ прочие ингредиенты: *ядро* - микрокристаллическая целлюлоза, лактозы моногидрат, кальция гидрофосфат, натрия крахмалгликолят, повидон К30, магния стеарат, аэросил; *оболочка* – гипромеллоза, титана диоксид, пропиленгликоль, тальк.

Внешний вид Ла-Сона и содержимое упаковки:

Белые овальные двояковыпуклые таблетки с разделительной риской, покрытые пленочной оболочкой.

Описание упаковки:

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке (ПВХ/алюминий). По 2 контурных ячейковых упаковок (20 таблеток) вместе с листком-вкладышем в картонной упаковке.

Отпускается по рецепту.

Производитель

ООО "АРПИМЕД"

Республика Армения, Котайкская область, 2204, г. Абовян, 2-ой мкр, дом 19
Тел.: 374 (222) 21703, 21740 Факс: 374 (222) 21924

Держатель регистрационного удостоверения

ООО "АРПИМЕД"

Республика Армения, Котайкская область, 2204, г. Абовян, 2-ой мкр, дом 19
Тел.: 374 (222) 21703, 21740 Факс: 374 (222) 21924

За любой информацией о препарате следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения:

ООО "АРПИМЕД"

Республика Армения, Котайкская область, 2204, г. Абовян, 2-ой мкр, дом 19
Тел.: 374 (222) 21703, 21740 Факс: 374 (222) 21924

Дата последнего пересмотра текста