**Листок - вкладыш**
(Информация для потребителей)

# Эритромицин

## 2% раствор для наружного применения

Эритромицин

**Следует прочитать внимательно этот листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данный лекарственный препарат, так как он содержит важную информацию для Вас.**

• Следует сохранить этот листок-вкладыш. Возможно его придется прочитать еще раз.

• Если у Вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы, следует обратиться к лечащему врачу или фармацевту.

• Данный лекарственный препарат выписан для Вас. Не следует давать его другим лицам. Он может навредить им, даже если у них схожие симптомы.

• Если у Вас изменились или появились побочные эффекты, не перечисленные в этом листке-вкладыше, следует сообщить об этом лечащему врачу или фармацевту.

**Содержание листка-вкладыша:**

**1.** Что такое Эритромицин и для чего он применяется
**2.** Что необходимо знать перед применением Эритромицина
**3.** Как принимать Эритромицин
**4.** Возможные побочные эффекты
**5.** Как хранить Эритромицин
**6.** Содержимое упаковки и дополнительная информация

### 1. Что такое Эритромицин и для чего он применяется

Активным веществом препарата Эритромицин 2% раствор является эритромицин, который является антибиотиком. Эритромицин используется для лечения угрей. Препарат воздействует на бактерии, которые приводят к образованию угревой сыпи.

Эритромицин предназначен для использования у взрослых и подростков старше 12 лет при угрях.

Не разрешается использовать в детском возрасте.

## 2. Что необходимо знать перед применением Эритромицина

**Не использовать Эритромицин, если:**

• у Вас аллергия (гиперчувствительность) к эритромицину или любому другому компоненту препарата (см. раздел 6).

Если у Вас какие-либо сомнения по поводу использования препарата, посоветуйтесь со своим врачом или фармацевтом.

**Особые указания и меры предосторожности**

Проконсультируйтесь с Вашим врачом перед использованием Эритромицина, если:

• у Вас непереносимость или ранее наблюдались кожные или аллергические реакции к эритромицину или любому другому компоненту препарата (см. раздел 6),

• у Вас в анамнезе имеется воспалительное заболевание кишечника и антибиотикоассоциированная диарея (острая, продолжительная или кровяная диарея, развивающаяся после применения антибиотиков).

Применяйте препарат только на кожные покровы. Постарайтесь, чтобы препарат не попадал в глаза, ноздри, рот или на губы. Если это произошло, хорошенько промойте данные участки водой. Применяйте с осторожностью, чтобы препарат не попал на раздраженные участки кожи, такие как порезы, ссадины, участки солнечных ожогов или поврежденную кожу.

**Другие лекарственные препараты и Эритромицин**

Проинформируйте своего врача или фармацевта, если Вы принимаете, недавно принимали или должны принимать любые другие препараты, включая препараты, приобретаемые без рецепта.

• Эритромицин может повлиять на эффективность других препаратов. Не применяйте Эритромицин одновременно с клиндамицин-содержащими противоугревыми местными препаратами.

• Сообщите Вашему лечащему врачу, если Вы принимаете другие антибиотики.

• Не применяйте Эритромицин одновременно с другими местными противоугревыми препаратами, за исключением тех, которые Вам прописал врач или порекомендовал фармацевт.

**Беременность, кормление грудью и фертильность**

• Если Вы беременны или кормите грудью, считаете, что можете быть беременны или при планировании беременности, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, перед тем, как принимать этот препарат.

• Если Вы забеременели во время лечения Эритромицином, сообщите врачу.

• Не наносите Эритромицин на Вашу грудь, если Вы кормите грудью.

***Важная информация об ингредиентах, входящих в состав Эритромицина***

• Препарат содержит пропиленгликоль, который может вызывать раздражение кожи

***Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами***

Эритромицин раствор не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

**3. Как применять Эритромицин**

Эритромицин следует применять в точности так, как предписано врачом.

Если у Вас есть какие либо сомнения по поводу приема препарата, то Вам следует проконсультироваться с лечащим врачом или фармацевтом.

**Что нужно знать перед использованием Эритромицина**

• Эритромицин нужно применять только на кожные покровы.

• **Нельзя принимать препарат внутрь!**

• Данный препарат является воспламеняющимся. Держите препарат вдали от открытого огня и пламени и других источников возгорания, включая сигареты во время и после курения.

**Частота и длительность применения**

• Следует применять Эритромицин два раза в день, утром и вечером.

• Увеличение частоты приема не приводят к более лучшим результатам.

• Препарат следует применять в течение минимум шести - восьми недель, прежде чем Вы почувствуете надлежащий эффект от применения Эритромицина.

• Вы должны продолжать использование лекарственного препарата в соответствии с предписаниями Вашего врача в течение максимум 6 месяцев.

**Способ применения Эритромицина**

• полностью удалите макияж,

• промойте пораженный участок мягким мылом и теплой водой и нежно просушите,

• смочите ватный тампон или подушечку раствором и нанесите на пораженный участок,

• с помощью ватного тампона или подушечки равномерно и нежно распределите раствор по всей пораженной поверхности, а не на отдельные участки.

**После использования Эритромицина**

• После использования укупорьте надлежащим образом флакон с раствором, чтобы предохранить лекарство от вытекания или испарения.

• Эритромицин содержит ингредиенты, которые помогают антибиотику проникнуть вглубь корней волосяных фолликул, откуда развиваются угри. Эти ингредиенты обеспечивают влажность кожи в течение нескольких минут после его применения.

• Перед нанесением макияжа необходимо, чтобы лицо полностью просохло.

• Вы можете почувствовать легкий специфический запах, пока оно высыхает, это нормально.

• Мойте руки после каждого использования препарата.

**Если Вы забыли принять Эритромицин**

• Не наносите препарат два раза, чтобы возместить пропущенный прием.

• Следует нанести следующую дозу в обычном режиме.

**Если Вы случайно проглотили Эритромицин**

Компоненты, входящие в состав Эритромицина обычно не опасны при проглатывании в количествах, применяющихся на лицо при каждой процедуре. Если случайно раствор попал в рот, следует промыть сразу же большим количеством воды. Обратитесь к врачу, если Вы проглотили достаточное количество раствора, большее, чем применяется при лечебной процедуре.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы по применению Эритромицина, обратитесь к своему лечащему врачу.

**4. Возможные побочные эффекты**

Как и другие лекарственные средства, Эритромицин может вызвать побочные эффекты, хотя они и не появляются у каждого. Следующие побочные эффекты могут возникнуть при применения данного лекарства.

**Прекратите приема Эритромицина и обратите к врачу немедленно, если:**

• у Вас развилась аллергическая реакция (отек лица, глаз, губ или языка, крапивница или затруднение дыхания),

• у Вас наблюдается острая или продолжительная диарея.

Наблюдались следующие очень частые побочные эффекты (могут наблюдаться более чем у 1 из 10 человек):

• ощущение жжения кожи,

• раздражение кожи,

• ощущение сухости кожи, особенно в начале лечения,

• покраснение кожи, особенно в начале лечения.

Другие побочные эффекты, частота которых не может быть оценена имеющимися данными:

• аллергические реакции,

• диарея, боль в животе, дискомфорт желудка,

• зуд, сыпь,

• отек лица.

Немедленно обратитесь к врачу, если у вас возникла серьезная кожная реакция: красная чешуйчатая сыпь с бугорками под кожей и волдырями (экзантематозный пустулез). Частота этого побочного эффекта неизвестна (нельзя оценить на основании имеющихся данных).

**Отчетность о побочных эффектах:**

Если Вы отметили какие-либо побочные эффекты, сообщите об этом своему лечащему врачу, провизору или фармацевту, в том числе и о побочных эффектах, не перечисленных в этом листке-вкладыше. Так же Вы можете сообщить о побочных эффектах компании ООО «Арпимед», перейдя на сайт www.arpimed.com и заполнить соответствующую форму «Сообщить о побочном действии или неэффективности лекарства» и в Научный центр

экспертизы лекарств и медицинских технологий им. академика Э.Габриеляна, перейдя на сайт www.pharm.am в раздел “Сообщить о побочном эффекте лекарства” и заполнить форму “Карта сообщений о побочном действии лекарства”. Телефон горячей линии научного центра: +37410200505; +37496220505.

**5. Как хранить Эритромицин**

• Хранить в недоступном для детей месте.

• Хранить при температуре не выше 25°С, защищенном от влаги и света месте.

• Срок годности – 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

• После вскрытия флакона использовать до истечения срока годности.

**6. Содержимое упаковки и дополнительная информация**

**Что содержит Эритромицин**

Каждый мл раствора для наружного применения содержит:

*Активное вещество:* эритромицин – 20 мг;

*Другие компоненты:* пропиленгликоль, этанол.

**Как выглядит Эритромицин и содержимое упаковки:**

Прозрачная жидкость, без запаха.

**Описание упаковки**

30 мл 2% раствора для наружного применения в стеклянных флаконах вместе с листком – вкладышем в пачке из картона.

**Каковы условия отпуска Эритромицина из аптек**

Отпускается по рецепту врача

**Производитель**

**ООО ″АРПИМЕД″**

Республика Армения, Котайки марз, г. Абовян, 2-ой мкр, дом 19

Тел.: 374 (222) 21703, 21740 Факс: 374 (222) 21924

**Владелец регистрационного удостоверения**

**ООО ″АРПИМЕД″**

Республика Армения, Котайки марз, г. Абовян, 2-ой мкр, дом 19

Тел.: 374 (222) 21703, 21740 Факс: 374 (222) 21924

***Дата последнего пересмотра текста***